

К л и м а т ь.

Изученіе каждой страны надо начинать съ изученія почвы, климата и вообще тѣхъ естественно-историческихъ условій, которыя зависятъ отъ того мѣста, какое занимаетъ эта страна на землѣ. Отъ почвы и климата зависитъ растительность страны, ея животный міръ, а значитъ и родъ занятій, пища, одежда, жилище и вообще весь укладъ жизни и даже обычай живущихъ въ ней людей. Если почва плодородная, то населеніе будетъ земледѣльческое; если почва не плодородная, но въ ней есть каменный уголь или желѣзная руда, то населеніе будетъ добывать уголь или выплавлять желѣзо изъ руды. Мы съемъ рожь и пшеницу; на такой же почвѣ, но въ болѣе теплыхъ мѣстахъ уже надо садить рисъ и апельсины. На кавказскомъ черноморскомъ побережье выходцы изъ Украины много лѣтъ упорно сѣяли рожь и никакъ не могли совладать съ буйной природой; ихъ поля заростали сорной растительностью, они получали нищенскіе урожаи и рѣшили, что въ этой странѣ „земля не родить“; но вотъ ихъ убѣдили разводить виноградъ и тамъ, гдѣ земля не родила ржи, получаются миллионные доходы отъ винограда. Русскіе духоборы, которые переселились въ Америку, тоже много лѣтъ бѣдствовали, пока сѣяли рожь и картофель тамъ, гдѣ слѣдовало разводить апельсины.

Ясно, что жилище и одежда человѣка могутъ быть построены только изъ того материала, который есть на мѣстѣ и который приспособленъ къ условіямъ погоды. Наша хата-мазанка оказалась бы непригодной для жилья въ холодной и снѣжной Архангельской губерніи, точно также какъ въ шалашѣ изъ оленевыхъ шкуръ нельзя жить въ Харьковской губерніи.

Обитателю寒冷ныхъ полярныхъ странъ необходимо съѣдать огромныя количества сала и жира, чтобы переносить тридцатиградусные морозы пять мѣсяцевъ сряду, а жителю теплой Японіи достаточно съѣсть двѣ чашки варенаго рису, чтобы быть сытымъ на весь день.

Климатъ и строеніе почвы вліяютъ даже на строеніе тѣла человѣка и животныхъ. На равнинахъ у рогатаго скота спина прямая и ноги слабѣе, чѣмъ у скота, живущаго въ горахъ; на равнинѣ у лошадей широкія и плоскія копыта, у горной лошади копыто прямое; на равнинѣ у овецъ и собакъ болѣе широко разставленные пальцы, чѣмъ у тѣхъ же животныхъ въ горахъ. У жителей сырыхъ и влажныхъ мѣстъ волосы болѣе тонкіе и мягкие, чѣмъ у жителей сухихъ мѣстъ. Такихъ примѣровъ можно привести много.

Каждому человѣку кажется, что онъ устраивается и живеть такъ, какъ ему хочется. Но это только кажется. Есть неписанные, но не нарушеніе законы природы, которыми управляетъ вся жизнь, даже въ мелочахъ. Вотъ, напримѣръ, характерно, что въ Финляндіи и нѣкоторыхъ мѣстахъ Франціи, во Фландріи, совсѣмъ нѣть большихъ селеній, дома-же и небольшие хутора разбросаны какъ будто въ беспорядкѣ по всей странѣ; а у насъ въ южныхъ степяхъ можноѣхать десятокъ верстъ и не встрѣтить человѣческаго жилья, а затѣмъ вѣхать въ огромное село съ 30000 жителей. Все дѣло объясняется распределеніемъ воды по странѣ. Гдѣ воды много, тамъ человѣкъ селится около своего участка земли, который онъ обрабатываетъ; тамъ же, гдѣ воды мало, люди собираются въ большія селенія въ долины рѣкъ или въ балки, гдѣ есть источники и гдѣ легко сдѣлать колодезь.

Человѣкъ не можетъ измѣнить природныхъ условій своей страны. Мы не можемъ уменьшить зимнихъ морозовъ, мы не можемъ прибавить ни капли дождя. Но мы можемъ употребить всѣ усилия, чтобы возможно лучше и возможно полноѣ использовать для нашихъ нуждъ всѣ естественные условия нашей страны. Безполезно насиовать природу и разводить въ Харьковской губерніи виноградъ, но слѣдуетъ выбрать такое растеніе, для котораго наиболѣе походятъ наши условия и вести свою обработку земли и всѣ полевые работы такъ, чтобы не потерять безполезно ни одного солнечнаго дня, ни одной капли дождя.

Вся жизнь на землѣ происходитъ отъ солнца. Отъ дѣйствія солнечной теплоты вода испаряется изъ морей, разносится по всей землѣ въ видѣ облаковъ и изъ облаковъ дождемъ выливается на землю. Отъ дѣйствія солнечной теплоты въ влажной землѣ начинается проростаніе зерна и развитіе растенія; только при солнечномъ свѣтѣ растутъ всѣ растенія, трава и деревья. Зерна растеній, древесина дерева представляютъ изъ себя запасы солнечной теплоты; человѣкъ и животные, питаясь растеніями, пользуются этими запасами. Когда человѣкъ зажигаетъ въ печкѣ

дрова, или заставляет лошадь работать, или пускает въ ходъ вѣтрякъ, или сожигаетъ каменный уголь въ фабричной печи, онъ пользуется только различными преобразованіями солнечной теплоты¹⁾. Солнце даетъ намъ хлѣбъ, солнце даетъ намъ одежду, солнце-же приводить въ движение наши поѣзда, фабрики и заводы. Погасни сегодня солнце—и завтра вся земля обратится въ ледяную сосульку.

Отъ дѣйствія теплоты солнца погода измѣняется изо дня въ день; сегодня тепло, ясно и тихо, а завтра холодно, пасмурно и вѣтрено; сегодня идетъ дождь, а потомъ цѣлую неделю не выпадетъ ни капли. Но всѣ мы знаемъ, что эти колебанія погоды не могутъ перейти какой то границы: въ январѣ у насть не можетъ наступить такая теплая погода, чтобы термометръ показывалъ 10° тепла; въ іюнѣ не можетъ быть мороза— 10° . Если мы говоримъ, напримѣръ, что лѣто такого то года было холодное, а зима теплая, то мы хотимъ сказать, что лѣто было холоднѣе, а зима теплѣе, чѣмъ имъ слѣдовало быть въ этихъ мѣстахъ. Значитъ, у каждого изъ насть на основаніи жизненного опыта складывается убѣжденіе, что для каждого мѣсяца, для каждого времени года есть такая температура, такое количество дождя, которое слѣдуетъ считать обычнымъ, нормальнымъ. Но въ каждый отдельный мѣсяцъ или годъ можетъ быть теплѣе или холоднѣе, чѣмъ слѣдуетъ по нормѣ.

Путемъ наблюденія изо дня въ день въ теченіе многихъ лѣтъ можно найти для каждого мѣста его нормальную температуру, облачность, распределеніе вѣтровъ, дождей и т. д. для отдельныхъ мѣсяцевъ, временъ года и всего года. Это то, что называется *климатомъ* данной мѣстности. Конечно, нельзя довольствоваться словесными обозначеніями „тепло“, „холодно“, „вѣтрено“ и т. д. потому что такія обозначенія будутъ пониматься различно и то, что одному будетъ тепло, другому можетъ казаться холоднымъ. Наука требуетъ, чтобы всѣ величины, насколько это возможно, выражались числами. Значитъ, всѣ признаки, которыми опредѣляется погода и климатъ, надо выразить числами. Мало сказать, что было тепло и ясно; надо степень теплоты, ясности неба выразить определенными числами и притомъ такъ, чтобы всѣ наблюдатели обозначали совершенно одинаково; только тогда записи будутъ одинаково пониматься всѣми.

Наука о погодѣ и ея измѣненіяхъ называется *метеорологіей*. Для точныхъ научныхъ наблюденій надъ погодой устраиваются метеорологическія станціи. Такъ какъ въ различныхъ мѣстахъ

¹⁾ Каменный уголь—это остатки тѣхъ лѣсовъ, которые росли миллионы лѣтъ тому назадъ. Сожигая каменный уголь, мы получаемъ отъ него обратно ту теплоту, которую солнце дало этимъ лѣсамъ миллионы лѣтъ назадъ.

погода бываетъ различна, то надо устраивать много метеорологическихъ станцій, которая образуютъ метеорологическую сѣть. Въ Харьковской губерніи метеорологическая сѣть устроена губернскимъ земствомъ. Харьковская земская метеорологическая сѣть состоитъ изъ 150 дождемѣрныхъ станцій, которая производятъ наблюденія только надъ выпаденіемъ дождя и снѣга, и 25 станцій 2-го разряда, которая производятъ полныя наблюденія надъ всѣми измѣненіями погоды¹⁾. Этого количества станцій недостаточно для полнаго изученія всѣхъ явленій погоды. За годъ революціи нѣкоторыя станціи пострадали или даже совсѣмъ уничтожены; по этому въ ближайшее время необходимо возстановить пострадавшія станціи и расширить метеорологическую сѣть.

Солнечное сіяніе.

Такъ какъ всѣ измѣненія погоды зависятъ отъ дѣйствія солнечной теплоты, то изученіе слѣдуетъ начать съ изученія солнечнаго сіянія. Если подсчитать, сколько времени солнце сіяеть на небѣ и сколько времени оно бываетъ закрыто облаками, то для среднихъ уѣзловъ Харьковской губерніи получится такая табличка. Въ теченіе дня солнце сіяеть въ среднемъ слѣдующее число часовъ:

Январь	1.1	Май	7.9	Сентябрь	6.4
Февраль	2.4	Июнь	8.8	Октябрь	3.7
Мартъ	3.4	Июль	9.0	Ноябрь	1.3
Апрѣль	5.5	Августъ	8.5	Декабрь	0.9

Годъ 4.9

Продолжительность сіянія указана въ часахъ и десятыхъ доляхъ часа. Въ февралѣ, напримѣръ, солнце, въ среднемъ, свѣтитъ два часа и четыре десятыхъ доли часа; десятая часть часа равна 6 минутамъ; значитъ, въ февралѣ солнце свѣтитъ по 2 часа и 24 минуты въ день. Наибольшая продолжительность сіянія бываетъ, конечно, въ іюлѣ, когда солнце сіяеть по 9 часовъ въ день, а наиболѣе бѣденъ солнечнымъ сіяніемъ декабрь, когда солнце свѣтитъ только по 0.9 часа, т. е. по 54 минуты, а остальную часть дня бываетъ закрыто облаками. Если бы солнечное сіяніе распредѣлилось равномѣрно по всѣмъ днямъ года, то продолжительность сіянія была бы 4.9 часовъ, т. е. почти 5 часовъ въ день²⁾.

¹⁾ Метеорологическое бюро Харьковского Губернского Земства, которое управляетъ сѣтью, даетъ всякия указанія относительно производства метеорологическихъ наблюдений, устройства станцій и т. д.

²⁾ Здѣсь говорится только о продолжительности солнечнаго сіянія. На большихъ станціяхъ, которая называются метеорологическими обсерваторіями, при помощи точныхъ приборовъ измѣряется и количество теплоты, которое получается отъ солнца. Въ этой книгѣ нельзя говорить объ этихъ сложныхъ работахъ. Въ Харьковской губерніи находится метеорологическая обсерваторія Харьковскаго университета въ Харьковѣ.

Температура воздуха.

Лучи солнца нагревают поверхность земли, а уже от земли нагревается находящийся надъ нею воздухъ¹⁾. Степень нагреванія воздуха или, другими словами, температура воздуха, опредѣляется термометрами²⁾. Если опредѣлять температуру воздуха каждый часъ, всѣ числа сложить и сумму раздѣлить на 24, то мы получимъ среднюю суточную температуру воздуха для этого дня. Если сложить среднія температуры всѣхъ дней мѣсяца и сумму раздѣлить на 30, то получимъ среднюю мѣсячную температуру воздуха. Если сложить всѣ среднія мѣсячные температуры за годъ и сумму раздѣлить на 12, то получимъ среднюю температуру этого года. Если такія вычислениія сдѣлать за много лѣтъ, то получимъ среднія многолѣтнія среднія величины.

Въ слѣдующей таблицѣ даны среднія многолѣтнія температуры отдельныхъ мѣсяцевъ и года для различныхъ мѣстъ Харьковской губерніи и, для сравненія, для нѣкоторыхъ городовъ Россіи.

Средняя температура воздуха.

	Я	Ф	М	А	М	Ін	Іл	А	С	О	Н	Д	Град.
Москва	-11.0	-9.6	-4.8	3.5	11.7	16.4	18.9	17.1	11.2	4.3	-2.4	-8.2	3.9
Кievъ	-6.2	-5.3	-0.7	6.9	13.8	17.6	19.2	18.4	13.8	7.5	1.2	-4.4	6.8
Курскъ	-9.9	-8.2	-3.7	4.7	13.1	17.4	19.3	18.4	12.8	6.4	-1.5	-6.7	5.2
Сумской уѣздъ .	-7.7	-7.2	-1.4	6.8	13.9	17.7	19.4	18.4	13.3	5.6	-0.5	-4.2	6.1
Ахтырскій . . .	-7.4	-6.5	-1.8	7.0	15.9	18.9	20.7	18.5	14.1	6.9	-0.7	-4.7	6.7
Харьковъ	-7.2	-5.6	-1.1	7.2	15.0	18.8	20.5	19.1	13.4	7.0	0.1	-4.8	6.7
Изюмскій уѣздъ .	-5.9	-4.7	-0.6	8.4	16.8	20.3	22.4	21.0	14.7	7.9	0.7	-3.8	8.1
Старобѣльскій у.	-7.3	-6.6	-1.5	7.8	15.5	18.3	21.8	20.7	14.4	6.9	0.1	-4.8	7.2
Полтава	-7.1	-7.6	-1.9	8.5	15.8	17.0	20.2	19.9	14.5	7.8	1.1	-5.3	6.9
Воронежъ	-9.8	-8.7	-3.8	5.7	14.0	18.4	20.4	18.3	12.8	5.8	-1.4	-7.3	5.4
Саратовъ	-10.8	-9.0	-4.8	5.3	14.7	19.4	22.0	20.3	14.1	6.2	-1.4	-7.9	5.7
Новороссійскъ .	1.1	2.2	5.7	10.4	15.9	20.4	23.8	23.7	18.7	14.7	8.3	4.3	12.4

¹⁾ Поэтому чѣмъ выше, тѣмъ холоднѣе. На очень высокихъ горахъ, напр. на Кавказѣ, снѣгъ лежитъ круглый годъ. Теперь на аэропланаѣ можно летать на большой высотѣ. Оказывается, что даже лѣтомъ на высотѣ четырехъ верстъ надъ землею начинается постоянный морозъ, а на высотѣ около 10 верстъ надъ землею всегда бываетъ морозъ около -50° , т. е. болѣе сильный, чѣмъ на землѣ въ самыя лютыя зимы.

²⁾ Въ настоящей книжѣ невозможно описывать приборы, которыми пользуются на метеорологическихъ станціяхъ. Интересующіеся этимъ могутъ обратиться въ метеорологическое бюро (Адресъ: г. Харьковъ, почтовый ящикъ № 266). Въ настоящей книжѣ температура указана по термометру Цельсія, которыми пользуются при всѣхъ научныхъ работахъ (въ метеорологии, физикѣ, медицинѣ и пр.).

Изъ таблицы видно, что въ Харьковской губерніи средняя годовая температура воздуха не вездѣ одинакова: наиболѣе хо-




Рис. 7. Толстой линіей обведены границы Харьковской губерніи. Разорванная линія - - - проходитъ черезъ мѣста, въ которыхъ такая же температура лѣта, какъ въ Харьковѣ; волнистая линія-----проходитъ черезъ мѣста съ одинаковой температурой зимы.

Двѣ сплошныя линіи ограничивають узкую полосу, где средняя температура года такая же, какъ въ Харьковской губ.

Косо /////////////// зачерчены мѣста съ такимъ же годовымъ количествомъ осадковъ, какъ въ Харьковской губерніи.

лоднымъ является Сумской уѣздъ, гдѣ средняя температура $6^{\circ}1$. По направленію къ югу становится теплѣе; въ Харьковскомъ уѣздѣ температура года доходитъ до 6.7 , а въ Изюмскомъ уѣздѣ повышается до 8.1 . Если сравнить нашу губернію съ сосѣдними областями Россіи (смотри приложенную карту, на стр. 41), то оказывается, что такая же, какъ въ Харьковской губерніи, средняя температура года наблюдается въ узкой полосѣ шириной около $200—300$ верстъ, которая тянется отъ южныхъ береговъ Балтійского моря къ Аральскому морю. Къ сѣверу отъ этой полосы холоднѣе, чѣмъ въ Харьковской губерніи, а къ югу—теплѣе. На той же карте разорванной линіей ----- соединены всѣ мѣста, гдѣ бываетъ такая же, какъ у насъ, температура лѣта; она идетъ отъ Бессарабіи къ южной части Уральскихъ горъ. Волнистая линія————— проходитъ черезъ мѣста съ одинаковой температурой зимы; эта линія идетъ отъ сѣверныхъ береговъ Балтійского моря на юго-востокъ къ Каспійскому морю. Значитъ, въ Харьковской губерніи лѣто такое же жаркое, какъ въ Бессарабіи, а зима такая же суровая, какъ въ далекой Финляндіи.




Рис. 8. Годовой ходъ температуры воздуха: верхняя линія — въ Новороссійскѣ; средня сплошная линія — въ Харьковѣ; нижня — въ Москвѣ.

Какъ видно изъ таблицы, числа для различныхъ мѣстъ Харьковской губерніи мало отличаются между собою; поэтому дальнѣе будуть даны числа только для средней части губерніи, для города Харькова, а гдѣ нужно, будетъ указано, чѣмъ отличаются другія мѣста губерніи отъ среднихъ уѣздовъ.

Самый холодный мѣсяцъ въ году—январь. Съ наступлениемъ весны температура отъ одного мѣсяца къ другому повышается, особенно быстро отъ марта до мая, а потомъ до юля уже не такъ значительно; въ юлѣ наступаетъ наиболѣе высокая температура и съ августа начинается пониженіе температуры къ зимѣ (см. рисунокъ 8).

Таковы среднія температуры, выведенныя изъ наблюденій за 25 лѣтъ. Въ отдѣльные годы бываетъ, конечно, и теплѣе, и холоднѣе, чѣмъ указано въ таблицѣ, но все же колебанія не переходятъ извѣстныхъ границъ. Въ слѣдующей таблицѣ указаны среднія мѣсячныя температуры самыхъ теплыхъ и самыхъ холодныхъ мѣсяцевъ, какіе наблюдались за 25 лѣтъ.

	Самый теплый мѣсяцъ		Самый холодный мѣсяцъ		Колеба- ніе
Январь . .	—1.0	въ 1915 г.	—15.3	въ	1893 г.
Февраль . .	0.1	” 1914 ”	—13.7	”	1911 ”
Мартъ . .	3.6	” 1914 ”	— 7.1	”	1898 ”
Апрѣль . .	11.6	” 1913 ”	2.3	”	1896 ”
Май . .	19.9	” 1906 ”	11.2	”	1912 ”
Іюнь . .	24.0	” 1901 ”	15.4	”	1894 ”
Іюль . .	23.4	” 1897 ”	17.3	”	1912 ”
Августъ . .	22.3	” 1901 ”	16.5	”	1915 ”
Сентябрь . .	18.5	” 1909 ”	10.3	”	1894 ”
Октябрь . .	10.9	” 1896 ”	2.2	”	1912 ”
Ноябрь . .	4.8	” 1917 ”	— 4.2	”	1902 и 1908 г.
Декабрь . .	— 0.6	” 1901 ”	—10.1	”	1895 г.

Изъ сравненія первой и второй таблицъ видно, напримѣръ, что хотя въ среднемъ за много лѣтъ температура марта — 1.1° , но въ отдѣльные годы въ мартѣ можетъ быть и болѣе высокая температура и самымъ теплымъ былъ мартъ 1914 года, когда средняя температура мѣсяца была $+3.6^{\circ}$; самымъ же холоднымъ былъ мартъ 1898 года со средней мѣсячной температурой — 7.1 . Слѣдовательно среднія мѣсячныя температуры марта за послѣднія 25 лѣтъ колебались у насъ отъ — 7.1 до $+3.6$, т. е. температура марта можетъ колебаться въ предѣлахъ 10.7 градусовъ. Такъ какъ 25 лѣтъ — достаточно большой промежутокъ времени, то едва ли можно ожидать, чтобы въ мартѣ среднія мѣсячные температуры воздуха въ среднихъ уѣздахъ нашей губерніи могла быть значительно ниже — 7° и выше $+4^{\circ}$.

Кромѣ того изъ таблицы видно, что возможныя колебанія въ зимніе мѣсяцы бываютъ значительно больше, чѣмъ въ лѣтніе. Значитъ лѣтнія погода бываетъ у насъ вообще болѣе устойчивой и постоянной, чѣмъ зимнія.

Температуры отдельныхъ дней бываютъ, конечно, и болѣе высокими, и болѣе низкими, чѣмъ среднія мѣсячныя.

Въ слѣдующей таблицѣ указаны для каждого мѣсяца температуры самаго теплого и самаго холоднаго дня, какія наблюдались за 25 лѣтъ.

Температура воздуха

			Наиболѣе высокая		Наиболѣе низкая	Колебаніе.
Январь . . .	23	1899 г.	+ 8.5	4	1894 г.	- 33.1
Февраль . . .	24	1915 ,	11.0	7	1893 ,	- 35.0
Мартъ	30	1903 ,	20.2	19	1898 ,	- 25.7
Апрѣль	21	1899 ,	29.6	8	1896 ,	- 12.6
Май	16	1898 ,	31.7	5	1908 ,	- 2.5
Іюнь	19	1901 ,	35.2	2	1916 ,	- 1.1
Іюль	22	1903 ,	37.3	31	1900 ,	6.0
Августъ	4	1895 ,	37.2	31	1900 ,	1.2
Сентябрь	8	1909 ,	34.3	29	1916 ,	4.8
Октябрь	1	1892 ,	26.8	29	1912 ,	- 18.1
Ноябрь	7	1910 ,	20.4	15	1908 ,	- 22.4
Декабрь	2	1893 ,	10.7	25	1907 ,	- 30.9
За годъ			37.3			- 35.0
						72.3

Изъ таблицы видно, что, напримѣръ, въ мартѣ бывали морозы до -25° , какъ это было 19 марта 1898 года, но въ теплые годы въ томъ же мартѣ наблюдалась и температура $+20^{\circ}$, какъ было 30 марта 1903 года; такимъ образомъ въ мартѣ наблюдались температуры отъ -25° до $+20^{\circ}$, а слѣдовательно, какъ видно изъ послѣдняго столбца, въ мартѣ температура воздуха измѣняется у насъ въ предѣлахъ 45.9° . За весь годъ, какъ видно изъ послѣдней строчки, самая высокая температура наблюдалась $+37^{\circ}$, а самая низкая -35° , такъ что разность самой высокой и самой низкой температурой, которыя когда либо наблюдались въ Харьковѣ, равняется 72° . Для другихъ мѣстъ губерніи получаются почти такія же числа:

	Наибольшая температура	Наименьшая воздуха
Сумской уѣздъ	+ 35.9	- 35.4
Старобѣльскій уѣздъ	+ 38.8	- 33.5

Передъ наступленіемъ зимы заморозки начинаются:

въ Сумскомъ уѣздѣ около	26	сентября
въ среднихъ уѣздахъ около	29	сентября
въ Старобѣльскомъ уѣздѣ	8	октября

а съ двадцатыхъ чиселъ октября начинаются уже постоянные морозы, которые продолжаются до первыхъ чиселъ апрѣля. Всего въ губерніи бываетъ отъ 160 до 180 морозныхъ дней. Отдѣльные заморозки продолжаются, въ среднемъ, до 4 мая, а самый поздній заморозокъ былъ даже въ іюнѣ: 2 іюня 1916 года въ Харьковѣ былъ заморозокъ — 1° . Значить, только въ три лѣтніе мѣсяца, съ 2-го іюня по 1 сентября т. е. въ теченіе 90 дней въ году въ губерніи не бываетъ заморозковъ.

Если даже ранніе сентябрьскіе заморозки и не оказываются особенно вреднаго вліянія на растенія, то поздніе майскіе заморозки часто бываютъ губительны, такъ какъ они захватываютъ уже развившіяся или даже цвѣтущія растенія. Бывали случаи, когда на бахчахъ высаживали баклажаны по два и даже по три раза за весну, такъ какъ первыя посадки погибали отъ морозовъ.

Вѣтры. Въ губерніи преобладаютъ юго - восточные и восточные и только въ лѣтніе мѣсяцы, іюнь и іюль, дуютъ главнымъ образомъ западные вѣтры.

Весною, а иногда и лѣтомъ, бываютъ у насъ суховѣи; это по преимуществу юговосточные и восточные сухіе вѣтры, приносящи изъ прикаспійскихъ и среднеазіатскихъ степей теплый и очень сухой воздухъ. Когда дуетъ суховѣй, то даже ночью бываетъ такъ же сухо, какъ днемъ и растенія не освѣжаются даже росою. Весною суховѣй быстро и сильно высушиваетъ землю и сильно задерживаетъ развитіе растительности. Если такой суховѣй дуетъ лѣтомъ, когда зерновые хлѣба уже наливаются, но зерно находится еще въ состояніи молочной зрѣлости, то суховѣй въ два-три дня можетъ высушить зерно и оно получается щуплое и легковѣсное.

Осадки. Въ Харьковской губерніи, какъ и на всемъ югѣ Россіи, урожай зависитъ главнымъ образомъ отъ количества осадковъ. Словомъ „осадки“ обозначаютъ всю ту воду, которая выпадаетъ въ видѣ дождя, снѣга, града, крупы и т. д. Всѣ осадки переводятся на воду; снѣгъ, крупка расплываются и измѣряется полученная отъ нихъ вода. Количество выпавшихъ осадковъ измѣряется особой мѣрой, которая называется миллиметромъ. Одинъ миллиметръ осадковъ — это такое количество осадковъ, при которомъ на одну десятину выпадаетъ 900 ведеръ воды. Если говорятъ, что выпало 10 миллиметровъ осадковъ, то это значитъ, что на каждую десятину выпало по 9000 ведеръ воды.

Въ слѣдующей таблицѣ даны многолѣтнія среднія мѣсячныя и годовыя количества осадковъ.

Мѣсячныя и годовыя количества осадковъ.

Городъ	Я	Ф	М	А	М	Ін	Іл	А	С	О	Н	Д	Годъ	
													Мѣсяцъ	
Москва	25	22	27	33	49	67	74	75	52	49	36	27	536	Мартъ
Кіевъ	28	21	38	42	44	60	75	61	44	44	37	39	534	Мартъ
Курскъ	10	12	17	32	54	78	56	54	38	28	29	19	426	Мартъ
Сумской уѣздъ	23	23	21	32	44	90	84	51	34	41	34	32	510	Мартъ
Ахтырскій уѣздъ	28	30	33	36	47	78	71	59	36	47	38	38	542	Мартъ
Харьковъ	32	28	32	39	50	70	68	49	32	47	42	36	525	Мартъ
Изюмскій уѣздъ	28	24	23	36	40	62	54	33	30	31	36	32	429	Мартъ
Старобѣльскій уѣздъ	22	24	16	36	39	56	59	22	32	29	42	37	414	Мартъ
Полтава	20	22	26	32	36	76	58	50	30	44	30	30	454	Мартъ
Воронежъ	38	34	38	40	48	68	61	55	42	40	45	47	554	Мартъ
Саратовъ	25	24	18	27	32	39	37	34	30	38	37	38	379	Мартъ
Новороссійскъ	94	59	71	43	44	60	47	40	46	38	66	83	691	Мартъ

Какъ видно изъ таблицы, въ Харьковской губерніи выпадаетъ въ годъ отъ 400 до 550 миллиметровъ осадковъ, т. е. въ среднемъ на десятину отъ 360000 до 495000 ведеръ воды. По губерніи осадки распредѣляются такъ, что наибольшее количество ихъ, около 550 миллиметровъ, выпадаетъ въ Сумскомъ и Ахтырскомъ уѣздахъ; по направленію на юго-востокъ количество осадковъ уменьшается; въ среднихъ уѣздахъ оно доходитъ до 500 миллиметровъ, а наиболѣе бѣднымъ оказывается крайній юго-восточный уѣздъ губерніи, Старобѣльскій, въ которомъ выпадаетъ только около 400 миллиметровъ. Сравнить осадки Харьковской губерніи съ осадками другихъ мѣстъ Россіи можно по картѣ на стр. 41. На ней косыми линіями зачерчена та полоса, въ которой осадковъ выпадаетъ столько-же, сколько въ Харьковской губерніи. Налѣво отъ этой полосы, т. е. на западъ, значитъ во всей западной половинѣ Россіи и во всей западной Европѣ, осадковъ выпадаетъ больше, чѣмъ у насъ. Направо отъ этой полосы, т. е. на востокъ осадковъ выпадаетъ меньше. Такимъ образомъ въ Европейской Россіи только на крайнемъ сѣверѣ, востокѣ и на юго-восточныхъ прикаспійскихъ степяхъ выпадаетъ осадковъ меньше, чѣмъ у насъ.

Въ таблицѣ указаны среднія количества осадковъ, полученные изъ наблюденій за много лѣтъ подъ рядъ. Въ каждый отдельный годъ осадковъ можетъ выпасть или нѣсколько больше или нѣсколько меньше, чѣмъ показано въ таблицѣ, но эти колебанія,

какъ и колебанія температуры воздуха, происходятъ въ определенныхъ предѣлахъ. Вотъ наибольшія и наименьшія количества осадковъ, какія выпадали въ различныхъ частяхъ губерніи; въ скобкахъ указаны годы, когда эти количества выпали:

Предѣльныя количества осадковъ въ Харьковской губерніи.

Наибольшее. Наименьшее.

Западные уѣзды: Сумской,
Ахтырскій, Лебединскій,

Валковскій

711 въ 1905 . . 301 въ 1908 г.

Средніе уѣзды: Богодуховскій,
Харьковскій, Волчанскій,
Зміевской

819 „ 1879 . . 325 „ 1885 „

Восточные уѣзды: Изюмскій,
Купянскій, Старобѣльскій

738 „ 1915 . . 270 „ 1908 „

При годовомъ количествѣ осадковъ болѣе 350 миллиметровъ наши полевые растенія получаютъ еще достаточно воды для своего развитія. Но если годовое количество бываетъ меньше 350 миллиметровъ, то воды выпадаетъ уже мало и мы говоримъ тогда о засухѣ. Значитъ, какъ показываютъ числа этой таблички, засуха возможна во всѣхъ частяхъ нашей губерніи.




Рис. 9. Годовой ходъ осадковъ въ Харьковской губерніи:

Западные уѣзды — — — — —

Средніе уѣзды — — — — —

Восточные уѣзды — — — — —

Распределение осадковъ по мѣсяцамъ можно видѣть изъ таблицы и на рисункѣ 9, (страница 47) на которомъ ходъ осадковъ изображаютъ три линіи: сплошная для среднихъ уѣздовъ, разорванная - - - - для западныхъ уѣздовъ и волнистая - - - - - для восточныхъ уѣздовъ. Въ западныхъ и среднихъ уѣздахъ распределение осадковъ по мѣсяцамъ совершенно одинаково: наибольшее количество осадковъ выпадаетъ въ лѣтніе мѣсяцы и наименьшее въ зимніе; слѣдуетъ замѣтить, что сентябрь является сухимъ мѣсяцемъ, а въ октябрѣ количество дождей опять увеличивается. Вотъ поэтому важно, чтобы озимые посѣвы первой половины августа попали подъ августовскіе же дожди; если же посѣвы будутъ произведены въ концѣ августа, то въ сентябрѣ количество дождей можетъ быть малымъ и развитіе всходовъ задержится до октября.

Въ восточныхъ уѣздахъ губерніи распределение осадковъ по мѣсяцамъ уже нѣсколько иное: самымъ сухимъ тамъ бываетъ мартъ, а затѣмъ не сентябрь, а августъ, хотя и въ сентябрѣ тоже мало дождей; затѣмъ въ этихъ уѣздахъ не такъ замѣтно увеличеніе дождей въ октябрѣ, поэтому всѣ три мѣсяца, въ которые происходитъ посѣвъ и первоначальное развитіе озимыхъ хлѣбовъ, августъ, сентябрь и октябрь, менѣе благопріятны, чѣмъ въ западныхъ уѣздахъ губерніи.

Большое значеніе и для хозяйства и для всякихъ работъ имѣеть интенсивность осадковъ, т. е. то количество воды, которое выпадаетъ въ одну минуту. Для примѣра сравнимъ осенній и лѣтній дождь; въ октябрѣ маленький дождикъ моросятъ безъ перерыва весь день; если измѣрить, сколько осадковъ выпало за сутки, то окажется, напримѣръ, 10 миллиметровъ; вся вода постепенно впитывалась въ землю и даже не образовалось лужъ; значитъ, вся вода осталась на мѣстѣ и пошла на увлажненіе земли, т. е. на пользу. Но вотъ выпалъ въ полѣ ливень, который продолжался всего 5 минутъ; выпало такое количество воды, что она не успѣваетъ впитаться въ землю и бурные потоки дождевой воды несутся внизъ, смывая на своемъ пути верхній слой обработанной земли, вымывая посѣвы на болѣе высокихъ мѣстахъ и занося иломъ огороды на низкихъ мѣстахъ; вездѣ не польза, а одно разрушеніе; если послѣ такого ливня прокопать землю, то окажется, что она промокла на какой нибудь вершокъ, а дальше осталась сухой. А если измѣрить, сколько воды окажется въ дождемѣрѣ, то получимъ тоже 10 миллиметровъ. Совсѣмъ не то, если мы разсчитаемъ, сколько воды пришлось на одну минуту; въ первомъ случаѣ мы получимъ не болѣе сотой доли миллиметра, а во второмъ, т. е. для ливня цѣлыхъ 2 миллиметра на минуту. Но интенсивность осадковъ можно вычислить только

для тѣхъ мѣстъ, гдѣ установлены самопишущие дождемѣры. Такие приборы есть въ Харьковской метеорологической сѣти и записи ихъ показываютъ, что интенсивность нашихъ лѣтнихъ ливней доходитъ до 2 миллиметровъ, т. е., другими словами, при лѣтнихъ ливняхъ можетъ выпасть въ одну минуту до 1800 ведеръ воды на десятину.

При лѣтнихъ ливняхъ иногда въ одинъ день выпадаетъ такое количество воды, которое превышаетъ нормальную мѣсячную величину. Вотъ наибольшія количества воды, выпавшія за одни сутки за послѣднія 25 лѣтъ:

въ западныхъ уѣздахъ	до 93	миллиметровъ,
” среднихъ ” ”	83	”
” восточныхъ ” ”	111	”

Иногда осенніе, августовскіе и сентябрьскіе, дожди распредѣляются крайне неблагопріятно не только тѣмъ, что вообще ихъ выпадаетъ мало, но и тѣмъ, что бываютъ довольно длинные сухіе промежутки, въ которые дождей совсѣмъ не выпадаетъ. У насъ почти каждый годъ бываютъ сухіе промежутки въ 15 или 20 дней, но бываютъ и болѣе продолжительные. Вотъ самые длинные засушливые промежутки за то время, когда у насъ ведутся правильныя записи:

Въ западныхъ уѣздахъ засуха въ 1907 году съ 11 августа по 12 сентября, всего 33 дня, за которые не выпало ни капли дождя.

Въ среднихъ уѣздахъ засуха 1896 года съ 27 сентября по 7 ноября, всего 42 дня;

Въ восточныхъ уѣздахъ, въ Сватовой Лучкѣ въ 1909 году съ 14 сентября по 26 октября, всего 43 дня.

Снѣгъ начинаетъ падать съ двадцатыхъ чиселъ октября. Съ первыхъ чиселъ ноября, съ 2-го или 3-го, снѣговой покровъ уже закрываетъ поля и нормально держится до 2—3 марта, т. е. около 100 дней. Послѣдній снѣгъ выпадаетъ въ среднемъ 15 апрѣля, но изрѣдка снѣгъ можетъ итти и позже, даже въ первыхъ числахъ мая. Въ годы съ теплой „гнилой“ зимой снѣгъ лежитъ иногда всего нѣсколько недѣль. По характеру залеганія снѣга западные уѣзды губерніи отличаются отъ восточныхъ. Въ западныхъ уѣздахъ толщина снѣгового покрова можетъ доходить до 60—80 сантиметровъ а къ юго-востоку она постепенно уменьшается; средняя же толщина снѣгового покрова значительно меньше, всего около 30 сантиметровъ въ среднихъ уѣздахъ. Въ восточныхъ уѣздахъ толщина снѣга рѣдко бываетъ болѣе 20—30 сантиметровъ и не рѣдко во время декабрьскихъ и январьскихъ оттепелей снѣговой покровъ исчезаетъ совсѣмъ, а при наступ-

леніи морозовъ поля покрываются ледяной корой, подъ которой посѣвы задыхаются и даже погибаютъ.

Промерзаніе почвы сильно зависитъ и отъ температуры воздуха и отъ толщины снѣгового покрова. Въ среднемъ почва промерзаетъ на глубину около 60 сантиметровъ, т. е. на три четверти аршина, но въ суровыя и малоснѣжныя зимы промерзаніе распространяется на глубину 1 метра и даже немного болѣе, т. е. до полутора аршинъ.

Болѣе крупныя рѣки, губерній Ворскла и Сѣверный Донецъ покрываются льдомъ около 10—12 декабря, вскрываются около 20—22 марта; слѣдовательно бываютъ покрыты льдомъ около 100 дней. Вскрытие же и замерзаніе маленькихъ рѣкъ можетъ происходить и раньше и позже этихъ сроковъ въ зависимости отъ морозовъ. Въ гнилую зимы возможно вскрытие рѣкъ даже въ концѣ января; бываютъ зимы, когда рѣки вскрываются ото льда и снова замерзаютъ по три раза, такъ было, напримѣръ, въ 1915 году, когда наиболѣе сильный разливъ рѣкъ былъ не въ марта, а въ январѣ.

Остается еще одинъ вопросъ. Приходится слышать, что климатъ нашихъ мѣстъ измѣняется къ худшему, что раньше, напримѣръ, количество дождей было больше, чѣмъ теперь. Если не заглядывать въ глубь вѣковъ, а говорить только о послѣднемъ столѣтіи, за которое имѣются совершенно точныя записи, то можно опредѣленно сказать, что въ нашихъ мѣстахъ количество дождей замѣтно не измѣнилось. Но вмѣстѣ съ тѣмъ оказывается, что количество дождей какъ бы волнообразно колеблется: бываетъ рядъ лѣтъ дождливыхъ, которые смѣняются годами болѣе сухими, за которыми опять идутъ дождливые.

По записямъ осадковъ за послѣднія сто лѣтъ, оказывается, что ряды дождливыхъ и сухихъ лѣтъ расположились такъ:

Дождливые годы: 1815 1845 1878—80 1913—15 (1948).

Годы сухie: 1825—30 1860 1893—95 (1913).

Какъ видно, дождливые годы наступаютъ черезъ промежутки около 35 лѣтъ; между ними идутъ годы сухie, которые чередуются тоже черезъ 35 лѣтъ. Такая смѣна замѣчена во многихъ мѣстахъ Европы, Америки и Африки, гдѣ есть записи за много лѣтъ.

Такъ какъ такое чередованіе удалось прослѣдить на протяженіи почти ста лѣтъ, то можно сдѣлать предположеніе, что за дождливыми годами 1913—15 наступятъ годы относительно сухie и середина сухого промежутка будетъ около 1931 года, а слѣдующие затѣмъ болѣе дождливые годы будутъ около 1948 г.

Но на эти предположения не слѣдуетъ смотрѣть, какъ на предсказанія дождей на будущее время и особенно нельзя примѣнять этихъ соображеній къ отдѣльнымъ годамъ; надо помнить, что опредѣленіе „сухие“ и дождливые“ годы относится не къ отдѣльнымъ годамъ, а къ ряду пяти-шести лѣтъ; въ ряду сухихъ лѣтъ отдѣльные годы могутъ быть дождливыми, а въ рядахъ дождливыхъ лѣтъ отдѣльные годы бываютъ и сухими.

Причина такой смѣны дождей еще не выяснена; есть основанія предполагать, что это зависитъ отъ измѣненій, которые происходятъ на солнцѣ и которые давно уже замѣчены астрономами при изученіи солнца.

Метеорология и сельское хозяйство.

Метеорологическая станція постепенно накапляютъ наблюденія надъ погодой. Метеорологическая бюро и обсерваторіи собираютъ эти наблюденія и обрабатываютъ ихъ и такимъ образомъ изученіе климата нашей родины постепенно подвигается впередъ. Но сельскому хозяину важно знать не то, какая, напримѣръ, средняя температура воздуха, или сколько выпадаетъ дождей въ какомъ нибудь мѣстѣ, а важно знать, какимъ образомъ всѣ метеорологическая условія вліяютъ на сельскохозяйственныя растенія; важно знать, какія растенія окажутся наиболѣе подходящими для нашей почвы и для нашего климата; важно знать какъ и когда слѣдуетъ производить вспашку, посѣвъ и другія работы, чтобы наиболѣе полно использовать всѣ особенности нашего климата. Такого рода изслѣдованія составляютъ предметъ сельскохозяйственной метеорологии. Сельскохозяйственная метеорология изучаетъ вліяніе различныхъ метеорологическихъ условій на растенія; надо, слѣдовательно, производить одновременно и метеорологическая наблюденія и изслѣдованія надъ растеніями; такія работы сложны и требуютъ большихъ знаній и умѣнья и пока производятся только на немногихъ сельскохозяйственныхъ опытныхъ станціяхъ¹⁾.

Сельскохозяйственная метеорология—совсѣмъ новая отрасль метеорологии, и научная работа по изученію вліянія метеорологическихъ условій на хлѣба и другія сельскохозяйственныя растенія началась недавно. Поэтому въ настоящее время получено еще не такъ много выводовъ, которыми сельскій хозяинъ можетъ

1) Въ Харьковской губерніи до послѣдняго времени было четыре сельскохозяйственные опытныхъ станціи: въ Харьковѣ, Сумахъ, Сватовой Лучкѣ и около Пархомовки Ивановская опытная станція П. И. Харитоненка. Первые три станціи начали работу недавно, а Ивановская станція существовала болѣе 20 лѣтъ и произвела много важной для сельского хозяйства работы; во время беспорядковъ послѣдняго года Ивановская станція разрушена и при этомъ погибло много очень цѣнного материала: не только лабораторіи, но и много сѣменного материала, полученного послѣ многолѣтней упорной работы.

воспользоваться въ своихъ работахъ. Главная работа—еще впереди. Здѣсь приводится лишь нѣсколько примѣровъ для того, чтобы показать, въ какомъ направлениі ведутся изслѣдованія по сельскохозяйственной метеорологии.

Всѣмъ, конечно, извѣстно, что различныя растенія требуютъ различного количества тепла для своего развитія. Точными изслѣдованіями удалось выразить въ числахъ тѣ количества теплоты, которыя требуются для развитія нашихъ хлѣбныхъ растеній. Такъ какъ количества теплоты опредѣляются очень трудно (см. обѣ этомъ на стр. 40), то условились складывать среднія суточныя температуры воздуха за все время развитія какого нибудь растенія и вмѣсто количествъ теплоты давать суммы этихъ среднихъ температуръ. Вотъ какія суммы получены для нѣкоторыхъ яровыхъ хлѣбовъ:

Овесь	около	1600 ⁰
Ячмень	"	1700 ⁰
Просо	"	2300 ⁰
Кукуруза	"	2700 ⁰

Кромѣ того найдено, что сѣмена овса и ячменя начинаютъ проростать при температурѣ около 3⁰, проса около 5⁰, кукурузы около 10⁰, но наиболѣе быстро проростаніе сѣмянъ идетъ при температурѣ для овса и ячменя около 20⁰, проса около 25⁰, кукурузы около 32⁰. Отсюда ясно, что овесь и ячмень можно сѣять очень рано, какъ только земля нагрѣется выше 3⁰; съ посѣвомъ проса надо уже нѣсколько подождать; кукуруза требуетъ еще болѣе высокой температуры для проростанія сѣмянъ, кромѣ того, всходы кукурузы боятся заморозковъ и потому посѣвъ кукурузы слѣдуетъ производить значительно позже, когда и почва достаточно прогрѣется и уже нѣтъ опасности отъ заморозковъ.

Если теперь подсчитать для нашихъ мѣстъ суммы среднихъ суточныхъ температуръ за время отъ всходовъ до созрѣванія овса и ячменя, то для всѣхъ мѣстъ харьковской губерніи мы получимъ суммы болѣе 1700⁰. Значитъ, мы можемъ опредѣленно сказать, что въ нашихъ мѣстахъ получается вполнѣ достаточно тепла для развитія овса и ячменя и урожай этихъ хлѣбовъ зависить главнымъ образомъ не отъ температуры воздуха, а отъ количества и распределенія дождей. Совсѣмъ не то съ кукурузой; она высыпается поздно и требуетъ много теплоты, такъ что сумма среднихъ суточныхъ температуръ должна быть около 2700⁰. Можно опредѣленно сказать, что разведеніе кукурузы будетъ выгодно только въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ сумма температуръ получается болѣе 2700⁰. Если бы, напримѣръ, намъ сказали, что

въ мѣстахъ, лежащихъ къ югу отъ Харькова, эта сумма получается болѣе 2700⁰, а въ мѣстахъ, лежащихъ къ сѣверу отъ Харькова—менѣе 2700⁰, то мы придемъ къ такому выводу: разведеніе кукурузы можетъ быть выгодно только къ югу отъ Харькова, т. е. въ уѣздахъ Изюмскомъ, Купянскомъ, Старобѣльскомъ; конечно, въ отдѣльные теплые годы кукуруза будетъ удаваться и въ Сумскомъ уѣздѣ, на это будутъ случайные урожаи.

Еще примѣръ. Изслѣдованія показали, что у нѣкоторыхъ растеній существуютъ такъ называемые „критическіе періоды“, т. е. такие небольшіе промежутки времени, отъ которыхъ зависить все дальнѣйшее развитіе растеній. Такъ, напримѣръ, для овса критическими, т. е. рѣшающими являются десять дней передъ колошеніемъ; если въ эти десять дней будетъ стоять прохладная погода и выпадутъ хорошия дожди, то урожай будетъ хороший; если же въ теченіе 10 дней передъ колошеніемъ будетъ стоять жаркая—погода и земля не будетъ влажная, то слѣдуетъ ожидать плохого урожая, хотя бы потомъ и пошли дожди. Знаніе существованія критическихъ періодовъ даетъ хлиборобу возможность судить объ ожидаемомъ урожаѣ задолго до созрѣванія растеній.

Какъ сказано выше, научное изученіе зависимости между явленіями погоды и растеніями начато недавно и въ этой области предстоитъ много работы. Есть такие вопросы сельского хозяйства, которые, вѣроятно, будутъ разрѣшены именно сельскохозяйственной метеорологіей. Такъ, напримѣръ, агрономы давно уже обращали вниманіе на малую урожайность у насъ озимой пшеницы. Почва у насъ хорошая; обработка земли доведена до высокой степени совершенства и ни въ чемъ не уступаетъ западно-европейской, а между тѣмъ озимая пшеница никогда не даетъ у насъ такихъ урожаевъ, какіе получаетъ западная Европа. Поэтому высказывается предположеніе, что наши малые урожаи зависятъ не отъ почвы и обработки ея, а отъ условій погоды. Точно также мало выяснены причины не рѣдкой гибели пшеницы зимою; трудно объяснить, почему въ нашихъ восточныхъ уѣздахъ, Купянскомъ и Старобѣльскомъ, пшеница удается хуже, чѣмъ въ другихъ уѣздахъ. Одна изъ наиболѣе вѣроятныхъ причинъ заключается въ слѣдующемъ: зимою во время оттепелей почва покрывается водою, которая замерзаетъ при послѣдующихъ морозахъ и такимъ образомъ растенія оказываются покрытыми слоемъ льда; ледь не пропускаетъ къ растеніямъ воздуха, подо льдомъ накопляется углекислый газъ; растенія задыхаются отъ недостатка воздуха и погибаютъ, какъ говорятъ, выпрѣваютъ. Но все это еще необходимо провѣрить точными изслѣдованіями.

Г е о л о г і я.

Въ географическомъ очеркѣ мы разсмотрѣли поверхность Харьковской губ. въ томъ видѣ, въ какомъ она представляется въ настоящее время. Однако поверхность эта не остается всегда одинаковой. Цѣлый рядъ дѣятелей работаетъ надъ измѣненіемъ верхнихъ слоевъ земли. Проточныя и подземныя воды, стоячія воды—озера и болота, дѣятельность атмосферы—вывѣтривание и разрушеніе горныхъ породъ, вѣтеръ, организмы и другія причины медленно, но безпрерывно, измѣняютъ эти слои и земную поверхность въ настоящее время. Углубляясь въ пласты земли, мы встрѣчаемъ среди нихъ осадки моря, то глубокаго, то мелкаго, отложенія прибрежья и морского залива, наконецъ наносы ледника, показывающіе, какую длинную и сложную исторію имѣеть тотъ участокъ суши, который мы рассматриваемъ.

Вотъ эти двѣ стороны: изученіе измѣненій, которые происходятъ въ настоящее время на земной поверхности, и тѣхъ перемѣнъ, которая она испытывала раньше, и которая привели ту или иную область къ ея нынѣшнему состоянію, составляютъ задачу науки, носящей название геологии.

Современнаѧ геологическія явленія.

Образованіе овраговъ и балокъ.

Дождевая вода и вода тающихъ весною снѣговъ отчасти испаряется, отчасти впитывается въ почву, отчасти собирается маленькими ручейками, которые стекаютъ въ постоянные ручьи, рѣки или озера. Эта стекающая вода выбираетъ себѣ кратчайшіе и самые удобные пути, и при своемъ движеніи производить размывающее дѣйствіе, унося съ собою частицы глины и песка, которые захватываетъ по дорогѣ. Чѣмъ быстрѣе течетъ вода, тѣмъ она мутнѣе и грязнѣе. Быстрота же ручейковъ зависитъ отъ крутизны склоновъ, по которымъ они стекаютъ. Въ крутыхъ берегахъ рѣкъ ручейки протачиваютъ часто глубокія рытвины съ

крутыми стѣнками, которые увеличиваются, разростаются изъ года въ годъ и обращаются часто въ громадные овраги, причиняющіе земледѣлію большой ущербъ. Такіе овраги въ Харьковской губ. можно видѣть почти около каждого селенія. Всякій оврагъ при своемъ развитіи проходитъ рядъ измѣненій. Овраги, только что возникшіе въ круtyхъ обрывахъ, быстро растутъ. Эти овраги называютъ живыми. Ранней весною можно наблюдать, какъ ручьи, образующіе отъ тающаго снѣга, устремляются къ такому обрыву и, спадая съ обрыва, обращаются въ небольшіе водопады. На днѣ этого водопада разбивающаяся вода подмываетъ и подтачиваетъ склонъ, который обрушивается иногда значительными глыбами. Оврагъ постепенно врѣзается своей вершиной въ материкъ. Къ такому живому оврагу примыкаютъ боковые, которые совершенно также растутъ въ стороны своими вершинами, и весь оврагъ принимаетъ форму вѣтвящагося дерева. Иногда вершина раздваивается, иногда боковая вѣтвь обгоняетъ главную, часто боковыя вѣтви разрастаясь встрѣчаются своими вершинами, отрѣзая отъ материка островки, постепенно размываемые и осыпающіеся. Форма оврага зависитъ и отъ свойствъ грунта. Въ глинистомъ грунте размываніе идетъ медленнѣе и оврагъ сильно вѣтвится. Въ песчаномъ—овраги растутъ очень быстро и даютъ крутыя стѣнки. Если подъ песками лежать глины, не пропускающія воды, пески легко вымываются, осипаются, верхніе слои оползаютъ и обрушаиваются равномѣрно во всѣ стороны, и вершина оврага принимаетъ не вѣтвящіяся круглая очертанія.

Размытыя водою породы: почва, глина, песокъ, уносятся водою внизъ по оврагу и, перемѣшившись, откладываются на днѣ въ видѣ слоистыхъ, неправильно пересѣкающихся, овражныхъ наносовъ, иногда же уносятся далеко внизъ къ устью оврага и на равнину, образуя здѣсь плоскій расходящійся во всѣ стороны конусъ выноса. Куски плотныхъ породъ, оторванные отъ стѣнокъ оврага, окатываются и округляются водою, образуя „овражную гальку“, а куски вязкой глины катятся иногда по дну, вбирайая въ себя, какъ снѣжный комъ, различные обломки, песчинки и корешки, и выкатываются на плоское мѣсто въ видѣ округленныхъ, облѣпленныхъ обломками комьевъ, нерѣдко очень правильной формы, называемыхъ „овражными глиняными катунами“.

Съ теченіемъ времени оврагъ постепенно переходить въ иное состояніе. Ширина его увеличивается, а крутые склоны, осипаясь и смываясь, дѣлаются покатыми. Эти покатые склоны, уже не такъ размываются водою, на нихъ постепенно начинаетъ селиться растительность: трава, мелкіе кустарники—терень, шиповникъ, дальше деревца. Оврагъ нарастаетъ своей вершиной все

медленнѣе и медленнѣе и наконецъ совершенно останавливается въ ростѣ. Такіе заросшіе не развивающіеся овраги называютъ мертвыми.

Старые овраги, достигающіе иногда громадной длины—въ десятки верстъ, съ широкимъ дномъ и отлогими боками, называютъ балками. Балки обыкновенно совершенно уже не размываются, такъ какъ дно ихъ понижается медленно, а склоны покаты и заросли травою, а иногда и дно балки зарастаетъ деревьями.

На днѣ нѣкоторыхъ балокъ текутъ ручейки, образующіе изъ ключей, выходящихъ въ склонахъ балки. Балка представляеть собою конечную форму оврага, совершенно прекратившаго дѣятельность.

Однако, нерѣдки случаи, когда овраги совершенно мертвые ожидаютъ и начинаютъ снова свою разрушительную работу. Оврагъ начинаетъ опять углубляться, а вершина его подмывается и осипается. Чаще всего это происходитъ по винѣ человѣка.

При возобновленіи дѣятельности мертваго оврага на днѣ его обычно намѣчаются новая водомоина, прорѣзывающая наносы, отложенные старымъ оврагомъ при умираниі. Водомоина эта уже прежняго дна и, врѣзаясь въ глубину, она оставляетъ по бокамъ слѣды прежняго дна, въ видѣ болѣе или менѣе широкихъ ступеней или террасъ.

Вредъ, причиняемый оврагами, состоитъ въ размываніи высокихъ мѣстъ, которыя обращаются на много лѣтъ въ неудобную для земледѣлія изрытую поверхность, часто съ опасными крутыми обрывами, быстро разрастающимися во всѣхъ направленіяхъ, и отнимающими у хозяевъ десятину за десятиной ихъ пахотную землю. Другая сторона вредной дѣятельности овраговъ состоитъ въ томъ, что получающійся при размываніи рыхлый матеріаль сносится по дну оврага на ниже лежащія поля, и нерѣдко покрываетъ плодородную почву толстымъ слоемъ песка и глины, на которыхъ также въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ почти ничего не растетъ. Третья вредная сторона овраговъ—это спускъ грунтовыхъ водъ. Оврагъ, постепенно углубляясь, доходитъ часто до водоносныхъ слоевъ и размываетъ ихъ. Поэтому въ берегахъ его открываются ключи, посредствомъ которыхъ грунтовая вода уходитъ изъ подпочвы и стекаетъ по дну оврага въ рѣку. Весною, когда земля напитывается водою, эти ключи дѣйствуютъ очень сильно, но затѣмъ быстро спускаютъ воду, находившуюся въ грунте, и уже къ срединѣ лѣта почти совсѣмъ высыхаютъ. Такимъ образомъ, эта вода только увеличиваетъ половодье и разливы рѣкъ весною, а къ лѣту запасы грунтовой влаги оказываются израсходованными, отчего лѣтомъ страдаетъ растительность и сильно мелѣютъ и пересыхаютъ рѣки.

Между тѣмъ, въ развитіи овраговъ почти всегда виноватъ самъ человѣкъ. Скотъ, который пасутъ на крутыхъ склонахъ, объѣдаетъ траву, разбиваетъ ногами почву и дѣлаетъ ее доступною для размыванія. Еще хуже дѣйствуютъ дороги, спускающіяся съ крутыхъ склоновъ. По глубокимъ колеямъ, пробитымъ лѣтомъ и осенью, съ весны устремляются потоки воды, которые размываютъ колеи, обращаютъ ихъ въ глубокія борозды, а черезъ нѣсколько лѣтъ и въ значительные овраги. Дорога портится, ездить дѣлается невозможнно, начинаютъ обѣзжать водомоины и прокладываютъ новую колею, которая немедленно обращается въ новый оврагъ. Есть мѣста, гдѣ, благодаря неправильнно устроеннымъ дорогамъ, погублены десятки и сотни десятинъ пахотной земли. Примѣръ образованія овраговъ изъ дорогъ можно наблюдать въ с. Старовѣровкѣ Изюмск. у., и во многихъ другихъ мѣстахъ. Наконецъ, самымъ распространеннымъ случаемъ является образованіе овраговъ изъ бороздъ и межей, направляющихся внизъ по склону. Эти борозды повсемѣстно размываются водой, для которой онѣ представляютъ собою ближайшій и прямой путь, и часто обращаются въ громадныя водомоины. Вредъ, причиняемый неправильной распашкой склоновъ, такъ великъ, что его даже трудно оцѣнить.

Образованію овраговъ способствуетъ также рубка лѣсовъ на крутыхъ склонахъ, которые корнями деревьевъ, упавшей листвою и травой предохранялись отъ размыванія.

Для спасенія отъ овраговъ необходимо охранять крутыя склоны отъ пастьбы, распашки и порубки. Тѣ же, которые пашутся, обязательно пахать вдоль склона, а не сверху внизъ, чтобы весенняя вода задерживалась въ каждой бороздѣ и успѣвала впитываться въ землю. Вместо межей на склонахъ можно ставить столбы или сажать деревья.

Дороги надо прокладывать также вдоль склона очень покато и заворачивая ихъ, какъ можно чаще, петлями. Въ оврагахъ, которые уже образовались, надо сажать деревья, дѣлать поперекъ дна плетни изъ хвороста или живыхъ вѣтокъ, которая могутъ приняться и будуть задерживать воду, а главное глину и песокъ, которые она несетъ. Хорошо также въ большихъ оврагахъ устраивать пруды.

Ключи и источники.

Такова работа дождевой и снѣговой воды, которая стекаетъ по поверхности въ болѣе низкія мѣста. Продѣлимъ судьбу воды, которая впитывается въ землю.

Просачивающаяся внизъ вода проходитъ черезъ различныя горныя породы. Однѣ изъ нихъ, какъ напримѣръ, песокъ, черноземъ, пропускаютъ воду очень легко. Такія породы называются водопро-

ницаемыми. Другія породы, какъ лессъ, мергель, пропускаютъ ее съ большимъ или меньшимъ трудомъ и называются *полупроницаемыми*. Наконецъ, существуютъ породы, которыя задерживаютъ воду. Это породы *водонепроницаемыя* или *водоупорныя*. Къ послѣднимъ принадлежать различныя глины, которыя быстро напитываются водою въ верхнихъ слояхъ, а послѣ этого совершенно перестаютъ пропускать воду.

Просачивающаяся вода быстро проходитъ сквозь рыхлые и трещиноватыя водопроницаемыя породы, медлено пропитываетъ и просачивается сквозь полупроницаемыя, а дойдя до водоупорныхъ останавливается на нихъ и скопляется надъ ними въ видѣ водоноснаго горизонта. Водоупорныхъ слоевъ и водоносныхъ горизонтовъ въ каждомъ мѣстѣ можетъ быть нѣсколько, и они располагаются другъ надъ другомъ на различной глубинѣ. Изъ нихъ верхнія воды называются грунтовыми. Обыкновенные копаные колодцы пользуются именно этими водами. Колодецъ копаютъ до первого водоупорнаго слоя, надъ которымъ собирается вода.

Если верхній водонепроницаемый пластъ хотя слегка наклоненъ, то грунтовая вода, дойдя до него, начинаетъ болѣе или менѣе быстро стекать по его поверхности, а въ томъ мѣстѣ, где водоупорный пластъ прорѣзанъ оврагомъ или склономъ долины, вода пробивается наружу въ видѣ источника или ключа.

Въ нѣкоторыхъ породахъ вода движется медленно, она постепенно выходитъ на поверхность, и ключи смачиваются только склонъ, дѣлая его влажнымъ и грязнымъ. Въ другихъ подземныя струйки воды соединяются въ мощныя водяныя жилы, образующія очень сильные, богатые водою ключи.

Такъ изъ зеленыхъ песчаниковъ (Харьковская порода, см. дальше) во многихъ мѣстахъ бываютъ обильные и чистые родники. Таковы, напримѣръ, Карповскіе и Павловскіе источники, которыми пользуется водопроводъ Харькова, криница у с. Кочетка Зміевск. у. и ключъ близъ с. Мохната Зміевск. у. въ лѣсу, въ одной верстѣ внизъ по Донцу, дающій громадное количество отличной воды; ключъ Гремячій на землѣ с. Пятницкаго Волчанскаго у., близъ дороги на Печенѣги, и другой богатый ключъ въ лѣсу близъ того же села.

Въ мѣлу вода проходитъ по трещинамъ, и собирается часто мощными водяными жилами, выступающими въ обрывахъ въ видѣ бьющихъ ключей, напримѣръ близъ с. Балаклеи Изюмскаго у., у г. Бѣловодска и у Стрѣлецкаго коннаго завода Страбобѣльскаго у. Особенно же замѣчательенъ ключъ, находящійся у сл. Кременной Изюмскаго у. Онъ отличается замѣчательной чистотой и необычайнымъ обилиемъ воды, такъ что въ верстѣ отъ его истока на ручье, вытекающемъ изъ него, могла уже работать мельница.

Есть богатые ключи и изъ подмѣловыхъ песковъ, напримѣръ въ Цареборисовѣ и Студенкѣ Изюмскаго у.

Нерѣдко ключи даютъ начало рѣчкамъ. Такъ напримѣръ, рѣки Ахтырка, Сума, Можь, Тетлега берутъ начало изъ родниковъ.

Желѣзистые ключи.

Вода, просачивающаяся сквозь земные слои, растворяетъ нѣкоторыя составныя части, и выходитъ на склонахъ въ видѣ минеральныхъ ключей, содержащихъ эти вещества. Весьма обыкновеннымъ раствореннымъ веществомъ является желѣзо. Ключи, выходящіе изъ зеленыхъ песковъ и песчаниковъ, часто содержать желѣзистую воду, которая образуется вслѣдствіе разложенія зеленыхъ зеренъ минерала глауконита, содержащаго желѣзо. Желѣзистые ключи отличаются ржавымъ вкусомъ воды и ржаво-бурымъ осадкомъ, который выпадаетъ на днѣ ключа и на всякихъ предметахъ, попадающихъ въ его воду. Осадокъ этотъ состоитъ дѣйствительно изъ желѣзной ржавчины, выдѣляемой изъ воды особыми бактеріями.

Изъ желѣзистыхъ ключей наиболѣе интересны ключи у дер. Березовой Валковскаго у., въ 22 верстахъ отъ Харькова, и въ двухъ верстахъ отъ Люботина. Ключи, числомъ четыре, открываются въ балкѣ, впадающей въ долину р. Удъ. Всѣ вмѣстѣ даютъ до 40.000 ведеръ воды, имѣющей температуры $6\frac{1}{2}$ градусовъ. Главный изъ источниковъ даетъ до 28.000 ведеръ въ день. Кромѣ желѣза вода содержитъ извѣсть, соду и другія растворенные вещества. Эти минеральные части, выпадая, образуютъ желѣзистый осадокъ въ водѣ корки на днѣ. Такъ какъ воды такого состава полезны при нѣкоторыхъ болѣзняхъ, то въ Березовой была выстроена лѣчебница и „Березовскія минеральные воды“ пользовались одно время извѣстностью.

Желѣзистые ключи извѣстны также въ Сумскомъ, Ахтырскомъ, Валковскомъ, Харьковскомъ, Зміевскомъ и др. уѣздахъ.

Ключи, которые просачиваются у подножія песчаныхъ дюнъ, также содержать желѣзо, вымываемое ими изъ песковъ, хотя и въ очень небольшомъ количествѣ.

Извѣсткови- тые ключи.

Очень многіе ключи и колодцы имѣютъ „жесткую“ воду. Она непріятнаго вкуса и отличается тѣмъ, что мыло въ ней плохо мылится и чай плохо заваривается. При кипяченіи въ самоварахъ и посудѣ образуется много бѣлой накипи. Это происходитъ отъ содержанія въ водѣ растворенной извѣсти. Извѣсть обычно присутствуетъ въ очень небольшомъ количествѣ, но иногда ея такъ много, что, при выходѣ ключа на поверхность, она выдѣляется изъ раствора въ видѣ осадка, образующаго ноздреватый камень—прѣсноводный

туфъ. Растенія, попадающія на дно такого ключа, покрываются известковой коркой, и когда растеніе истлѣеть, въ туфахъ остаются его отпечатки.

Подобные туфы встрѣчаются въ Зміевскомъ уѣздѣ въ с. Кочеткѣ, на хуторѣ Арефьева и въ нѣсколькихъ другихъ мѣстахъ. Они представляютъ собою небольшія залежи бѣлаго или желтоватаго цвѣта, содержащія раковины и многочисленные отпечатки коры и листьевъ дуба, клена, камыша, осокъ и т. п. Въ настоящее время ключей въ этихъ мѣстахъ уже нѣтъ и образование туфовъ не происходитъ. Мѣстами ихъ ломаютъ для хозяйственныхъ нуждъ.

Другіе минеральные ключи въ нашей области встрѣчаются гораздо рѣже. Къ нимъ принадлежатъ соленые ключи, которые имѣются въ Изюмскомъ у., они открываются на днѣ Славянскихъ соляныхъ озеръ, или выходятъ на поверхность земли, напримѣръ, соленый источникъ у дер. Некременной близъ Славянска.

Оползни. По крутымъ берегамъ рѣкъ и овраговъ грунтовыя воды вызываютъ иногда оползни, то-есть перемѣщенія верхнихъ пластовъ. Въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ залегаетъ слой водоупорной глины, на немъ скопляется вода, верхняя часть глины пропитывается водою и дѣлается скользкой. Если водоупорный пластъ наклоненъ, или просто, если онъ выходитъ на крутой обрывъ, то лежащіе выше слои начинаютъ сползать къ обрыву, отдѣляются трещинами отъ высокой части берега, осѣдаютъ и обрушаиваются внизъ. Участки, захваченные оползнями, достигаютъ иногда большихъ размѣровъ—въ десятки саженей длиною. Глина, по которой ползетъ порода, при этомъ мнется, складывается въ мелкія складочки, скручивается

У насъ оползни представляютъ явленіе нерѣдкое. Въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ Харьковскій ярусъ прикрытъ сверху плотными слоистыми глинами, напримѣръ, въ окрестностяхъ Зміева, на многихъ обрывахъ можно наблюдать небольшіе оползни. Значительные размѣры имѣютъ оползни близъ Печенѣгъ Волчанск. у., въ Купянскѣ и во многихъ другихъ мѣстахъ.

Провальныя явленія. Грунтовыя и артезіанская воды производятъ нѣкоторое раствореніе породъ, сквозь которыя они проходятъ. Если породы эти мало растворимы, то результатъ растворенія не замѣтенъ, если же растворимость значительна, то изъ породы водою можетъ быть вынесено значительное количество вещества. Вода дѣлается минерализованной, а въ породахъ можетъ получиться полость, влекущая за собою провалъ. Такого рода провалами объясняютъ происхожденіе Славянскихъ

озеръ (см. географический очеркъ) и образованіе впадинъ и углубленій въ мѣстахъ, гдѣ залегаетъ каменная соль и гипсъ, напр. въ Изюмскомъ у. у хут. Макатихи и въ сосѣднихъ мѣстахъ Бахмутскаго у.

Тою же причиной, повидимому, вызвано было землетрясеніе въ Купянскомъ уѣздѣ 8 августа 1913 года около 5 час. утра. Въ городѣ Купянскѣ и во многихъ селахъ по Осколу верстъ на 60 (отъ Тополей до Пришиба) и въ поперечномъ направлениі на столько же (отъ Волосской Балаклейки до Сватовой Лучки) чувствовался сильный подземный ударъ и подземный глухой гулъ, продолжавшійся очень короткое время, но довольно сильно напугавшій жителей. Въ Купянскѣ большинство спавшихъ проснулось, стекла въ окнахъ и посуда дребезжали, двери открывались отъ сотрясенія, пролились жидкости изъ сосудовъ и т. д.

Такъ какъ Купянскъ и его уѣздъ лежитъ на мѣловой толщѣ, въ которой нерѣдко образуются трещины и подземные ходы, продѣланные водою, то, очевидно, землетрясеніе произошло вслѣдствіе подземнаго обвала въ какой-нибудь полости или пещерѣ, образовавшейся вслѣдствіе растворенія и вымыванія мѣла водою. Обвалъ, происшедшій на значительной глубинѣ, могъ остатся совершенно незамѣтнымъ на поверхности, но ударъ отъ обрушившейся кровли произвелъ сотрясеніе земли и глухой звукъ, замѣченныя на большомъ пространствѣ.

Работа рѣкъ. Вода дождей и тающихъ снѣговъ, стекающая по дну овраговъ, ключевая вода, струящаяся по склонамъ долинъ и дну балокъ, текутъ въ видѣ ручьевъ въ болѣе низкия мѣста. Ручьи сливаются другъ съ другомъ, образуютъ рѣки, которыя, принимая воду притоковъ и ключей, дѣлаются шире и полноводнѣе и, направляясь въ мѣста все болѣе низменныя, въ концѣ концовъ приносятъ свою воду въ море.

Вода ручьевъ и рѣкъ при своемъ движеніи производить нѣкоторую работу. При быстромъ теченіи—въ верховья, особенно въ горахъ, рѣка сильно размываетъ и разрушаетъ свое русло. Въ среднемъ теченіи и въ равнинной мѣстности рѣка течетъ медленнѣе. Она продолжаетъ размывающую работу, но мѣстами уже откладываетъ болѣе тяжелыя частицы, которыя несла, напримѣръ, крупный песокъ. Ближе къ устью теченіе все болѣе замедляется, на дно осѣдаютъ мелкія песчинки, а затѣмъ глинистые частицы, но мелкая муть все таки доносится до моря и отлагается на морскомъ днѣ.

Рѣки Харьковской губ. текутъ по равнинѣ и имѣютъ теченіе медленное. Наиболѣе быстры рѣки западной части губерніи, особенно Пселъ, остальная же только во время разлива пріоб-

рѣтаютъ значительную скорость. Лѣтомъ теченіе ихъ замедляется, въ нѣкоторыхъ дѣлается почти совершенно незамѣтнымъ.

Быстрота теченія одной и той же рѣки можетъ значительно измѣняться въ разныхъ частяхъ ея русла. Съ этимъ связано два явленія, наблюдавшіяся на нашихъ рѣкахъ—блужданіе русла и образованіе перекатовъ.

Блужданіе русла происходитъ отъ того, что въ глубокихъ мѣстахъ и посрединѣ вода движется быстрѣе, чѣмъ въ мелкихъ мѣстахъ и у береговъ, такъ какъ треніе воды обѣ дно и берега задерживаетъ теченіе. Мы можемъ наблюдать на всякихъ мелкихъ предметахъ, плывущихъ по поверхности рѣки, что въ срединѣ русла теченіе быстрѣе, чѣмъ у береговъ. Если рѣка течетъ не прямо, а описываетъ дугу, то самое быстрое теченіе приходится ближе къ вогнутому берегу, то-есть тому, въ который вдается рѣка. Поэтому, вогнутый берегъ подмывается и дѣлается крутымъ, а выпуклый берегъ, гдѣ теченіе замедленно треніемъ,—мелкій. Возлѣ него выпадаютъ насысы и образуется отмель.




Рис. 10. Блужданіе рѣчного русла. Образованіе заливного озера (старицы).

Если рѣка по какой-либо причинѣ, можетъ быть совершенно случайной, какъ наносъ изъ оврага, упавшее въ воду дерево, заростаніе дна травой, мѣняетъ свое прямое направленіе и описываетъ дугу, то вогнутый берегъ будетъ подмываться все болѣе, а выпуклый будетъ въ то же время выдвигаться въ видѣ отмели все дальше и дальше, пока рѣка не изогнется въ видѣ петли, иногда имѣющей форму правильной дуги въ половину круга и даже болѣе.

При этомъ можетъ наступить моментъ, когда во время разлива рѣка вдругъ промоетъ себѣ болѣе прямой и короткій путь, и теченіе направится по прямому рукаву. На границѣ между этимъ прямымъ протокомъ и дугообразнымъ рукавомъ

течение будетъ тихое. Здѣсь станутъ выпадать изъ воды рыхлые материалы, которые она несетъ, образуется наносъ и наконецъ кривой рукавъ можетъ отдѣлится отъ прямого протока совершенно, образовавши заливное озеро (или старицу).

Перекатами называются отмели, состоящія изъ песка и пересѣкающія все течение рѣки. Происхожденіе ихъ можетъ быть различно. Съ одной стороны, притоки, впадающіе въ рѣку, выносятъ въ нее иногда значительное количество осадковъ, которые накапливаются противъ устья, а затѣмъ передвигаются теченіемъ рѣки. Съ другой стороны, имѣеть значеніе то обстоятельство, что дно рѣки мѣстами понижается сильнѣе, мѣстами медленнѣе. Въ такихъ болѣе ровныхъ мѣстахъ весною происходитъ отложеніе осадковъ, которые лѣтомъ отчасти размываются.




Рис. 11. Р. Донецъ, правый берегъ. Козацька гора.

Вообще же, въ мѣстахъ мелкихъ, гдѣ треніе объ дно сильнѣе, можетъ легко происходить накопленіе осадковъ, и перекаты возрастаютъ. Это явленіе довольно рѣзко проявляется на рѣкахъ небольшихъ, въ которыхъ значительно измѣняется количество воды между весною и лѣтомъ, каковы рѣки Уды, Харьковъ, Бабка и др. Перекаты въ нихъ разбиваютъ всю рѣку на от-

дъльные ямы, которая къ концу лѣта соединяются только слабыми протоками, а иногда и совсѣмъ отдѣляются другъ отъ друга такъ, что русло распадается на рядъ маленькихъ озерковъ.

Наши рѣки текутъ въ широкихъ долинахъ, которая во множество разъ превосходятъ ширину ихъ русла. Повидимому, большинство долинъ имѣетъ очень древнее происхожденіе, именно они заложились еще въ то время, когда Украина освободилась въ послѣдній разъ отъ покрывавшаго ее моря. Большинство рѣкъ поэтому и течетъ въ тѣхъ направленіяхъ, въ какихъ лежитъ уклонъ окружающей мѣстности. Однако своей наибольшей ширины долины рѣкъ достигли, вѣроятно, въ ледниковый періодъ (см. ниже).

Долины рѣкъ, текущихъ къ югу или къ сѣверу, имѣютъ обычно правый берегъ крутой, а лѣвый пологий. Если же рѣка описываетъ дугу, выпуклую влѣво, то у лѣвого берега теченіе будетъ быстрѣе и онъ окажется крутымъ.

Террасы. Часто лѣвый берегъ долины, поднимающейся полого, образуетъ довольно рѣзкий уступъ, послѣ чего опять поднимается очень постепенно. Такихъ уступовъ или




Рис. 12. Строеніе рѣчной долины.

террасъ можетъ быть нѣсколько. Надъ дномъ долины, которое заливается во время разлива, и на которомъ лежатъ старицы и заливные озера, поднимается вторая или надлуговая терраса, обычно песчаная и покрытая сосновымъ лѣсомъ. На ней часто лежать большія озера — „лиманы“. Выше нея лежить иногда третья „возвышенная“ терраса. Болѣе высокія — трудно различимы, но и третья терраса никогда не достигаетъ такой высоты, какую имѣетъ правый берегъ. По правому берегу мѣстами тоже сохраняются узкие уступы, по высотѣ совершенно соотвѣтствующіе террасамъ лѣваго берега.

Террасы происходят от того, что река, впадающая в море, углубляет дно своей долины, пока не смоет все, что может унести ея движение. Течение ея делается все медленнее и размывающая работа прекращается. Если же в это время страна, где протекает река, начинает подниматься, или страна, где лежит море, начинает опускаться, то течение делается быстрее, сила реки возрастает, она начинает опять размывать свое русло, и на дне своей долины промывает новую долину—более узкую, но зато более глубокую. При этом река отклоняется преимущественно вправо, а съ левой стороны остаются части дна ея прежней долины—террасы и остатки ея старого русла или ея прежнихъ заливныхъ озеръ—террасовые озера.

Въ иныхъ случаяхъ террасы могли образоваться вслѣдствіе прорыва большихъ озеръ, лежавшихъ въ тѣхъ мѣстахъ, где образовалась рѣчнай долина. Слѣды такихъ озеровидныхъ расширений замѣтны въ долинахъ нѣкоторыхъ рекъ.

Террасы на лѣвомъ берегу—самое обыкновенное явленіе на большинствѣ нашихъ рекъ. На правомъ берегу онѣ гораздо реже. Примѣромъ можетъ служить терраса на Донцѣ у Коробова хутора близъ Зміева.

Выѣтрива- ніе горныхъ породъ.

Всѣ верхніе пласти земной коры постепенно измѣняются. Эти измѣненія происходятъ вслѣдствіе перемѣны температуры, отъ осадковъ, которые падаютъ на землю и просачиваются сквозь пласти, и отъ дѣятельности организмовъ. Днемъ породы нагреваются и расширяются, ночью остываютъ и сжимаются. Еще сильнѣ эти измѣненія происходятъ, если на нагрѣтую поверхность падаетъ холодный дождь. Расширение и сжатіе постепенно расшатываютъ породу, отдѣльные частицы ея начинаютъ отдѣляться другъ отъ друга, порода делается рыхлою. Еще важнѣе для выѣтриванія замерзаніе воды зимой и весной. Вода, попавшая въ трещины и впитавшаяся въ мельчайшія отверстія горной породы, замерзаетъ, а при замерзаніи она расширяется. Сила расширения очень велика, и во всѣхъ мельчайшихъ трещинахъ и щеляхъ замерзшая вода производить разрывы. Трещины растутъ, увеличиваются, вся порода распадается на глыбы, комки, разсыпается наконецъ на мелкие обломки. Въ то же время дождь и снѣгъ, проходя черезъ атмосферу, захватываютъ съ собою небольшое количество углекислоты, которая, проникая въ породу, разъѣдаетъ и разрушаетъ нѣкоторыя части ея. Такимъ же образомъ дѣйствуютъ корни растеній, которые съ одной стороны разъѣдаются породу, съ другой, разрастаясь, отдѣляютъ одну глыбу отъ другой. Гніющіе остатки растеній даютъ

кислоты, которая также действуют растворяющим и разъѣдающимъ образомъ.

Всѣ эти причины действуютъ одновременно, хотя и съ различною силой въ разныхъ мѣстностяхъ. Весь же ходъ разрушенія породы называется вывѣтреваніемъ.

На разныхъ породахъ вывѣтреваніе происходитъ различно. Такъ, твердые песчаники постепенно разбиваются трещинами на глыбы и куски, потомъ на мелкие обломки и наконецъ разсыпаются въ песокъ. Мягкіе песчаники, какъ напримѣръ, харьковская порода, быстро раздѣляются на глыбы, отъ которыхъ отдѣляются скорлупами слой за слоемъ, и глыбы, упавшія на дно оврага, за одну зиму обращаются въ груды щебня, песка и глины, уносимыхъ водою. Болѣе плотные куски держатся немного дольше. Вода, просачиваясь внутрь куска, растворяетъ желѣзо, содержащееся въ минералѣ главконитѣ, а затѣмъ при высыханіи желѣзо выпадаетъ изъ раствора и въ кускѣ породы образуются окрашенныя ржавчиной полосы, идущія одна внутри другой.

Мѣль отчасти распадается на правильные прямоугольные участки и потомъ щебень, отчасти растворяется водой. Твердый гранитъ подъ вліяніемъ вывѣтреванія постепенно превращается въ глину и песокъ.

Дюны. Значительныя песчаныя площади, имѣющіяся въ Харьковской губ., обыкновенно по лѣвымъ берегамъ рѣкъ, даютъ возможность наблюдать проявленія работы вѣтра. Всѣ площади голыхъ песковъ лѣтъ двѣстѣ назадъ были покрыты лѣсами, преимущественно сосновыми. Такъ, напримѣръ, у с. Малиновки Зміевск. у. среди сыпучихъ песковъ можно видѣть подъ слоемъ песка прослоекъ сосновыхъ иголь и коры, представляющей остатки не такъ давно уничтоженнаго лѣса. Вырубка лѣсовъ по берегамъ рѣкъ, а также пастьба и ъзда по песчанымъ площадямъ, уничтожили растительный покровъ и повели къ образованію дюнъ. Вѣтеръ, перекатывая и перенося песчинки съ мѣста на мѣсто, собираетъ ихъ въ бугры болѣе или менѣе правильной формы, называемые дюнами. Дюны вытягиваются рядами—цѣпями, иногда замѣтно параллельными теченію рѣки. Поверхность движущихся песковъ покрыта всегда рядомъ невысокихъ песчаныхъ грядочекъ, высота и разстояніе между которыми зависятъ отъ силы вѣтра. Грядки эти движутся при вѣтрѣ вслѣдствіе перекатыванія песка, а при перемѣнѣ направления вѣтра, меняютъ также и свое направленіе.

Дюнныя цѣпи тоже движутся постепенно въ томъ направленіи, куда дуютъ господствующіе въ данной мѣстности вѣtry.

Перенося песокъ съ одной стороны дюны на другую, вѣтеръ откладываетъ его слоями по крупности зерна. Поэтому въ старыхъ развѣянныхъ дюнахъ можно видѣть часто пересѣкающуюся, косую слоистость песка.

Песчинки дюнъ при своемъ движениі шлифуются другъ объ друга и дѣлаются округленными и гладкими. Въ хатахъ же, расположенныхъ на дюнахъ, стекла отъ ударовъ песчинокъ быстро становятся матовыми. При передвиженіи песка онъ шлифуетъ также куски камня, изрѣдка попадающіяся на дюнахъ, придавая имъ форму пирамидокъ, у которыхъ нѣкоторыя стороны выровнены и выглажены.

Отдѣльные дюны не достигаютъ большой высоты, но обыкновенно дюны собираются въ цѣпи, и высота ихъ при этомъ значительно возрастаетъ. Такія цѣпи въ нѣкоторыхъ мѣстахъ,



Рис. 13. Сыпучіе пески, заносящіе деревню.

напримѣръ близъ, с. Черкасскій Бишкінь Зміевскаго у., имѣютъ уже высоту 8—10 саж. и, подступая къ лугу своими крутыми склонами, производятъ впечатлѣніе еще большей высоты.

Во всѣхъ мѣстахъ, гдѣ дюны не тревожатся скотомъ и человѣкомъ, на нихъ постепенно развивается растительность, и они останавливаются. Если эта растительность охраняется отъ поврежденій, то вскорѣ корни растеній начинаютъ связывать песокъ, между отдѣльными кустиками появляется трава, и поверхность песка мало-по-малу затягивается растительнымъ покровомъ. Если же пески тревожатся пастьбой, Ѣздой или иногда

даже распахиваниемъ, то это ведеть къ быстрому уничтоженю растительности. Вѣтеръ начинаетъ выдувать съ нарушенныхъ площадей песокъ, перенося его на другое мѣсто, появляются лысины, иногда значительныя углубленія, которыя вѣтеръ расширяетъ, выдувая изъ подъ корней растеній песокъ и обнажая корни. Эти лысины, разростаясь, встречаются другъ съ другомъ, а вынесенный песокъ заносить въ это время другіе участки, иногда даже поля, огороды и усадьбы, принося нерѣдко значительные убытки. Кусты лозы при выдуваніи держатся дольше, благодаря своимъ длиннымъ корнямъ. Вѣтеръ выметаетъ песокъ возлѣ кустовъ, но въ ихъ густой листвѣ песокъ задерживается, падаетъ и насыпаетъ бугры. Лоза растетъ все выше и выше, по мѣрѣ того, какъ насыпается песокъ, и въ заключеніе вся мѣстность, съ такимъ постоянно разрушающимъ растительнымъ покровомъ, обращается въ чрезвычайно бугристую поверхность, на которой высокіе холмы съ густыми кустами шелюги перемежаются съ глубокими котловинами выдуванія и совершенно голыми склонами сыпучаго песка. Въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ лоза не

укоренилась, какъ слѣдуетъ, или ей слишкомъ вредить скотъ, корни ея также обнаруживаются, обдуваются вѣтромъ, кустъ усыхаєтъ, а бугры быстро разносятся вѣтромъ, обращаясь въ волнистую голую пустыню.

Фульгуриты. Электричество, находящееся въ атмосферѣ, служить причиной молніи. Молнія, попадая въ деревья и дома, нерѣдко зажигаетъ ихъ. Однако жаръ, который развиваетъ молнія, такъ великъ, что она можетъ расплавить даже камни. Такимъ именно образомъ у насъ образуются фульгуриты. Молнія, ударяя въ песокъ, расплавляетъ его; расплавленный песокъ растекается въ стороны и сейчасъ же застываетъ. Такъ получаются трубки въ палецъ толщиною, а длиной въ три-четыре сажени, сѣраго или желтоватаго цвѣта, внутри стекловатыя и гладкія, снаружи шероховатыя отъ приставшихъ къ нимъ песчинокъ, неровныя и ребристыя, похожія на вѣточки вяза. Трубки въ песокъ идутъ внизъ, слегка извиваясь, иногда разветвляются, становясь все тоньше и тоньше, пока достигнутъ толщины ниточки, и до-



Рис. 14. Фульгуритъ.

ходять до слоевъ пропитанныхъ грунтовой водой, гдѣ оканчиваются. Фульгуриты встречаются у насъ не рѣдко по берегамъ Донца между дюнами. Ихъ можно найти въ котловинахъ выдуванія, гдѣ обломки около вершка длиной скопляются при выдуваніи песка вѣтромъ. Народъ знаетъ о томъ, что молния оставляетъ въ земль свои слѣды, „громовыя стрѣлы“, но смѣшиваетъ ихъ съ нѣкоторыми окаменѣлостями (белемнитами) или орудіями доисторического человѣка.

Геологическое прошлое Харьковской губерніи.

Было когда-то время, когда земной шаръ представлялъ собою полужидкую раскаленную свѣтящуюся массу, похожую на солнце, а потомъ постепенно началъ остывать. Остывшіе верхніе слои затвердѣли, образовавъ на поверхности сравнительно тонкую корку — земную кору. Послѣ образованія земной коры на ея поверхность осѣли сгустившіеся водяные пары, и получились океаны и моря, а снаружи осталась еще оболочка изъ воздуха — атмосфера.

Милліоны лѣтъ прошли съ тѣхъ поръ, но внутри земли до сихъ поръ остается раскаленное, вѣроятно, полужидкое ядро, которое продолжаетъ медленно остывать. Остывая, ядро сжимается, а твердая земная кора собирается въ складки, прогибаясь въ одномъ мѣстѣ и поднимаясь въ другомъ. Такъ образуются горные цѣпи и глубокія продольныя впадины. При образованіи горныхъ складокъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ возникаютъ трещины, и участки земной коры осѣдаютъ толчками, которые вызываютъ на поверхности землетрясенія. Мѣстами вдоль трещинъ образуются отверстія, сквозь которыхъ вырываются раскаленные пары и газы и выливаются расплавленныя горныя породы — происходятъ изверженія вулкановъ.

Если на берегу моря начинается опусканіе, то море заливаетъ сушу все больше и больше, но когда начнется поднятіе, то дно морское снова выступаетъ изъ воды и дѣлается сушею. Такія перемѣщенія земной поверхности происходятъ чрезвычайно медленно, но зато безпрерывно. И въ настоящее время есть мѣста на землѣ, которыя выступаютъ изъ воды, напримѣръ въ Швеціи, и есть мѣста, которыя постепенно затопляются моремъ, напримѣръ, Голландія. Почти во всякомъ мѣстѣ мы можемъ доказать, что здѣсь было когда-то дно морское, а многія мѣста, какъ и Харьковская губ., затоплялись моремъ по нѣскольку разъ.

Всѣ эти измѣненія земной поверхности происходятъ отъ дѣйствія внутреннихъ силъ земли, остатковъ того жара, который сохранился въ земномъ ядрѣ.

Другія измѣненія имѣютъ причиной силу, находящуюся въ земли—солнечную теплоту. Солнце нагрѣваетъ океаны и моря, паръ поднимается вверхъ, переносится изъ одного мѣста въ другое въ видѣ облаковъ, и падаетъ опять на землю дождемъ и снѣгомъ. Ручьи и рѣки, стекая съ высокихъ мѣстъ въ низкія, смываютъ съ собою песокъ и глину, и несутъ ихъ въ море, гдѣ откладываются цѣлые слои ихъ.

Отъ неравномѣрнаго нагрѣванія солнцемъ разныхъ мѣстъ начинается движение воздуха—вѣтеръ. Вѣтеръ поднимаетъ въ морѣ волны, а волны разрушаютъ берега. Обломки, оторванные отъ берега, измельчаются, окатываются и ложатся опять на дно моря.

На днѣ моря и въ водѣ на разныхъ глубинахъ живутъ различныя животныя. Ихъ остатки послѣ смерти падаютъ на дно, здѣсь мягкая части разрушаются, а твердая иногда могутъ сохраняться. Если остатки эти будутъ быстро занесены осадками—пескомъ глиной, и т. п., то они могутъ оставить на породѣ свой отпечатокъ, или же пропитаться какими-нибудь растворами—известью, желѣзомъ, кремнемъ и тогда отвердѣваютъ, обращаются въ окаменѣлости.

Уже давно было замѣчено, что въ самыхъ глубокихъ, стало быть и самыхъ древнихъ, слояхъ находятся остатки животныхъ, которыхъ теперь совершенно нѣтъ на свѣтѣ, и которыя совсѣмъ не похожи на нынѣ живущихъ. Въ болѣе высокихъ слояхъ попадаются животныя вымершія, но болѣе похожія на нынѣшнихъ. А въ самыхъ верхнихъ пластахъ мы встрѣчаемъ отчасти животныхъ, которыя живутъ и сейчасъ, отчасти очень похожихъ на нынѣ живущихъ.

Вотъ по этимъ остаткамъ животныхъ судятъ о древности различныхъ пластовъ. Чѣмъ меньше нынѣ живущихъ и похожихъ на нихъ животныхъ встрѣчается въ отложеніяхъ, тѣмъ они считаются древнѣе. Изучая ископаемыхъ животныхъ и самыя осадочные горныя породы, которыя ихъ заключаютъ, мы можемъ опредѣлить не только возрастъ пласта, но часто и тѣ условія, при которыхъ эти слои откладывались.

Всѣ слои земли раздѣляются по возрасту на *системы*, изъ которыхъ многія можно встрѣтить и на пространствѣ Харьковской губерніи. На прилагаемой таблицѣ отложенія написаны одни надъ другими въ томъ порядкѣ, въ какомъ они залегаютъ другъ надъ другомъ¹⁾.

1) Названія системъ даны имъ въ тѣхъ странахъ, гдѣ та или другая система выходитъ на поверхность по имени самой мѣстности (напр., Пермская въ Пермской губ.), другія системы получили названія отъ горныхъ породъ, которыя они заключаютъ (Каменноугольная, Мѣловая), отъ древнихъ племенъ, жившихъ въ мѣстѣ, гдѣ развиты соотвѣтствующія отложенія, и проч.

Геологическая системы	Отложение, наблюдаемые въ Харьков- ской губерніи	
Четвертичная	{ Современные отложения. Рѣчные пески, овражные наносы, торфъ и пр. Ледниковые отложения. Лессовые суглинки. Валунные глины. Мергеля. Пестрыя глины.	
Третичная	{ Полтавский ярусъ. Харьковский ярусъ. Кievский ярусъ. Бучакский ярусъ.	{ Бѣлые мелкие пески. Желѣзистые песчаники. Зеленые глинистые песчаники и пески. Голубой мергель. Фосфоритовые пески.
Мѣловая	{ Мѣль и мѣловые мергеля. Пески съ фосфоритами.	
Юрская	{ Глины, песчаники. Известняки. Песчаники.	
Триасъ		Песчаники, известняки, глины.
Пермская		Пестрыя глины, доломиты, гипсъ, соль.
Каменноугольная		Песчаники, известняки, глинистые сланцы, каменный уголь.
Девонская		
Силурійская		
Кембрійская		На поверхность не выходятъ.
Альгонкская		
Архейская		

Каменно-угольная система.

Самые древние отложения, которые встречаются въ Харьковской губ.—это отложения каменоугольной системы. Они наблюдаются въ Изюмскомъ у. по р. Мокрой Беречкѣ, у с. Петровскаго, по Берекѣ у Княгинина Лимана, у Великой Камышевахи, по Корулькѣ у Бородаева, между Бычкомъ и Торцомъ по р. Грузской, по Осколу у Цареборисова и въ Купянскомъ у. у сл. Кременной.

Каменоугольные отложения состоять изъ глинистыхъ пестрыхъ сланцевъ, глинистыхъ сѣрыхъ известняковъ и крупнозернистыхъ песчаниковъ, содержащихъ обломки окаменѣлыхъ стволовъ хвойныхъ деревьевъ. Въ песчаникахъ, глинахъ и глинистыхъ сланцахъ попадаются иногда отпечатки растений, а также прослои угольной сажи и небольшіе пласти каменного угля, которые въ нѣкоторыхъ мѣстахъ даже разрабатывались.

Нахождение углистыхъ отпечатковъ растений въ окружающихъ породахъ, и иногда на поверхности каменного угля, объясняетъ намъ, какъ образовались пласти угля, представляющаго собою одно изъ самыхъ важныхъ ископаемыхъ богатствъ. По мелкимъ




Рис. 15. Отпечатокъ папоротникообразного растенія изъ каменоугольныхъ отложений.

Рис. 16. Отпечатокъ папоротникообразного растенія изъ каменоугольныхъ отложений.

побережьямъ древняго моря или въ прибрежныхъ болотахъ развивалась когда-то богатая растительность. Части растеній—листья, вѣтки, стебли, споры—и цѣлые стволы, подгнившіе внизу, падали въ воду, накопляясь толстыми пластами, подобно тому, какъ это происходит въ современныхъ торфяникахъ. Рѣки сносили къ устью стволы упавшихъ деревьевъ. Всѣ эти растительные остатки подвергались подъ водою медленному броженію и

обугливанію. Если такие пласты заносились пескомъ и глиной, то они съ течениемъ времени уплотнялись и обращались въ каменный уголь, въ которомъ слѣды растеній обыкновенно совсѣмъ не замѣтны простымъ глазомъ. Однако, послѣ нѣкоторой обработки, можно подъ микроскопомъ увидѣть растительное строеніе угля. Въ тѣхъ же случаяхъ, когда въ песчаные и глинистые наносы попадали отдельные растенія, они оставляли тамъ свой нѣжный отпечатокъ, иногда покрытый тончайшимъ налетомъ углистой пыли.

Растенія, которыя дали начало каменному углю, совершенно не похожи на нынѣшнія. Это отчасти громадныя деревья, родственная нынѣ живущимъ хвоющимъ и плаунамъ, отчасти растенія, по виду очень напоминающія современные папоротники. Цвѣтковыхъ растеній въ то время совершенно не было. По характеру растеній и ихъ многочисленности заключаются, что въ то время, когда они росли, господствовалъ сырой и жаркій климатъ.

Прослои известняковъ, заключающіе изрѣдка окаменѣлые раковины, указываютъ, что во время каменноугольного периода море затопляло временно свое побережье, и на днѣ его въ это время откладывался известнякъ.

Пермская система.

Каменноугольныя отложения кверху переходять въ болѣе молодыя пермскія. Въ Изюмскомъ у. встрѣчаются главнымъ образомъ переходные, а также самые нижніе пермскіе слои, по верхнему теченію р. Корульки, гдѣ выходятъ всѣ ихъ отдельны, между р. Голой Долиной и Донцомъ – отъ с. Христища до Бессарабовки и Славянска на Донцѣ; у Дроновки по Маячкѣ и Бычку и по Грузской.

Переходныя отложения состоятъ изъ красныхъ и зеленоватыхъ песчаниковъ и пестрыхъ глинъ, выше лежать известняки, отчасти доломитовые, и также съ прослойями пестрыхъ глинъ, еще выше пермскія красныя и зеленыя глины и мергели съ гипсомъ, ангидритомъ и каменною солью. Изъ этихъ слоевъ вытекаютъ соленые ключи, питающіе Славянскія озера.

Въ нижнихъ песчаникахъ встречаются изрѣдка отпечатки растеній и ядра раковинъ. Въ известняковой толщѣ мѣстами попадаются многочисленныя окаменѣлости морскихъ раковинъ и другихъ животныхъ. Въ верхней соленосной глинистой толщѣ наиболѣе интересными являются прослои гипса и каменной соли, которые разрабатываются и которые указываютъ намъ, что въ Изюмскомъ и Бахмутскомъ уѣздахъ въ началѣ пермской эпохи находился закрытый морской заливъ, гдѣ вода сильно испарялась и соли изъ нея осѣдали на дно, и образовали пласты каменной соли и гипса, послѣ занесенные другими осадками.

На Казенномъ Торцѣ можно наблюдать, что каменноугольные, переходные и пермскія отложенія образуютъ выпуклую складку, длина которой лежить по направленію съ сѣверо-запада на юго-востокъ. Вершина ея размыта между р. Маячкой и Казеннымъ Торцомъ. Если будемъ двигаться по Казенному Торцу отъ балки Бузиноватой до впаденія рѣчки Бѣленькой, то на лѣвомъ берегу мы встрѣтимъ всѣ каменноугольные, переходные и пермскіе слои, которые здѣсь образуютъ сѣверо-восточное крыло складки.

Другіе выходы каменноугольныхъ и пермскихъ отложеній представляютъ гребни складокъ, имѣвшихъ такое же направленіе, но сильно размытыхъ въ послѣдующее время.

Тріасовая система.

Тріасовыя отложенія окружаютъ довольно широкой каймою славянскую площадь доломитовъ и соленосныхъ глинъ, встрѣчаются къ юго-западу отсюда широкой полосой по р. Копанкѣ и въ нѣкоторыхъ другихъ мѣстахъ Изюмского у.

Они состоятъ изъ известковистыхъ желтовато-сѣрыхъ песчаниковъ, со сростками известняковъ; полосатыхъ вишневыхъ и зеленыхъ глинъ, сланцеватыхъ и песчанистыхъ. Никакихъ ископаемыхъ остатковъ не найдено. Толщина всѣхъ тріасовыхъ отложений у насъ доходитъ до 25 сажень.

Юрская система.

Распространена въ Изюмскомъ уѣздѣ и ближайшихъ мѣстахъ Купянского и Зміевскаго, отъ Протопоповки и Изюма на юго-западъ до границы Харьковской губ. Есть выходы пластовъ по Бритаю, по Берекѣ, по Донцу у Закотнаго и въ другихъ мѣстахъ.




Рис. 17. Брахіоподы, окаменѣлія морскія раковины изъ юрскихъ отложеній. Изюмскій у.



Рис. 18. Игла морскаго ежа. Юрскія отложенія. Святыя горы.



Отложенія юрской системы внизу состоятъ изъ сѣрыхъ и бурыхъ глинистыхъ сланцевъ и глинъ, содержащихъ различныя морскія окаменѣлости, въ томъ числѣ раковины вымершихъ мол-

люсковъ—аммонитовъ, напоминающія по виду рога козла, и острые стержни—остатки морскихъ каракатицъ—белемниты, которые въ народѣ называются „чертовыми пальцами“. Кверху толща дѣлается песчанистой и содержитъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, особенно у с. Каменки множество отпечатковъ наземныхъ растеній.

Выше идетъ толща известняковъ, достигающая 20 саженей. Она отчасти состоитъ изъ круглыхъ мелкихъ шариковъ и содержитъ скопленія морскихъ раковинъ, отчасти изъ плотныхъ известняковъ съ многочисленными аммонитами и другими морскими окаменѣлостями.




Рис. 19. Аммониты. Окаменѣлые раковины изъ юрскихъ отложений. Изюмскій у.

Самые верхніе пласты состоять изъ зеленовато-бурыхъ песковъ содержащихъ иногда стяженія въ видѣ рогулекъ. Эту толщу можно наблюдать въ Протопоповкѣ, на горѣ Кременецъ, въ Святыхъ горахъ, по р. Каменкѣ, Бритаю.

Всѣ отложения юрской системы достигаютъ мощности до 150 саженъ.

Мѣловая система.

Въ первую половину мѣлового периода Харьковская губ. представляла собою сушу, но во вторую половину море опять заливаетъ почти всю лѣвобережную Украину, Польшу; на востокѣ оно широкой полосой уходитъ въ Азію, на югъ захватываетъ Кавказъ и Крымъ.

Въ нашей мѣстности отложения этого моря состоятъ изъ зеленыхъ песковъ съ фосфоритами, покрытыхъ громадной толщей

бѣлаго мѣла, Юрскіе пласти, подстилающіе мѣловыя отложенія, образуютъ громадную складку, проходящую черезъ всю губернію съ сѣверо-запада на юго-востокъ. Складка эта покрывается песками, которые выступаютъ на поверхность на ея южномъ крылѣ—по Донцу и нѣкоторымъ лѣвымъ его притокамъ. Въ сѣверномъ крылѣ складки пески появляются на поверхности только въ Курской губ. (у Курска, выше Старого Оскола) и въ Воронежской губ. Чѣмъ ближе къ срединѣ Харьковской губ., тѣмъ глубже уходятъ пески. Такъ, въ Харьковѣ они лежать на глубинѣ около трехсотъ саженей.

Пески содержать небольшіе—въ орѣхъ или въ яблоко величиной, округлые стяженія минерала фосфорита, и въ средней части губерніи очень богаты водой, которой пользуются многіе артезіанскіе колодцы.

Въ отложеніяхъ этого возраста въ горѣ Кременецѣ были найдены кости ископаемаго морскаго пресмыкающагося—плезіозавра. Это было хищное животное съ длинной шеей и сильными конечностями, прекрасно плававшее въ открытомъ морѣ.



Рис. 20. Предполагаемый внешний видъ плезіозавра.

Лежащая выше песковъ толща состоитъ изъ мѣла; отчасти совершенно чистаго, бѣлоснѣжнаго, который называютъ пишущимъ мѣломъ, отчасти съ примѣсью глины, отчего онъ переходитъ въ мѣловой мергель сѣроватого или голубоватого цвѣта. Мѣловые пласти выполняютъ упомянутую складку такимъ образомъ, что посерединѣ—на линіи Лебединъ, Богодуховъ, Харьковъ, Чугуевъ, они достигаетъ наибольшей мощности, около полуверсты, а на

съверо востокъ и юго-западъ отъ этой линіи они дѣлаются все тоныше и тоныше. При этомъ верхняя поверхность мѣловой толщи образуетъ желобъ, того же направленія, какъ и нижня поверхность, наполненный болѣе молодыми—третичными отложеніями. Въ средней части этого желоба мѣлъ совершенно скрывается на глубинѣ, но на нѣкоторомъ разстояніи онъ выходитъ на поверхность и занимаетъ весьма значительную площади въ Харьковской губерніи.




Рис. 21. Геологический разрѣз горы Кременецъ. 1—бѣлый мѣлъ, 2—мѣловые пески, 3—песчанистый, 4—известковый, 5—песчано-глинистый ярусы юрскихъ отложений.

Изучая мѣлъ подъ микроскопомъ послѣ нѣкоторой обработки можно увидѣть, что вся масса его сложена изъ мельчайшихъ скорлупокъ животныхъ, состоящихъ изъ извести. Встрѣчаются также мельчайшіе остатки кремневыхъ губокъ и другихъ животныхъ. Часто мѣлъ уже сильно измѣненъ просачиваніемъ воды и другими причинами, и не обнаруживаетъ никакихъ слѣдовъ своего происхожденія. По той же причинѣ кремневые организмы растворены, а изъ раствора мѣстами опять выдѣлился кремень, образовавши въ мѣлу стяженія разнообразной формы, иногда даже цѣлые прослои.

Изрѣдка въ мѣлу попадаются и крупные ископаемые остатки: отпечатки губокъ, раковины устрицъ и другихъ животныхъ, но чаще всего остатки вымершихъ каракатицъ—белемниты.

Всѣ эти остатки указываютъ, что мѣлъ откладывался на днѣ глубокаго моря, такъ какъ подобныя отложенія и въ настоящее время образуются въ нѣкоторыхъ мѣстахъ океановъ.

Мѣлъ разбить часто на болѣе или менѣе правильныя глыбы трещинами, по которымъ сквозь толщу проходитъ вода.



Рис. 22. Белемнитъ изъ мѣла. Сумской уѣзда.

**Третичная
система.**

Верхніе пласти мѣла прикрыты третичными отложеніями. Въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ граница между тѣми и другими видна, напримѣръ, у Верхняго Салтова Волчанского у., замѣтно, что верхняя поверхность мѣла размыта, она неправильно волнистая, мѣстами понижается. Часто на границѣ лежить прослоекъ окатанныхъ галекъ, кремней, фосфоритовыхъ конкреций и мѣловыхъ окаменѣлостей. Все это указываетъ, что въ концѣ мѣлового периода наша мѣстность выступила изъ подъ морского уровня, но въ началѣ третичнаго опять была покрыта моремъ, которое, наступая, размывало мѣловыя отложенія и отложило прежде всего вымытые изъ мѣла же кремни, конкреции и окаменѣлости.

Третичные отложенія у насъ дѣлятся на четыре яруса.

Бучакский ярусъ, самый нижній изъ нихъ, состоитъ изъ зеленовато-сѣрыхъ главконитовыхъ песковъ съ фосфоритами, мѣстами переходитъ въ песчаникъ. У Верхняго Салтова Волчанского у., и особенно у с. Савинецъ Изюмскаго у., также, какъ и въ другихъ мѣстахъ, въ этихъ пескахъ встрѣчаются многочисленные окаменѣлые стволы деревьевъ, прекрасно сохранившіе строеніе дерева и источенные многочисленными ходами. Деревья эти родственны нынѣшнимъ кипарисамъ, а ходы въ нихъ сдѣланы были въ то время, когда дерево только что упало на дно моря, сверлящими моллюсками, близкими къ нынѣ живущимъ, сверлящимъ деревянное дно кораблей. У с. Осинового Старобѣльскаго у. въ пластахъ глины и песчаника, кромѣ такихъ же стволовъ, найдены отпечатки листьевъ, шишекъ хвойныхъ растеній и раковины ископаемыхъ моллюсковъ.

Кievский ярусъ, получившій свое имя отъ того, что его отложенія очень распространены въ Киевской губ., состоитъ изъ зеленовато-голубого мергеля, то-есть известковистой глины, нѣжной и лѣпной. Онъ представляетъ собою отложенія того же моря, но болѣе глубоководныя. Кромѣ мельчайшихъ остатковъ въ немъ встрѣчаются чешуйки, отпечатки и зубы рыбъ, раковины моллюсковъ. Толщина Киевскаго яруса у насъ около 5 сажень.

Отложенія Киевскаго яруса захватываютъ восточную половину Киевской губ., южную часть Черниговской, почти всю Полтавскую, западную половину Харьковской и сѣверную окраину Екатеринославской.

Харьковский ярусъ, очень распространенный въ Харьковской губ., состоитъ изъ болѣе крупнозернистыхъ породъ—зеленыхъ главконитовыхъ глинистыхъ песчаниковъ, отчасти глинъ и песковъ. Зеленая главконитовая зерна содержать желѣзо. Поэтому при выѣтриваніи Харьковской породы желѣзо выдѣляется, и порода дѣляется желтой и покрывается ржавыми пятнами и полосами.

По той же причинѣ и ключи, вытекающіе изъ Харьковскаго яруса, часто имѣютъ желѣзистую воду. Отложенія его имѣютъ толщину до 25 саженъ.




Рис. 23. Геологический разрѣзъ въ Верхнемъ Салтовѣ. Оврагъ Долгій. 1—четвертичнаго отложенія, 2—главконитовый песчаникъ харьковскаго яруса, 3—голубой мергель кіевскаго яр., 4—зеленоватые и 5—сѣроватые пески бучакскаго яруса, 6—мѣль.

Остатки крупныхъ ископаемыхъ въ Харьковскомъ ярусе очень рѣдки, потому что онъ хорошо пропускаетъ воду, растворяющую ихъ; что же касается мелкихъ, то довольно многочисленны кремнистые остатки микроскопическихъ животныхъ и растеній. Простымъ глазомъ можно замѣтить иглы кремневыхъ губокъ, похожія на шелковистыя ниточки. Изъ другихъ ископаемыхъ находятся остатки морскихъ животныхъ—мшанокъ, похожіе на развѣтвляющіеся кустики, состоящіе изъ тоненькихъ ячеекъ. Изрѣдка находили зубы и отпечатки рыбъ, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ неясные и грубые отпечатки раковинъ, напримѣръ, у с. Шпилевки Сумскаго у., гдѣ они весьма многочисленны. Въ Зміевскомъ у. близъ Коробова хутора, и въ Изюмскомъ—въ Бугаевкѣ, были найдены громадные позвонки вымершаго кита—зейглодона. Подобные остатки уже извѣстны изъ разныхъ мѣстъ. Самые лучшіе скелеты, найденные въ Египтѣ и Америкѣ, даютъ возможность изобразить, какой видъ имѣло животное. Это былъ крупный, до 10 саженъ длиною, китъ, съ большою, длинной головой, съ острыми зазубренными зубами, маленькими передними ногами, которыми онъ могъ пользоваться, какъ плавниками, и съ хвостовымъ плавникомъ. Въ кожѣ его были костяные пластинки, образовывавшіе на спинѣ гребень для свободнаго разрѣзанія воды.

Отложенія Харьковскаго яруса распространяются очень широко. Въ это время нижне-третичное море разлилось на большое пространство—по Могилевской, Черниговской, Орловской, Курской, Харьковской, Киевской, Полтавской и Екатеринославской губ. Къ западу оно соединялось рукавомъ черезъ Волынскую, Виленскую

и Гродненскую губерніи съ моремъ, покрывавшимъ съверную Германію, къ востоку направлялось въ Поволже—Симбирскую и Саратовскую губ. и доходило до Аральского моря и Персіи.




Рис. 24. Предполагаемый виѣшній видъ зейглодона, вымершаго кита изъ харьковскаго яруса.

Полтавский ярусъ, развитый очень широко въ Полтавской губ., у насъ также весьма распространенъ. Его отложенія состоять изъ бѣлыхъ, желтыхъ и красныхъ песковъ, часто переходящихъ въ бѣлые, вишневые, красно-бурые желѣзистые песчаники. Пески весьма мелки, мучнисты, иногда отличаются замѣчательной бѣлизной, напримѣръ, у с. Гомольши Зміевскаго у., иногда окрашены въ очень разнообразные и красивые цвѣта—красные, оранжевые, фioletовые (между Курганомъ и Азакомъ въ Лебединскомъ у., у Ахтырскаго монастыря). Иногда въ верхнихъ слояхъ пески эти содержатъ пропластки хорошихъ лѣпныхъ глинъ. Часто въ нихъ попадаются песчанистые стяженія въ видѣ шаровъ или разныхъ фигурокъ. Ископаемые остатки въ Полтавскомъ ярусе крайнѣ рѣдки. Въ Полтавской и Киевской губ. въ нихъ находятъ изрѣдка янтарь—окаменѣлую смолу хвойныхъ деревьевъ, въ Курской (г. Тимъ) многочисленные отпечатки листьевъ растеній, по которымъ можно заключить, что климатъ въ это время былъ въ нашей мѣстности очень жаркій.

Отложенія Полтавского яруса покрываютъ отложенія Харьковскаго почти на всемъ пространствѣ, но представляютъ собою осадокъ болѣе мелкаго моря, которое не только начало въ это время мельтѣть, покрываться островками, съ которыхъ на дно моря попадали листья деревьевъ, но и начало отступать быстро къ югу, такъ что во второй половинѣ третичнаго периода Харьковская губ. уже выступаетъ на поверхность и съ тѣхъ поръ остается сушею донынѣ.

Четвертичная система.

Сверху полтавскихъ песковъ залегаютъ разныя отложенія образовавшіяся на сушѣ—тѣ же пески, перемытые рѣками или оврагами, отложенія озеръ,

пестрыя глины по склонамъ долинъ. Всѣ эти осадки не имѣютъ значительного распространенія. Гораздо шире ихъ распространены отложенія, происхожденіе которыхъ, несомнѣнно, связано съ ледниковымъ періодомъ.

Въ теченіе этого періода климатъ во всемъ сѣверномъ полушаріи сдѣлался значительно холоднѣе, и значительная часть сѣверной Европы покрылась толстымъ слоемъ льда. Громадный ледникъ захватывалъ большую часть Россіи и спускался далеко къ югу двумя большими языками по Днѣпру и по Дону (рис. 25).



Рис. 25. Карта великаго ледника на поверхности Европейской Россіи (ледникъ зачерченъ).

Въ Харьковской губ. льдомъ была покрыта только самая западная окраина: часть Сумского и Лебединского уѣздовъ, въ которыхъ ледникъ оставилъ свои слѣды въ видѣ валуновъ, то-есть округленныхъ и отшлифованныхъ камней, занесенныхъ льдомъ изъ тѣхъ местностей, по которымъ онъ двигался. Среди валуновъ нерѣдко попадаются куски финляндскаго гранита и другихъ породъ, которыхъ не встрѣчаются нигдѣ по близости, и указываютъ намъ

путь, который проходилъ ледникъ прежде, чѣмъ попалъ въ нашу мѣстность. Нѣкоторые изъ валуновъ, найденныхъ въ Харьковской губ., поражаютъ своими размѣрами и указываютъ, что даже здѣсь, на самомъ краю своеемъ, гдѣ подъ вліяніемъ болѣе теплого климата ледъ уже весь растаивалъ, все же онъ имѣлъ, очевидно, значительную толщину и силу движенія (рис. 26). Граница валуновъ въ Харьковской г. проходитъ западнѣе р. Псла.



Рис. 26. Громадный гранитный валунъ, находящійся въ долинѣ Сулы къ востоку отъ г. Недригайлова Лебединскаго уѣзда.

Другими слѣдами ледника на той же западной окраинѣ нашей губернії являются ледниковые озера, возникшія изъ талыхъ водъ въ то время, когда ледникъ уже отступалъ, и обратившіяся вслѣдствіи въ торфяники. Наконецъ, къ слѣдамъ его же относятся и ледниковые долины. Долины эти имѣли совершенно иное направленіе и расположеніе, чѣмъ теперь, ибо таяніе льда происходило постепенно—въ разныхъ мѣстахъ въ различное время, и въ освобожденныхъ отъ льда мѣстахъ ледниковые потоки прокладывали себѣ русло, которое, послѣ отступанія ледника, оказывалось уже неподходящимъ для рѣкъ, стекающихъ съ поверхности, лишенной ледниковой толщи.

Примѣрами ледниковыхъ явлений этого рода, кромѣ указаныхъ выше (стр. 7), могутъ служить мѣстность между Лебединомъ и Ахтыркой въ Лебединскомъ у., гдѣ верховья р. Груни и Олешни (притокъ Ворсклы) подходятъ близко другъ къ другу,

и на пространствѣ отъ Чупаховки до Олешни соединены широчайшей долиной съ высокими крутыми склонами, по которой въ настоящее время не протекаетъ никакая рѣка. На продолженіи той же ледниковой долины рѣченки Грунь и Татань текутъ прямо навстрѣчу другъ другу и сходятся въ болотѣ и озерѣ у с. Камыши. Къ югу отъ Бѣлополья между с. Николаевкой и Марковкой находится болотистая балка, соединяющая долины Вира и Сулы и представляющая собою тоже ледниковую долину.

Изъ отложеній ледникового періода самыемъ распространеннымъ является желто-бурый суглинокъ, который часто называютъ лессовиднымъ, такъ какъ онъ обнаруживаетъ нѣкоторое сходство съ лессомъ Китая, представляющимъ собою мощное скопленіе желтой пыли, вынесенной вѣтрами изъ центральной Азіи. Нашъ суглинокъ представляетъ собою довольно грубую на ощупь тяжелую породу, твердую въ сухомъ видѣ, но легко размокающую. Онъ не слоистъ, откалывается столбиками и даетъ крутые, часто отвесные обрывы. Порода пронизана тонкими трубочками, отверстиями отъ корней, по которымъ, какъ и по трещинамъ, часто замѣчается бѣлый налетъ извести. Известь скапливается также мѣстами въ видѣ крупныхъ бѣлыхъ комковъ окружной или вытянутой формы. Нерѣдко эти стяженія извести образуютъ цѣлые прослои. Въ толщѣ желто-бурыхъ суглинковъ часто замѣтны круглые, черные пятна, это кротовины—слѣды норъ разныхъ роющихъ животныхъ.

Желто-бурые суглинки многіе изслѣдователи считаютъ такъ же скопленіями пыли, вынесенной вѣтрами съ окраины ледника, при его таяніи, такъ какъ онъ покрываются, какъ плащемъ, всѣ болѣе древнія отложения и встрѣчаются какъ на водораздѣлахъ, такъ и на склонахъ, какъ на высокихъ, такъ и на низкихъ мѣстахъ. Другіе видятъ въ суглинкахъ результатъ осажденія тонкой мути, отлагавшейся маленькими ручейками. Есть и иныхъ объясненія ихъ происхожденія.

Въ желто-буромъ суглинкѣ встрѣчаются нерѣдко остатки крупныхъ вымершихъ животныхъ—мамонта и носорога. Мамонтъ (рис. 27)—огромный слонъ, жившій по окраинѣ ледника, отличался громадными передними зубами—бивнями, и сложными коренными зубами, состоявшими изъ многочисленныхъ складокъ эмали, и приспособленными для перетирания большого количества травы и молодыхъ вѣтвей (рис. 28). Въ Сибири были находимы въ мерзломъ грунте трупы мамонтовъ съ сохранившейся шкурой, которые показали, что мамонтъ былъ покрытъ густою рыжей шерстью, защищавшей его отъ мороза. Перегородчатоносый носорогъ (рис. 29)—крупное животное съ двумя рогами на носу




Рис. 27. Предполагаемый ви́шний видъ мамонта.

и съ ноздрями, раздѣленными костяной перегородкой, былъ тоже покрытъ теплою шерстью. Неоднократно встрѣчались въ суглинкахъ также кости ископаемой лошади, которая мало отличалась отъ нынѣ живущей.

Желто-бурые суглинки обычно вверху окрашены въ черный цветъ и переходятъ въ черноземъ, но иногда и въ глубинѣ




Рис. 28. Коренной зубъ мамонта.




Рис. 29. Перегородчатоносый носорогъ.

имѣютъ черные прослои, которые рассматриваются многими, какъ занесенная позднейшими отложениями погребенная почва.

Артезіанскія воды.

Такъ какъ породъ, совершенно не пропускающихъ воду, нѣть, то въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ находится нѣсколько водоупорныхъ пластовъ на различной глубинѣ, надъ каждымъ изъ нихъ собирается вода и образуется нѣсколько, болѣе или менѣе богатыхъ, водоносныхъ „горизонтовъ“, лежащихъ одинъ надъ другимъ.

Воды болѣе глубокихъ слоевъ уже не выходятъ на поверхность земли въ естественныхъ разрѣзахъ. Онѣ или скопляются на глубинѣ, или стекаютъ внизъ, если водоупорный пластъ имѣеть наклонъ, какъ и грунтовыя воды.

Когда подземные слои образуютъ складку, бока которой находятся на нѣкоторой высотѣ сравнительно со срединой, то вода, стекающая по водоупорному слою, находится подъ давлениемъ выше лежащей воды, подъ напоромъ. Если къ такому водоносному слою, лежащему между двумя водоупорными, сдѣлать отверстіе—колодецъ или буровую скважину, то вода по послѣдней устремится вверхъ, стремясь подняться на такую же высоту, на какой находятся бока складки. Если бока складки лежатъ гдѣ-нибудь на возвышенныхъ мѣстахъ, а буровая скважина сдѣлана на болѣе низкомъ мѣстѣ, то вода, дойдя до поверхности земли въ этомъ мѣстѣ, станетъ выливаться или даже бить вверхъ въ видѣ фонтана. Такія глубокія воды, поднимающіяся вверхъ подъ напоромъ, или самоизливающіяся на поверхность, называются *артезіанскими*, отъ имени французской провинціи Артуа, гдѣ впервые въ Европѣ стали ими пользоваться. Въ настоящее время большое число буровыхъ колодцевъ въ Харьковской губ. пользуется артезіанской водою.

Первый водный горизонтъ въ Харьковской губ. находится въ бѣлыхъ и желтыхъ пескахъ Полтавского яруса, распространенныхъ почти во всей губерніи. Изъ нихъ вытекаютъ довольно многочисленные источники, но буровыя скважины рѣдко даютъ значительное количество воды, вслѣдствіе мелкости песка, который задерживаетъ просачивание воды и забываетъ трубы. Копанные же колодцы даютъ изъ этого горизонта достаточное количество воды.

Второй горизонтъ залегаетъ въ зеленыхъ песчаникахъ Харьковского яруса. Имъ пользуются многія буровыя скважины въ Лебединскомъ, Ахтырскомъ, Валковскомъ, Харьковскомъ и Зміевскомъ уѣздахъ.

Третій горизонтъ въ фосфоритовыхъ пескахъ Бучакского яруса—является очень богатымъ хорошою водой. Большинство буровыхъ скважинъ Лебединского, Ахтырского, Богодуховского-Валковского, Харьковского уѣзда питается его водою. Въ Зміев,

скомъ, Изюмскомъ и Купянскомъ уѣздахъ пески эти водоносны только на пространствѣ между Донцомъ, Осколомъ и Бурлукомъ, дальше къ востоку они прорѣзаны долинами и оврагами и воды не содержатъ.

Ниже этого горизонта артезіанская вода встрѣчаются въ мѣлу и мѣловыхъ мергеляхъ. Здѣсь вода не скопляется на одномъ горизонте, а протекаетъ въ мѣловой толщѣ по трещинамъ, гдѣ собирается иногда въ видѣ богатыхъ жиль. Въ восточной части губерніи мѣловая вода болѣе или менѣе постоянны, особенно въ долинахъ рѣкъ, а въ остальной части губерніи носятъ болѣе случайный характеръ. Ими пользуются артезіанские колодцы Старобѣльского, Купянского, отчасти Изюмского, Змievского, Волчанского уѣздовъ. Въ сѣверной части Сумского, Ахтырского и Харьковского уѣздовъ нѣкоторые болѣе глубокіе колодцы также питаются этой прекрасной водой.

Пятый горизонтъ лежитъ въ подмѣловыхъ пескахъ уже на очень значительной глубинѣ. Онъ очень богатъ водой, находящейся подъ сильнымъ напоромъ, но вслѣдствіе его глубины имъ пользуются немногіе колодцы: на ст. Кириковка Ахтырского у. (глубина 340 саж.), на Деркульскомъ конномъ заводѣ Старобѣльского у (глубина 163 саж.) и болѣе двадцати артезіанскихъ скважинъ въ Харьковѣ (глубина около 300 саж.).

Изъ юрскихъ пластовъ получаютъ воду нѣкоторыя скважины Изюмского у.—въ с. Николаевкѣ, Барвенковой, Изюмѣ. Тамъ же есть скважины въ пермскіе слои, дающія соленую воду, и въ каменноугольные пласти, доставляющія воду хорошаго качества.

Полезныя ископаемыя.

Нельзя сказать, чтобы Харьковская губ. была бѣдна полезными ископаемыми. Однако самая дорогія изъ нихъ, какъ соль и каменный уголь, встрѣчаются въ одномъ только юго-восточномъ углу губерніи, также какъ желѣзныя руды, фосфориты, гипсъ, известнякъ. Менѣе цѣнныя, каковы торфъ, камень, оgneупорныя глины, распространены болѣе, самыми же обычными являются кирпичныя глины, мѣль и песокъ—цѣнность которыхъ сравнительно не велика. Однако добываніе этихъ дешевыхъ ископаемыхъ могло бы давать хороший доходъ, если бы они имѣли большее примѣненіе, и если бы населеніе умѣло ими пользоваться. И вообще, всѣ ископаемыя нашей мѣстности разрабатываются очень недостаточно и не даютъ той пользы, какую они могутъ дать, а многія мѣстонахожденія даже вовсе неизвѣстны.

Каменный уголь добывался въ Изюмскомъ у. близъ с. Петровского; имѣются небольшіе выходы его у Цареборисова, у д.

Бородаевки на р. Корулькѣ, у дер. Веселой и с. Золотой Колодезь на р. Грузской.

Главное же мѣсто добыванія—Кременская копь у сл. Кременной Купянского у., которая давала свыше миллиона пудовъ угля въ годъ при 275 рабочихъ. Всѣ эти разработки являются незначительными по сравненію съ копями сосѣдняго Бахмутскаго у. Екатеринославской губ.

Бурый уголь обнаруженъ въ Валковскомъ у. въ $1\frac{1}{2}$ верстахъ отъ с. Люботинъ, въ отвершкѣ балки Березовички. Залегаетъ пластомъ до $1\frac{1}{2}$ аршина.

Торфъ разрабатывается въ Сумскомъ, Лебединскомъ, отчасти Ахтырскомъ уѣздѣ, но недостаточно. Имѣются небольшие торфяники въ Купянскомъ и др. уѣздахъ (см. „Географический очеркъ“ стр. 31).

Желѣзныя руды. Въ юрскихъ отложеніяхъ Изюмскаго у. встрѣчаются стяженія бураго желѣзняка хорошаго качества, мѣстами образующія непрерывные пласти (Никифоровка, Цареборисово, Каменка и другія мѣста по р. Каменкѣ, Черкасское). Значительныхъ залежей неизвѣстно. Желѣзистыя конкреціи въ третичныхъ песчаникахъ нерѣдки во многихъ мѣстахъ губерніи, но для разработки не годятся.

Соль. Каменная соль добывается въ послѣднее время изъ одной шахты въ 2 в. отъ Славянска по дорогѣ въ д. Бессарабовку. Пласть чистой соли достигаетъ здѣсь толщины 18 саж. Залежь каменной соли обнаружена буровыми скважинами и въ самомъ Славянскѣ, гдѣ она имѣеть 14 саж. въ толщину, но здѣсь каменная соль не разрабатывается. Соляные заводы въ Славянскѣ пользуются вмѣсто этого разсолами, получающимися отъ выщелачиванія соляного пласта грунтовыми водами, которыя выкачиваются и вывариваются.

Число заводовъ доходитъ до 21. Вода получается изъ колодцевъ и буровыхъ скважинъ (числомъ 7), опущенныхъ на глубину отъ 50 до 80 саж. Соли вываривалось въ иные годы свыше $5\frac{1}{2}$ миллионовъ пудовъ, рабочихъ было занято до 570 человѣкъ.

Гипсъ встрѣчается только въ пермскихъ слояхъ Изюмскаго у.: между устьемъ р. Бычка и дер. Красногоркой, ниже с. Ивановки, въ с. Христищѣ (съ прослойми песка). Разрабатывается только одно мѣсторожденіе у ст. Краматорской.

Доломитъ разрабатывается одною небольшой ломкой въ томъ же мѣстѣ.

Известняки встрѣчаются въ каменноугольныхъ, пермскихъ и юрскихъ отложеніяхъ. Они могутъ примѣняться для выжиганія извести, также для строительныхъ цѣлей, для мостовыхъ. Разрабатываются въ Изюмскомъ у. у хут. Макатихи, с. Корульки и Дроновки, близъ Веревкиной.

Мѣль и мѣловые мергеля чрезвычайно широко распространены и примѣняются крестьянами для побѣлки хатъ, а въ Купянскомъ и Старобѣльскомъ у. употребляются также и для построекъ. Изъ нихъ дѣлаются не только заборы и сараи, но даже хаты. Необходимо, однако, дѣлать въ постройкахъ каменные или деревянные фундаменты, во избѣжанія сырости. Близъ городовъ и значительныхъ сель жгутъ изъ мѣла известоку. При замѣчательной чистотѣ мѣла Старобѣльского и др. уѣздовъ онъ могъ бы употребляться для изготошенія цемента и химическихъ производствъ. Однако пользованіе мѣломъ вообще совершенно незначительно.

Разработки имѣются въ Сумскомъ у.: между Чернетчиной и Могрицей (мѣловые и известковые заводы), у Александровки, хут. Тверитинова, хут. Линтварева; въ Волчанскомъ у с. Старицы (для известки); въ Купянскомъ у г. Купянска (известковый заводъ), въ Сватовой-Лучкѣ, Нижней Дуванкѣ, Рубановкѣ, Наугольновкѣ, (для построекъ) и др. мѣстахъ; въ Изюмскомъ у. четыре значительныя ломки находятся при ст. Шидловской Южн. д. Здѣсь добывалось до $1\frac{1}{2}$ миллиона пудовъ въ годъ при 100 рабочихъ. Самая же крупная ломка мѣла близъ Славянска давала свыше $1\frac{1}{2}$ миллиона пудовъ при 60 рабочихъ. Двѣ ломки имѣются близъ ст. Краматорской, также у с. Бѣленького и въ др. мѣстахъ. Въ Старобѣльскомъ у. у г. Старобѣльска, с. Бѣловодска (обжигается известка для мѣстного употребленія), у с. Новый Айдаръ, хут. Студенецкихъ, сл. Колядовки (мѣловые мергеля для построекъ), сл. Осиновой (для построекъ).

Кремень мѣстами встрѣчается значительными массами въ мѣлу, напр., у Святыхъ Горъ. Употребляется для нѣкоторыхъ фабрично-заводскихъ производствъ. Добывается только у ст. Славянскъ.

Фосфориты въ измельченномъ и химически обработанномъ видѣ примѣняются для удобренія полей. У насъ могли бы разрабатываться фосфориты, образующіе прослой въ верхне-мѣловыхъ отложеніяхъ Изюмского у., гдѣ ихъ приходится около 144 пудовъ на квадратную сажень, и содержаніе фосфорной кислоты въ нихъ значительное. Прослой этотъ встрѣчается почти во всѣхъ мѣстахъ Изюмского у., гдѣ на поверхность выходитъ мѣль. Вся гора Кременецъ близъ Изюма опоясана пластомъ фосфорита. Что касается фосфоритовыхъ конкреций и прослоекъ, часто встрѣчающихся въ нижне-третичныхъ отложеніяхъ, то онѣ никакого значенія не имѣютъ.

Камень, добываемый въ Харьковской губ., не высокаго качества и для строительныхъ нуждъ почти не годится. Онъ употребляется для мостовыхъ, иногда для фунда-

ментовъ, заборовъ, для укрѣпленія желѣзнодорожныхъ насыпей и т. п. Это преимущественно песчаникъ третичнаго возраста. Песчаникъ Харьковскаго яруса—зеленый со ржавыми пятнами, довольно рыхлый, но иногда содержащій прослои болѣе плотнаго, но хрупкаго, сѣраго сливного песчаника. Песчаникъ Полтавскаго яруса желѣзистый желтаго, краснаго и оранжеваго цвѣтовъ, иногда также довольно плотный. Въ Изюмскомъ у. нерѣдки выходы юрскихъ и болѣе древнихъ песчаниковъ. На окраинѣ Сумскаго и Лебединскаго у. иногда пользуются валунами.

Главныя мѣсторожденія песчаниковъ: въ Сумскомъ у.—близъ Шпилевки; въ Богодуховскомъ—въ Губаревѣ; въ Харьковскомъ: у Большой Даниловки, близъ Харькова; въ Валковскомъ: близъ Старого Мерчика; въ Волчанскомъ: у Верхняго Салтова; въ Купянскомъ: у Коломійчихи (обтесывается плитами для построекъ); въ Змievскомъ—въ Чугуевѣ, въ Тетлегѣ, на хут. Арефьева; близъ Гашиновки; въ Изюмскомъ: близъ ст. Краматорской, Великой Камышевахи, Петровскаго, Каменки, Макатихи, хут. Поддонецкаго, въ горѣ Кременецъ; въ Старобѣльскомъ: близъ Осиновой, Бѣлокуракиной, хут. Бунчужнаго, Киселевки, хут. Лавровки, Нещеретова, Рудѣвой, Климовой, В. Покровки, хут. Тишкова, хут. Студенецкихъ.

Песокъ разрабатывается въ промышленныхъ цѣляхъ очень мало, хотя въ нашей губерніи есть пески замѣчательной чистоты, напримѣръ, въ с. Гомольшѣ Змievск. у. Стеклянныя заводы имѣются въ Харьковѣ, также въ Славянскѣ и Новой Водолагѣ.

Глины кирпичныя весьма обыкновенны въ Харьковской губ. Изъ нихъ лучшей является Харьковская порода, т.-е. зеленая песчанистая глина, пользующаяся большимъ распространеніемъ.

Въ ней содержится такое количество песка, что при выдѣлкѣ кирпича песокъ обычно не добавляется. Этой глиной пользуются многочисленные заводы въ разныхъ частяхъ губерніи.

Желто-бурые суглинки распространены еще болѣе. Ими пользуется множество большихъ и мелкихъ заводовъ. Однако эти суглинки значительно хуже, ибо содержать очень часто примѣсь известковистыхъ конкрецій—„дутиковъ“, которые при обжиганіи портятъ кирпичъ, почему суглиноокъ надо сначала очищать отъ этихъ включений.

Голубые мергеля Киевскаго яруса представляютъ собою прекрасный матеріаль для кирпичнаго производства, въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ они выходятъ на поверхность.

Глины гончарныя встрѣчаются во многихъ мѣстахъ губерніи и представляютъ большую цѣнность. Онѣ залегаютъ преимущественно выше бѣлыхъ песковъ Полтавскаго яруса или среди нихъ; очень хорошия глины находятся среди юрскихъ отложений

Изюмского у., встречаются глины также въ мѣловыхъ и четвертичныхъ пластахъ.

Главныя мѣсторожденія: въ Сумскомъ у. у Стецковки; въ Лебединскомъ: въ Межиричѣ, между Азакомъ и Червленымъ, въ Костевыхъ хуторахъ, близъ Каменнаго; въ Ахтырскомъ: близъ Михайловки, Боромли и Пожни; въ Валковскомъ—богатѣйшія залежи отличныхъ глинъ въ Новой Водолагѣ, окрестностяхъ Валокъ, Княжного, Просяной, Знаменскаго, Огульцовъ; въ Купянскомъ—близъ Гороховатки; въ Изюмскомъ: у хут. Бурхановскаго, Топальскаго, между Камышевахой и Стратилатовкой; въ Старобѣльскомъ: у хут. Васильевскаго, Балакиревки, хут. Дмитріевки, Курячевки, Евсуга, Брусовки, Литвиновки, Бѣловодска.

Глины оgneупорныя—весьма цѣнное ископаемое—разрабатываются въ Изюмскомъ у. близъ Славянска (свыше 400,000 пуд. въ годъ при 65 рабочихъ), ст. Краматорской и Криничной. Также у с. Николаевки и Рай-Александровки.

Глины оgneупорныя—весьма цѣнное ископаемое—разрабатываются въ Изюмскомъ у. близъ Славянска (свыше 400,000 пуд. въ годъ при 65 рабочихъ), ст. Краматорской и Криничной. Также у с. Николаевки и Рай-Александровки.