

и въ тоже время дѣятельныя отведенія и противураздраженія, ограничивающія страданіе костей.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

ВОСПАЛЕНИЯ СЕРОЗНЫХЪ ОБОЛОЧЕКЪ

(*Orrhymenitides*).

§ 249.

Серозные оболочки образуютъ всегда мѣшкообразные покровы, коими одѣваютъ органы, какъ видно на паутинной оболочкѣ мозга, на околосердечнѣ, грудной плевѣ, брюшинѣ и пр. Нѣкоторыя изъ нихъ вдвойнѣ покрываютъ органы, при чмъ внутренній мѣшокъ срастается съ паренхимомъ органа и отъ наружнаго отдѣляется, какъ замѣтно на грудной плевѣ, влагалищной оболочкѣ яичекъ и пр. Первообразное существо серозныхъ оболочекъ составляетъ клѣтчатая плева, которая однакожъ, превратившись въ плотную массу, представляетъ перепончатую форму. Ткань ихъ состоить изъ конволюта испаряющихъ и всасывающихъ сосудовъ, следствіенно онѣ снабжены собственно бѣлыми сосудами и чрезъ то имѣютъ преимущественное средство съ клѣтчатою плевою. Серозныя сумочки и мѣшки наиболѣе тонки и прозрачны; а серозные покровы, соединяющіеся

съ паренхимомъ различныхъ органовъ, хотя имѣютъ очень плотный составъ и чрезъ то уподобляются болѣе волокнистымъ сумочкамъ, однакожъ, несмотря на это, они не принадлежать къ волокнистому аппарату. Всѣ серозныя оболочки, одѣвающія внутренности и образующія внутренній срастающійся съ ними мѣшокъ, несмотря на столь тѣсную связь, представляютъ совсѣмъ особенный аппаратъ, отличный отъ покрываемыхъ ими внутренностей. По сему-то въ таковыхъ оболочкахъ оказываются и особенные, соответствующія ихъ организаціи болѣзни, отличные отъ болѣзней покрываемыхъ ими внутренностей и при томъ такъ, что болѣзни серозныхъ покрововъ неимѣютъ почти никакого вліянія на обрѣтающіяся подъ ними внутренности.

§ 250.

Хотя серозныя оболочки въ здоровомъ состояніи имѣютъ мало сосудовъ, проводящихъ кровь, однакожъ чрезъ напливаніе значительныхъ смежныхъ артерій, тончайшіе кровоносные сосуды сихъ оболочекъ обозначаются въ видѣ сѣточки. Въ здоровомъ состояніи оболочки сіи представляются обыкновенно блестяще-блѣмыми, а въ воспалительномъ красными и притомъ какъ бы подернутыми красною сѣточкою. Первовъ въ существѣ сихъ оболочекъ преслѣдоватъ невозможно, впрочемъ въ существованіи ихъ можно удостовѣриться изъ того, что въ воспалительномъ состояніи серозныя оболочки обнаруживаются нарочитую чувствительность. Кромѣ сего, безъ перваго вліянія немогли бы совершаться и самыя отправ-

ления ихъ: испарение и всасывание, даже самое питание. Если факторы таковые въ дѣйствіи своемъ нарушаются, то наступаетъ воспалительный процессъ, а съ онимъ умноженное серозное испарение, выпотьгніе пластической пасоки или гноя, срастаніе или изъязвленіе. Въ первомъ участіи можно также убѣдиться изъ большаго сочувствія, какое оказывается въ воспаленіяхъ серознаго аппарата сочлененій. По обнаженіи серозныхъ оболочекъ, тотчасъ появляется въ нихъ воспаленіе. Вообще организація серознаго аппарата допускаетъ возможность воспалительного процесса. При измѣненіи чувствительности и сосудистой дѣятельности кровь можетъ вступать въ серозные сосуды серозной оболочки, чего въ здоровомъ состояніи небываетъ; сверхъ сего кровь можетъ проникать также въ волосные сосуды питательнаго аппарата сихъ перепонокъ.

§ 251.

Воспаленія серозныхъ оболочекъ имѣютъ различную степень силы и болѣе или менѣе острое, либо медленное теченіе, что зависитъ отъ дѣйствія причинъ. Если оболочки сіи при ранахъ подвергаются вліянію воздуха, то рождается сильное острое воспаленіе, если же дѣйствуютъ на нихъ внутреннія конституціональныя причины, напаче порочное смѣщеніе крови, то процессъ воспаленія бываетъ болѣе хронического рода. По взаимному дѣйствію серознымъ оболочекъ съ виѣшнею кожею часто также воспаленія ихъ оказываются въ слѣдствіе простуды и нарушенаго отправленія кожи (ревматиче-

скія страданія). По сему же самому и накожныя сыпи, если отступаютъ внутрь, то поражаютъ наиболѣе се-
розный аппаратъ, возбуждая въ немъ воспаленіе. Обык-
новенные исходы сихъ воспаленій суть: болѣзниенныя
выпотѣнія, отолстѣнія и парашенія ложныхъ перепо-
локъ, сращенія и водянистые скопленія, кои могутъ
существовать иногда безъ особеннаго страданія внутрен-
ностей, одѣваемыхъ больными серозными оболочками.

Воспаление паутинной оболочки мозга.

(*Arachnitis, arachnoiditis*).

Syn. Encephalitis superficialis, seroso-sanguinea, ergo-
sipelatodes.

§ 252.

Явленія. Больные жалуются на сильныя боли въ головѣ, которые не ограничиваются однимъ мѣстомъ, но распространяются повсюду, имѣютъ мѣстопребываніе свое въ глубинахъ головы, выражаются чувствомъ рвущимъ, раздирающимъ и умножаются при движеніяхъ, наипаче при мгновенномъ потрясеніи головы. Къ сему присое-
диняются сильныя скопленія крови къ головѣ, насту-
пающія болѣшею частію пароксизмами и обнаруживаю-
щіяся сильнымъ бѣніемъ шейныхъ и височныхъ арте-
рій, жаромъ и краснотою лица. Въ ночное время раж-

дается безсонница и бредъ, впрочемъ легкій, тихій. Походка больныхъ бываетъ шаткая и они не могутъ держать себя прямо. При этомъ оказывается обыкновенно обложеній языкъ, сильная жажда, жаръ въ тѣлѣ, запоръ на низъ и другіе сочувственные и огневичные припадки; но въ мочѣ не замѣчается ничего постояннаго, характерическаго. Жилобіеніе бываетъ взболнованіе, раздраженіе, рѣдко однокожъ твердое, большою же частію мягкое, частое (120 ударовъ) и въ скорости своей не смыняющееся. Въ послѣдствіи времени къ означеннымъ страданіямъ присоединяются спичка, корчи и судороги разнаго рода к. напр. *spasmus cynicus*, *risus sardonicus* (*) и пр.

§ 253.

Распознаваніе сей болѣзни очень трудно. Она легко можетъ быть смысливаема съ первыми и тифозными

(*) По *Abercrombie* воспаленіе паутинной оболочки мозга въ некоторыхъ случаяхъ выражается головной болью, рвотою, огневичными движеніями и свѣтоболезнью, чаще же мгновенно наступающимъ и долго продолжающимъ пароксизмомъ корчей и спазмъ, коему иногда предшествуетъ головная боль и рвота, а иногда небываетъ никакихъ предвестниковъ. Въ некоторыхъ случаяхъ корчи переходятъ прямо въ спичку, которая въ послѣдствіи только смыняется корчами до самой смерти. Въ другихъ случаяхъ послѣ первыхъ корчей наступаетъ улучшеніе и больной какъ будто поправляется; но вскорѣ потомъ впадаетъ въ спичку съ предшествовавшимъ ей корчами или безъ оныхъ; между тѣмъ какъ въ некоторыхъ особенныхъ случаяхъ въ самомъ позднемъ періодѣ болѣзни не оказывается никакихъ корчей.

горячками и отличается только тѣмъ, что наступаетъ почти вдругъ, сопровождается раздирающими болями въ головѣ и вскорѣ переходитъ въ спячку; между тѣмъ какъ горячки образуются медленнѣе, сопровождаются не-столько болью, какъ чувствомъ тяжести въ головѣ и въ спячку переходятъ не всегда, или только въ послѣднемъ періодѣ.

§ 254.

Воспаленіе сіе проходитъ быстро, оканчиваясь и пог-да въ 2 или 3 днія и безъ надлежащей помощи искус-ства никогда не разрѣшается. Обыкновенный ис-ходъ его есть серозное выпотѣніе, за коимъ вскорѣ слѣ-дуетъ спячка, корчи и смерть, или образованіе чрезъ то внутренней головной водяной болѣзни. Оно поражаетъ чаще всего дѣтей отъ 2 до 10 лѣтъ, рѣдко взрослыхъ, и при томъ болѣе женщинъ, нежели мужчинъ; приклю-чается преимущественно отъ переносовъ, сочувственныхъ раздраженій, мгновеннаго прекращенія мѣсячнаго и по-слѣродового очищенія, злоупотребленія спиртныхъ напитковъ и опіатныхъ средствъ; иногда отъ простуды, сильнаго испуга и пр. также отъ механическихъ и тра-вматическихъ причинъ.

При вскрытии мертвыхъ тѣлъ паутинная оболоч-ка оказывается мутною, плотною и отолстѣвшою. Между ю и мягкою оболочкою мозга находится излитіе пасоки зеленовато-желтой, на гной похожей, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ сверхъ того накопленіе водянистой жидкости.

Предсказаніе здѣсь весьма неблагопріятно, особыли-во если заблаговременно не будетъ подана помощь и про-

изойдетъ серозное выпотѣніе. Въ такомъ случаѣ выпотѣніе производитъ давленіе на мозгъ, отъ коего рождается сперва спячка, лишеніе всякаго свѣдѣнія и вскорѣ потомъ, иногда черезъ два часа, слѣдуетъ смерть.

§ 255.

Лѣченіе. Общія кровопускания рѣдко показуются здесь, развѣ у весьма полнокровныхъ особъ и при очень твердомъ жилобеніи; гораздо лучше действуютъ местные кровоотвлечения, которыя никогда не должны быть пропускаемы и повторяемы даже черезъ два часа, если припадки неумѣряются. Ихъ можно производить или посредствомъ кровососныхъ балокъ, приставляемыхъ на макушкѣ головы и за ушами, или достаточнаго числа пьявокъ (30—40). Изъ внутреннихъ средствъ, если неѣть сочувственной рвоты, весьма хорошо действуетъ рвотный камень въ большихъ пріемахъ (N 104); въ противномъ случаѣ слабительный изъ сладкой ртути или среднихъ солей, клещевинного масла и пр. Холодные примочки на головѣ здѣсь вредны; лучше употреблять тепловатыя, изипаче изъ уксуса или смягчающихъ травъ. Прочее лѣченіе располагается по причинамъ. Во всякомъ случаѣ однакожъ кровоотвлечения, дѣлаемыя во время и въ должной мѣрѣ, слабительный изъ хлористой услащеній ртути, промывательный изъ уксуса, отвлекающія и нарывыныя средства, наперстянка съ сюрьмыными или ртутными лѣкарствами при тщательномъ избѣжаніи всѣхъ причинъ, возбуждающихъ скопленіе кро-

ви къ головѣ (часть 1, стр. 22,) составляютъ главныя средства.

Воспаленіе грудной плевы.

(*Pleuritis*).

Syn. Inflammatio plevræ, plevresia, empresma pleuritis
M. Good; воспалительное колотье въ боку.

28

§ 256.

Явленія. Воспаленіе грудной плевы начинается либо вдругъ, безъ предшествовавшаго явственнаго мѣстнаго страданія, горячкою,— и при томъ обыкновенно неочень сильнымъ, но иѣсколько часовъ продолжающимся и переходящимъ въ постоянный жаръ озномобомъ, во время котораго обнаруживается и самое колотье въ боку; или мѣстное страданіе образуется мало по малу: больной чувствуетъ постепенно умножающуюся боль, которая обыкновенно бываетъ колюща, ограничивается небольшимъ пространствомъ, чаше всего обрѣтается въ одной какой либо сторонѣ груди, но рѣже оказывается распространеною по груди, рвущею, или представляющею болѣзниное чувство, котораго въ точности определить не возможно. Боль сія умножается преимущественно отъ движенія воспаленныхъ мѣстъ, слѣдственно при глубокомъ вдыханіи, кашлѣ, чиханіи и пр. При

семъ рождается также короткий, большою частю сухой кашель, а иногда и соединенный съ пенистою слизистою харкотикою. Къ таковымъ припадкамъ вскорѣ присоединяется общее огневичное раздраженіе, которое въ началѣ обнаруживается ознобомъ, а потомъ жаромъ, напаче въ щекахъ и отличается частымъ, скорымъ и твердоватымъ жилобеніемъ. Такимъ образомъ болѣзнь продолжается 4—7 дней и долѣе и исчезаетъ потомъ, при благопріятномъ исходѣ, большою частю съ появлениемъ критического поса и мочи, нерѣдко также кровотеченія изъ поса, а иногда постепенно безъ критическихъ испражненій.

§ 257.

Исходы. Если послѣдуетъ, какъ очень часто случается, серозное выпотѣніе (*extravasation plevriticum*), то колоть въ боку обыкновенно послабляетъ, а жарь и раздраженное жилобеніе большою частю исчезаютъ. Вмѣсто колющѣй боли оказывается обыкновенно чувство давленія и стѣсненія. Изслѣдывая по чаще стетоскопомъ, можно узнать, что въ страждущемъ мѣстѣ шумъ отъ дыханія безпрестанно дѣлается неизвестнѣе, а подъ конецъ совершенно исчезаетъ, напротивъ того на здоровой сторонѣ груди оказывается шумъ отъ дыханія; въ нѣкоторыхъ случаяхъ примѣчается тонъ, подобный козлиному мычанію (*egophonia*), который также исчезаетъ, если выпотѣніе увеличивается. Вмѣстѣ съ симъ ударение въ грудь (*percussion*) показываетъ весьма глухой тонъ и приложенная рука непримѣтна болѣе обыкновенна-

го зыбленія (*vibratio*), когда болѣй говорить (*Reynard*). Если болѣзньное выпотѣніе очень сильное, то грудная полость къ концу разширяется такъ, что на одномъ боку представляетъ большую обѣятность, нежели на другомъ и при глубокомъ вдыханіи, она на страждущей сторонѣ неразширяется, но остается неподвижною. Дыханіе при семъ бываетъ болѣе или менѣе стѣснено, болѣй можетъ лежать только на той сторонѣ тѣла, на коей находится экстравазатъ выпотѣнія; а при долгомъ продолженіи болѣзни отекаютъ ноги и вѣка, моча дѣлается скудною, бурою и мутною, часто даже образуется повсемѣстная водяная болѣзнь. Съ усиленіемъ всасываніемъ и уменьшеніемъ экстравазата уменьшаются и общіе водянибо болѣзни припадки: дыханіе дѣлается легче, егопронія появляется снова и потомъ опять исчезаетъ, топъ при удареніи бываетъ крѣпче и шумъ отъ дыханія опять примѣщается.

Переходъ сего воспаленія въ пластическое выпотѣніе трудно узнается. Если сращеніе легкаго съ грудною стѣпою, образующееся въ слѣдствіе такового выпотѣнія, имѣть значительную обѣятность, то此刻иене это можно распознавать гораздо вѣрнѣе изъ того, что при немъ раздается большая или меньшая одышка, топъ при удареніи бываетъ пѣсколько глушше, нежели на здоровой сторонѣ—и шумъ отъ дыханія не столь явственный; впрочемъ онъ все еще замѣщается, представляясь такъ, какъ будто бы онъ находится въ иѣсколько большемъ отдаленіи и легочныи пузырки разширяются не подъ самимъ стетоскопомъ.

Антоновъ огонь при воспаленіи грудной плевы мо-

можетъ встречаться, по видимому, только вмѣстѣ съ антоновымъ огнемъ легкихъ, или при жестокихъ травматическихъ пораженіяхъ.

Смерть рѣдко дѣлается отъ самаго воспаленія, но причиняется почти всегда отъ чрезмѣрнаго серознаго экстравазата чрезъ удушеніе и изнуреніе силь.

§ 258.

При вскрытии труповъ, если воспаленіе продолжается до наступленія смерти, грудная плея находима была покраснѣвшою и представляла: 1.) красныя точки, проникающія всю толщину сей перепонки, между коими находился и здоровый цвѣтъ; 2.) проходящіе на поверхности и между пластинками грудной плевы сосуды какъ бы налитые кровью и 3.) отолѣтѣніе массы грудной плевы и присутствіе въ мѣшкѣ ея жидкости довольно прозрачной, смѣшанной иногда съ бѣловатыми клоцками и подобной водѣ, остающейся послѣ процѣдѣннаго гноя (*струета*). Количество этой жидкости простирается иногда до 10 фунт.

§ 259.

Распознаваніе. Воспаленіе грудной плевы можетъ быть смѣшиваемо съ воспаленіемъ легкихъ, съ коимъ часто и сопряжено бываетъ. Если оно существуетъ одно по себѣ, то отличается отъ воспаленія легкихъ гораздо сильнѣйшою колющею болью, возбуждаемою при глубокомъ вдыханіи и примѣчаемою близко подъ грудною

стѣною; напротивъ того при воспаленіи легкихъ часто самое короткое вдыханіе причиняетъ болѣзненное чувство въ легкомъ и кашель; сверхъ сего при воспаленіи грудной плевы, пока еще не образовался экстравазатъ, чувство стѣсненія въ груди не бываетъ такое, какъ въ воспаленіи легкихъ: больной могъ бы свободно дышать, если бы позволяла ему боль, напротивъ того въ воспаленіи легкихъ онъ имѣеть настоящее чувство стѣсненія груди и одышку съ ощущеніемъ въ самомъ легкомъ препятствій къ дыханію. Наконецъ въ воспаленіи грудной плевы не бываетъ харкотины, свойственной воспаленію легкихъ, равно какъ и скрипучаго шума (§ 285.). Отъ ревматизма междуреберныхъ мышицъ (*plevritis spuria*) отличается воспаленіе грудной плевы тѣмъ, что при ревматизмѣ боль замѣчается обыкновенно только во время полнаго движенья груди, что она вообще бываетъ поверхностная, не столь колющая; кашель, а болѣшею частію и огневица отсутствуютъ,—и часто въ тоже время ревматической боли обрѣтаются и въ другихъ частяхъ тѣла.

Воспаленіе смежныхъ брюшныхъ органовъ отличается отсутствиемъ кашля; а чрезмѣрно сильная боль въ боку, причиняемая скопленіемъ гасовъ въ излучинахъ кишечкѣ, также отсутствиемъ кашля и совершеннымъ недостаткомъ огневичныхъ движений.

§ 260.

Причины. Расположеніе къ сему воспаленію имѣютъ преимущественно тѣ особы, кои склонны къ ревматизму и составалому.

Слугайныя причины суть наипаче простуда, отступление внутрь кожныхъ сыпей, зальчение язвъ, неблаговременное прекращеніе приемовъ, слизотечей, кровотечений и пр., также горячки воспалительного свойства, болѣзни легкихъ, распространяющіяся на грудную плеву или приводящія очную въ состраданіе, наконецъ механическія поврежденія, наипаче переломъ реберъ и пр.

§ 261.

Предсказание. Воспаленіе грудной плевы принадлежитъ къ болѣзнямъ, рѣдко угрожающимъ опасностію, которая зависитъ здѣсь преимущественно отъ перехода въ серозное выпотѣніе и величины экстравазата, а иногда и отъ свойства сопровождающей огневицы.

§ 262.

Лѣченіе а.) По пригіннымъ показаніямъ должно рекомендовать наипаче теплое содержаніе груди, соблюдать строго противувоспалительную діету и противодѣйствовать вышеозначеннымъ (§ 260) причинамъ.

б.) По существеннымъ показаніямъ могутъ быть употребляемы всѣ средства, принадлежащія къ противувоспалительному аппарату (§ 22—32.). Общія кровопусканія однакожъ недолжны быть столь сильны и столь часто повторяемы, какъ въ воспаленіи легкихъ, ибо здѣсь никогда въ болѣзnenный процессъ не входитъ столь много крови и потому ихъ удобно могутъ замѣнять пьявки

и кровососныя банки, прикладываемыя къ болищему мѣсту, наипаче послѣ сдѣланнаго одинъ разъ кровопусканія. Чистыя противувоспалительныя лѣкарства, какъ селитра, здѣсь менѣе приличны, нежели айтагонистически дѣйствующія, особенно такія, кои возбуждаютъ отдѣленія и тѣмъ ограничиваютъ болѣзненный процессъ выпотѣнія. Сюда принадлежать противувоспалительныя потогонительныя (N 108), также отводящія къ кишечному каналу лѣкарства, особенно рвотный винный камень въ малыхъ (N 20) и большихъ приемахъ (N 104), смягчающія промывательныя (N 37) и нарывной пластырь на кожѣ, близъ страждающаго мѣста. Преимущественную пользу доставляютъ еще непосредственно дѣйствующія на успокоеиѣ средства к. т. втирание на груди теплого жира, масла белены, опіатныхъ мазей (N 49), прикладываніе фланели, овложенной теплымъ жиромъ, теплыхъ и влажныхъ припарки (N 48), прикладываніе согрѣтыхъ травяныхъ мѣшечковъ; а если боли составляютъ главный припадокъ и горячка невоспалительна, или уменьшаютъ кровоотвлеченіями, то предписывается также внутреннее употребленіе наркотическихъ средствъ, даже опіи (N 7.77), который будучи даваемъ во время, доставляетъ величайшую пользу.

с.) По припадочнымъ показаніямъ нужно противодѣйствовать обыкновенно боли, часто нестерпимой и ожесточающей самое воспаленіе,—что производится вышеупомянутымъ образомъ. Для удаленія экстравазата одобряется преимущественно услащенная солянокислая ртуть съ наперстянкою (N 26) и нарывной пластырь на груди, вообще всѣ средства противъ грудной водя-

ной болѣзни. Прободеніе груди рѣдко бываетъ потребно, тѣмъ болѣе что иногда очень значительный серозный экстравазатъ уничтожается мало помалу чрезъ всасываніе, да и постепенное всасываніе гораздо выгоднѣе, нежели скорое удаленіе экстравазата посредствомъ прободенія, ибо при всасываніи не столь скоро послѣдуетъ сращеніе легкаго съ грудною стѣною, какъ при прободеніи. Впрочемъ есть случаи, въ коихъ, по причинѣ угрожающей опасности, прободеніе груди необходимо и отъ онаго всегда можно ожидать лучшаго успѣха, нежели собственно при водянной болѣзни, потому что скопленіе серознаго экстравазата въ воспаленіи зависить отъ местнаго страданія, а не отъ общаго, какъ бываетъ въ водянной болѣзни.

Воспаленіе околосердечнаго

(*Pericarditis*).

Syn. Pleuritis pericardica, inflammatio pericardii; carditis serosa *Schönleini*.

§ 263.

Такъ называется воспаленіе серозной оболочки, которая, покрываая виѣшнюю поверхность сердца и происхожденіе большихъ сосудовъ, распространяется также на

самый волокнистый мешокъ (pericardium), въ коемъ содержится сердце.

Явления сего воспаленія раздѣляются на местныя и общія.

1.) Къ местнымъ явлениямъ относятся: а) болѣе или менѣе сильная боль ниже грудныхъ сосковъ, либо въ нижнемъ концѣ грудной кости, занимающая всю сторону предсердія и распространяющаяся къ подмышкамъ и лѣвому плечу. Она бываетъ колюща, раздирающая, рѣзуща и, подобно плевретической боли (§ 254), уможается отъ вдыханія, кашля и ударенія въ грудь. Случается однажды, что боль таковая оказывается тупою и очень легкою, возбуждаемою только удареніемъ въ грудь, а иногда она даже совершенно неощущается, особенно если воспаленіе сіе сопряжено съ сильнымъ ревматическимъ страданіемъ въ членахъ. б.) *Біенія* сердца обнаруживаются въ семь случаѣ гораздо сильнѣ и чаще, нежели въ нормальномъ состояніи, иногда они бываютъ правильныя, а иногда неправильныя, перемежающіяся и представляются перѣдко столь сильными, что движенія сердца можно примѣтить даже посредствомъ зреінія. Впрочемъ это продолжается только до образования сильного серознаго экстравазата, при коемъ біенія сердца и по приложеніи руки къ предсердію, едва примѣтны бываютъ. Въ сіе время рождается болѣе или менѣе значительная выпуклость на сторонѣ сердца.

Ударение въ сторону предсердія (percussion) болѣею частію сообщаетъ глухой тонъ, коего распространеніе состоитъ въ пропорціи съ количествомъ послѣдовавшаго уже выпотѣнія.

Изслѣдованіе стетоскопомъ (auscultation) показываетъ очень часто шумъ, какъ бы отъ сдирания или трещинія, который нерѣдко сопряженъ съ движениемъ, подобнымъ царапанію и скобленію, также съ простымъ трескотаніемъ въ груди, болѣе поверхностнымъ и распространеннымъ. Въ рѣдкихъ случаяхъ примѣчается шумъ, подобный скрипѣнію вновь выдѣлannой кожи (*le bruit de cing neuf.*)

2.) *Общія и соизуственныя явленія* сего воспаленія очень неопределительны. Во многихъ случаяхъ жилобеніе бываетъ полное, твердое, равномѣрное и частое, кожа теплая и мокрая; въ другихъ напротивъ того жилобеніе малое и неровное, кожа сухая и жаркая, иногда, на конечностяхъ холодная, покрытая холоднымъ потомъ, какъ въ обморокѣ. Часто оказывается трудное дыханіе и несносное чувство стѣсненія, при чмъ больной въ тоскѣ бросается туда и сюда, ищетъ свѣжаго воздуха и поражается нерѣдко корчевыми движениями. Къ сему присоединяется бредъ и мучительная безсонница, а когда состояніе таковое продлится на долго, то отекаютъ ноги. Въ другихъ же случаяхъ слѣды таковыхъ явленій едва обнаруживаются и больной чувствуетъ только легкое стѣсненіе въ груди.

§ 264.

Продолженіе сего воспаленія бываетъ различно, смотря по острому, или хроническому его теченію. Исходы его суть разрешеніе, чрезмѣрное накопленіе серозной влаги (*hydrops pericardii*), сращеніе сердечной сумки съ окололежащими частями, образованіе сосковид-

ныхъ мясистыхъ, либо хрящеватыхъ и костяныхъ измѣній, кои могутъ существовать иногда безъ значительного разстройства отправленій сердца.

§ 265.

Причины суть общія всѣмъ воспаленіямъ, преимущественно удары и паденія на предсердіе, различныя раны, проникающія въ околосердечіе, мгновенная простуда тѣла при обильномъ потѣніи, наипаче послѣ наружнаго движенія и продолжительнаго бѣганія. По сему-то воспаленіе сіе очень часто встречается вмѣстѣ съ острымъ ревматизмомъ.

§ 266.

Предсказаніе. Воспаленіе серозныхъ покрововъ сердца, несмотря на поверхностное распространение его, во всякомъ случаѣ представляетъ опасную болѣзнь, судя по важности органа, занимаемаго ею. Впрочемъ часто встречающіяся при вскрытияхъ труповъ болѣзненные изменения на ономъ (сращенія, нарости и пр.) показываютъ явственно существовавшія прежде воспаленія, которыя развиваясь въ легкой степени, столь мало нарушаютъ отправленія органа, что смѣшиваются съ другими грудными воспаленіями, или во все непримѣчаются. Посему острое воспаленіе, обнаруживающееся значительною силою, хотя и угрожаетъ опасностію, но удобѣ можетъ быть узнаваемо и скорѣе допускаеть вспомоществованіе искусства, нежели хроническое, которое большую частью воспринимаетъ вышеозначенные исходы, оставляя перѣдко на всю жизнь беспокойные припадки.

§ 267.

Лъченіе. Въ остромъ состояніи воспаленіе сіе требуетъ кровопусканій, покойного содержанія, легкой антифлогистической діэты и прохладжающихъ (N 18.19) и смягчающихъ (N 62) напитковъ. Способъ сей, будучи употребленъ въ пору, всегда почти достаточенъ для совершеннаго уничтоженія болѣзни. Само собою разумѣется, что кровопусканія, какъ общія такъ и мѣстныя, должны соотвѣтствовать силѣ болѣзни и всѣмъ индивидуальнымъ обстоятельствамъ больнаго. Если, несмотря на это, воспаленіе продолжается и переходитъ въ хроническое состояніе, то употребленіе мѣстныхъ кровопусканій, наипаче кровососныхъ банокъ надлежитъ соединять съ различными отвлекающими и нарывными средствами к. с. пластырь испанскихъ мухъ, прижиганіе, мокса, заволока, мазь рвотнаго камня, кротоновое масло и пр. Ртутныя втирания могутъ быть также употребляемы съ пользою, а строгая діэта и ванны весьма много способствуютъ дѣйствію сихъ различныхъ средствъ.

При обильномъ серозномъ выпотѣніи, если біенія сердца сильныя, неправильныя, наипаче если существуютъ признаки разрастанія сердца (*hyper trophyia*), употребленіе наперстянки, иногда съ хлористою услащеніюю ртутью (N 26) составляетъ наиболѣшее средство; на противъ того, когда замѣчается въ семъ случаѣ истощеніе сердца (*atrophyia*) съ весьма слабымъ біеніемъ его и артерій, то и самая наперстянка не можетъ имѣть мѣста. Испражненіе жидкости посредствомъ прободенія околосердечной сумки составляетъ еще одну изъ тѣхъ терапев-

тическихъ проблеммъ, коихъ опытность достаточно еще не
перышла.

Воспаление брюшины.

(*Peritonaeitis*).

Syn. Inflammatio peritonaei, peritonitis.

§ 268.

Явленія. Сильная, колющая, рѣжущая, жгучая, непрерывная боль, которая въ одномъ какомъ либо мѣстѣ брюшной полости оказывается въ сильнѣйшей степени и оттуда часто распространяется на все брюхо, возбуждаясь и умножаясь отъ движенія и давленія на оное. Съ этимъ обыкновенно сопряжено бываетъ сильное напряженіе, вздутость и жаръ брюха, равно какъ и сочувственное возбужденіе, именно горячка. Отправление органовъ, кои покрываютъ воспаленная брюшина, въ скромъ времени разстроивается (*). Впрочемъ явленія та-

37
21

(*) Боль, напряженіе и чувствительность брюха при давленіи суть главнѣйшіе припадки, коими характерически отличается воспаление сіе при жизни, а измѣненіе массы брюшины, отолщеніе ея, измѣненіе створаживаемой пасоки, сыворотки, гноя или кровянистой влаги суть преимущественныя мѣстныя дѣйствія, производимыя имъ. Явленія сіи, сопровождаясь болѣе или менѣе значительною огневицою, могутъ находиться въ различной степени и разныхъ сопряженіяхъ, смотря по возрасту, полу, тѣло-сложенію, по особеннымъ обстоятельствамъ, по свойству principio, по состоянію страждащаго и по времени приключенія болѣзни. Въ слѣдствіе сего воспаленіе брюшины можетъ вос-

ковыя разнствуютъ весьма много отъ мѣстопребыванія воспаленія.

1. Если воспаляется та часть брюшины, которая покрываетъ брюшныя мышцы (*peritonitis anterior, muscularis*), то боль при самомъ легкомъ прикосновеніи къ передней брюшной стѣнѣ, бываетъ очень сильная, умножающаяся отъ растяженія брюха, которое при этомъ ощущается очень напряженнымъ и жаркимъ.

2.) Воспаленіе той части брюшины, которая покрываетъ желудокъ и кишки (*peritonitis intestinorum*) выражается признаками явственнаго воспаленія кишечка (§ 439). —

3. Когда же воспаляется та часть брюшины, которая одѣваетъ заднюю часть брюшной стѣны (*peritonitis dorsalis*), то боли обрѣтаются въ поясничной сторонѣ и наиболѣе въ позвоночномъ столбѣ, умножаясь отъ спинанія и распрямленія спины, а иногда и отъ движенія бедра. Страданіе сего рода весьма сходствуетъ съ воспаленіемъ поясничныхъ мышцъ (*psoitis*) и не рѣдко отъ брюшины переходитъ на самыя мышцы.

принимать острую или хроническую форму, быть спарадитескою либо эпидемическою болѣзнию, обнаруживаться явственно извѣстною многочисленною группою явлений, либо скрытно, едва примѣтными признаками. Оно можетъ также ограничиваться небольшимъ мѣстомъ брюшины и распространяться на знатную область оной, можетъ существовать въ совершенно чистомъ видѣ и сопрягаться съ различными другими болѣзнями и въ явленіяхъ своихъ представлять большую разность, смотря по смежности воспаленной брюшины съ тѣми или другими органами (Dr. *Mac Adam*, in cyclop. of Pract. Med. art. *Peritonitis*). —

§ 269.

Весьма часто воспаление брюшины распространяется на брыжейку и сальникъ, и образуетъ слѣдующія два воспаленія:

a.) *Воспаленіе сальника* (*omentitis*, *epiploitis*, *peritonitis omentalis*), которое оказывается болью около пупка, нарочито умножающеюся отъ прикосновенія къ брюху, также напряженіемъ, опухолью и твердостію, которые ощущаются не въ существѣ мышицъ, но подъ оными въ брюшной полости. Часто воспаленіе сіе распространяется на самой желудокъ, при чёмъ обнаруживается рвота и другіе припадки желудочного страданія. Извѣстные исходы сего воспаленія суть: сращеніе сальника съ кишками, отвердѣніе и отолстѣніе его, иногда обширные парывы и даже антоновъ огонь, особенно если воспаленіе приключилось въ слѣдствіе ущемленія грыжи.

b.) *Воспаленіе брыжейки* (*mesenteritis*, *peritonitis mesenterica*) большею частію бываетъ совершенно скрытое, особенно если воспаляются болѣе желѣзы, нежели складистый составъ (*atrophia meseraica*). Нерѣдко впрочемъ оно обнаруживается болѣе или менѣе сильною болью, которая начинается въ глубинѣ брюха близъ позвоночного столба и простирается къ пупку, умножаясь отъ прикосновенія, кашля, чиханія и согбенія спины, иногда ощущается опухоль и твердость, чаще оказывается упорный запоръ на низъ и даже задержаніе мочи. При остромъ течѣніи болѣзни развивается необыкновенно скорое истощеніе тѣла (*Sundelin*). Воспаленіе

сіе, кромъ разрѣшенія, переходитъ въ отвердѣніе, иного-
да также въ нагноеніе, въ какомъ случаѣ образуются
большіе пары, вскрывающіеся въ брюшную полость
или въ самыя кишкы и причиняющіе гнойные поносы
и сухотку (*phthisis meseraica*).

§ 270.

Течение воспаленія брюшины большею частію бы-
ваетъ острое, а иногда и медленное. *Разрѣшеніе* совер-
шается чаще всего потомъ и мочею. Обыкновенный болѣзненныій исходъ есть *водянистое выпотъніе*, въ
следствіе коего вся брюшная полость, наполняется се-
розною жидкостію, либо образуется т. н. мѣшечная во-
дяная болѣзнь. Отъ *пластического выпотънія* рож-
даются сращенія съ кишками или брюшною стѣною,
причиняющія различные тягостные припадки. Иногда
оказывается также и *гноебразное выпотъніе* и дѣй-
ствительное *нагноеніе*.

Смерть приключается въ сей болѣзни либо отъ же-
стокости сопровождающей оную горячки, либо отъ со-
чувственнаго пораженія мозга и другихъ органовъ, либо
отъ означенныхъ болѣзненныхъ исходовъ.

§ 271.

Распознаваніе сей болѣзни иногда довольно трудно.
Въ особенности весьма часто смѣшивается она съ вос-
паленіемъ кишекъ и коликою. Впрочемъ при воспаленії

кишечъ находится всегда упорный запоръ и рвота, да и самая боль бываетъ сильнѣе и не ожесточается такъ отъ виѣшняго давленія (*Bateman*). Вообще важнѣйшій въ семь случаѣ разпознавательный признакъ составляетъ чувствительность брюха при давленіи. Въ воспаленіи брюшины малѣйшее прикосновеніе причиняетъ боль, а въ воспаленіи кишечъ давленіе на брюхо бываетъ не столь тягостно, да и дѣятельность грудобрюшной преграды во время глубокаго вдыханія и при кашлѣ, также при движеніи тѣла и брюшныхъ мышцъ не производятъ столь мучительныхъ болей, какъ въ воспаленіи брюшины (*Mac Adam*). Колика отличается отъ сего воспаленія отсутствіемъ огневичныхъ движеній, облегчениемъ боли при давленіи, состояніемъ жилобіенія, мгновеннымъ наступленіемъ и пр.

§ 272.

Причины. Воспаленіе сіе случается чаще у взрослыхъ, нежели у дѣтей, болѣе у женщинъ, нежели у мужчинъ, также у сангвиническихъ и полнокровныхъ особъ чаше, нежели у другихъ. *Слугайныя причины* суть: ревматические, составоломкіе и другіе переносы на брюхо, распространеніе воспаленія брюшныхъ внутренностей на брюшину, травматическая поврежденія, виѣшняя насилия, чрезмѣрный напряженія при поднятии тяжести, простуда, пребываніе въ мокрыхъ странахъ, злоупотребленіе хмѣльныхъ напитковъ, а въ пѣкоторыхъ случаяхъ и сочувствіе со смежными органами, какъ бываетъ при родильной горячкѣ.

Воспаленіе сальника происходит иногда отъ ущемленія его въ грыжевомъ мѣшкѣ, а воспаленіе брыжейки отъ употребленія острыхъ ядовитыхъ лѣкарствъ (*Sundelin*), отъ усилившагося золотушного и венерического страданія, даже отъ нѣкоторыхъ злакачественныхъ горячекъ.

§ 273.

Предсказание соображается преимущественно съ большими или меньшими участіемъ, какое оказываютъ брюшныя внутренности на воспаленіе брюшины и съ предполагаемымъ или произшедшемъ уже исходомъ его, такъ какъ образованіе нарыва и антоповъ огонь представляютъ наибольшую опасность.

§ 274.

Леченіе. Кровопускания изъ руки и пьявки либо кро-
вососныя банки, какъ при всѣхъ значительныхъ воспа-
леніяхъ, такъ и здѣсь, могутъ быть назначаемы съ на-
рочитою пользою, впрочемъ при ослабленіи тѣла пред-
почитаются мѣстныя кровоиспражненія. Кроме сего стро-
гая діета, теплый смягчающій и успокаивающій припар-
ки (N. 48) на брюхѣ, общія ванны, нѣжныя нераздра-
жающія промывательныя (N. 37), употребленіе внутрь
умѣряющихъ прохладительныхъ лѣкарствъ (N. 18. 19)
также слизистыхъ и масляныхъ микстуръ въ соедине-
ніи иногда съ легкими слабительными (N. 35) к. с. та-
маринды, (N. 13) манна, фосфорокислый натръ, магне-
зія и пр. составляютъ такія вспомогательныя средства,

+ Можно и дѣлъ сажѣ обойти съ
лучай гентго гадать внутрь
Кефера слабительн. предписаніемъ

XXX Шефъ сиръ Маркъ одойтишъ,
або они Машъ, ани вовсе нечесто
честошутъ, а шибъ гайдутъ; да
напаче въ первомъ періодѣ, коими отиудь препебре-
гать недолжно. Въ иѣкоторыхъ случаихъ съ хорошимъ
успѣхомъ даются легкія, испаренію кожи способствую-
щія лѣкарства (N. 108), какъ уксусокислый амміакъ,
бузинный или малиновый чай и пр. ^{+ +} При наклонности
къ выпотѣнію, особливо во второмъ періодѣ воспаленія,
хlorистая услащенная ртуть (*) есть самое дѣйствитель-
ное, всѣми одобряемое лѣкарство. Въ сie же время и
втираниія сѣрой ртутной мази, также нарывныя средства
на брюхѣ доставляютъ большую пользу. ⁺ Когда воспо-
слѣдуютъ серозныя изліянія и образуется брюшная во-
дяная болѣзнь, то предписывается наперстянка (N 6.)
и всѣ средства противу водяной болѣзни, а при нарыв-
вахъ назначается общее пользованіе ихъ (§ 53.—58).

+ Нарывник сїба во все наїдуть
здесь

(*) Mac Adam рекомендуетъ тотчасъ послѣ местныхъ кровоис-
пражненій давать хlorистую услащенную ртуть, 5—10 гранъ
съ 1 или 2 гранами опія, а потомъ, по прошествіи трехъ
или четырехъ часовъ, предписывать уже гораздо меныше прі-
емы. Послѣ втораго или третьаго пріема ртути послабленію
на низъ можно споспѣшствовать клемевиннымъ масломъ и
промывательными. Если рвота сильна, то дается Сейгнетова
соль съ углекислымъ натромъ и лимоннымъ сокомъ въ состо-
яніи вскипанія до тѣхъ поръ, пока произойдетъ умѣренное
послабленіе на низъ.

ибо они irritant vasa alba.
Ol. Ricini, Balsamum, Mercurio datur

ГЛАВА СЕДМАЯ.

ВОСПАЛЕНИЯ МЫШИЧНОЙ СИСТЕМЫ.

(*Myositides*).

Воспаление мышцъ.

(*Myitis, inflammatio muscularum*).

§ 275.

Воспаление мышцъ рѣдко бываетъ первообразное, самостоятельное, а чаще послѣдственное, произраождающееся отъ острыхъ ревматизмовъ, кои переходятъ съ мышечныхъ влагалищъ, перепончатыхъ, апоневротическихъ частей на смежныя, или принадлежащія имъ мышцы и потому воспаленіе сіе удерживаетъ обыкновенно характеръ ревматического. Рѣдко воспаляются мышцы на большую обятность, а большую частью страдаетъ только одна какая либо группа ихъ,—какъ напр. мышцы шеи, груди, спины, брюха, ляшекъ и пр. Случается также что между ими воспаляется одна только мышца.

§ 276.

Явленія. Чѣмъ ближе къ поверхности тѣла обрѣтаются воспаленные мышцы, тѣмъ явственнѣе бывають признаки воспаленія ихъ. Внѣшняя кожа на страждущихъ

мышницахъ по всему прохожденію ихъ распухаетъ, дѣлается очень напряженнаю и твердою, иногда красною, жаркою и болящею. Самыя мышницы увеличиваются въ обятности и ощущаются твердыми, напряженными и какъ бы окрѣплыми. Боль въ страждающемъ мѣстѣ бываетъ рвущая, жгущая, колющая, рѣдко бьющаяся. Движеніе либо совершенно воспящается, либо произходить только съ мучительными болями. Концы мышничыхъ волоконъ находятся въ судорожномъ состояніи. Если такимъ образомъ поражаются значительныя группы мышницъ напр. грудныхъ или спинныхъ, то больной можетъ двигаться только при жестокихъ боляхъ и принужденъ лежать, какъ оцепенѣлый (*teſtanus rheumalicus*); при чемъ тѣло отъ судорожныхъ сокращеній воспаленныхъ мышницъ сгибается въ такомъ направлениі, въ какомъ онъ дѣйствуютъ к. т. впередъ (*emprostotanus*), на задъ (*opistotanus*) или набокъ (*plevrostotanus*).

Общее страданіе при первоначальномъ воспаленіи оказывается всегда сильною воспалительною, а при послѣдственномъ ревматическою горячкою, сопряженнаю съ значительнымъ пораженіемъ жизненныхъ органовъ и самоощущеніемъ.

Исходы. 1.) *Разрѣшеніе* рѣдко случается въ совершенномъ видѣ; но всегда почти остается на долгое время негибкость мышницъ и боль при движениі, также легкая опухоль въ слѣдствіе выпотѣнія пасоки въ клѣтчатую плеву, окружающую мышницы. 2.) *Нагноеніе* рождается очень часто, особенно отъ неблаговременнаго употребленія мокрыхъ теплыхъ припарокъ (*Langenbeck*)

и, распространяясь быстро, причиняет иногда значительного опустошения.

§ 277.

Причины. Первообразное воспаление сего рода приключается чаще всего отъ травматическихъ повреждений: сильныхъ сотрясенийъ, разрыва мышечныхъ волоконъ, и мимолетныхъ выстрѣловъ; а послѣдственное рождается почти всегда отъ распространенія на мышцы ревматического раздраженія, усилившагося до чрезмѣрности въ слѣдствіе флогистического состоянія при ревматической горячкѣ и пр. (см. ч. 1. стр. 345.)

§ 278.

Предсказаніе назначается преимущественно по причинамъ, мѣстопребыванію, силѣ и распространенію болѣзни. Травматическое воспаление мышцъ имѣеть теченіе подобное флегмонозному и удобно переходитъ въ нагноеніе, напротивъ ревматическое чаще всего разрѣшается, а иногда оставляетъ по себѣ скорченіе членовъ, либо параличъ.

§ 279.

Что касается до лѣченія, то при ономъ также должно имѣть въ виду двѣ означенныя разности. *Первообразное* воспаление мышцъ, причиняемое раненіями разнаго рода, требуетъ неукоснительного умѣренія воспалительного процесса посредствомъ кровопусканія изъ руки и приложенія пьявокъ или кровососныхъ банокъ;

сверхъ того употребленија холодныхъ, (*Schönlein*) или теплыхъ (*Barlow*) примочекъ и прочаго антифлогистического аппарата, смотря по степени и периоду болѣзни. Если произойдетъ нагноеніе, то надлежитъ ускорять созрѣваніе его и вскрывать нарывъ, не дожидаясь даже совершенного смягченія окружной твердости, ибо гной чрезвычайно скоро разливается при семъ въ кѣтчатую плеву, окружающую мышцы и чрезъ то причиняетъ иногда большія опустошенія.

Послѣдственное же или ревматическое воспаленіе пользуется совершенно такъ, какъ острый ревматизмъ. (См. ч. I. стр. 351.) Посему планъ лѣченія его состоить сперва въ пониженіи возвышенной жизнедѣятельности противувоспалительными средствами, напаче селитрою (N. 11); потомъ въ проведеніи и устремленіи соковъ къ периферіи сорьмянными средствами (N. 121), особенно рвотнымъ виннымъ камнемъ (N. 104) и наконецъ въ возстановленіи воспященной накожной дѣятельности потогонительными средствами, къ коимъ принадлежатъ преимущественно уксусокислый амміакъ (N. 108.), Доверовъ порошокъ (N. 7.) и пр. Мъстное лѣченіе въ первомъ періодѣ должно ограничиваться содержаніемъ страждущей части въ теплотѣ, прикрываніемъ ее согрѣтыми компрессами или окутываніемъ фланеллю. Во второмъ періодѣ можно прикладывать травяные мѣшки съ ароматными травами, дѣлать парные бани, но мокрыхъ припарокъ не употреблять.



Воспаление языка.

(*Glossitis*).

§ 280.

Явление. Въ значительной степени болѣзни ротъ бываетъ открытый, языкъ во всей своей обялности увеличенъ и стѣсненъ между зубами, при дотрогиваніи ощущается въ немъ жаръ и сухость, движеніе его весьма трудное, и болѣзненное, рѣчь совершается съ великимъ трудомъ, или вовсе прекращается, жеваніе и глотаніе очень мучительны и слюна безпрестанно вытекаетъ изо рта. Кромѣ сихъ явлений обнаруживается также горячка, головная боль, жажда, тоска, бессонница, беспокойство, непрестанная перхота и харканіе, красное раздутое лицо съ выпученными глазами, либо на противъ блѣдное, впалое, темное и проч.

Течение. Воспаленіе сіе принадлежитъ къ самымъ острымъ болѣзнямъ. Большею частію оно оказывается мгновенно, возрастаетъ до означеннай степени въ одинъ день и разрѣшается на третій, пятый, седьмой или осьмой день. Есть даже примѣры, гдѣ болѣзнь продолжалась 12 и 24 часа (*Lentin*).

Исходы суть: а) *разрѣшеніе*, оказывающееся чаще на седьмой день, при чемъ языкъ дѣлается влажнымъ; обялность его уменьшается и въ полости рта отдаляется много слизи; б) *нарывъ* образуется въ рѣдкихъ случаяхъ. Самой дурной исходъ составляетъ *антомовъ огонь*,

отъ коего болѣшею частію слѣдуетъ смерть и только въ благопріятнѣйшихъ случаяхъ спасается жизнь съ потерю значительной части языка; с.) *отвердніе* случается еще рѣже. Нѣкоторые авторы замѣтили также остающіяся послѣ воспаленія трещины на языкѣ и образование ложной перепонки (*Hunter, Frank*).

§ 281.

Причины бываютъ: а) *механическія поврежденія*, раны языка, наносимыя острыми орудіями, ужаленiemъ насекомыхъ, рыбными костями, укушенiemъ языка при жеваніи, либо въ приступѣ падучей болѣзни и проч. б.) *Острыя химическія средности*, опаленія крѣпкими минеральными кислотами и пр. с.) *Распространеніе* на языкъ другихъ страданій, какъ обыкновенно бываетъ при воспаленіяхъ горла, при употребленіи ртути и рождающемся отъ того воспаленіи десенъ и слюнныхъ желѣзъ (*hydrargyrosis*), при оспѣ, молошницѣ, тифозныхъ горячкахъ, ревматическомъ и составоломномъ страданіяхъ, напаче послѣ простуды языка холоднымъ питьемъ. Прекращеніе мѣсячнаго очищенія и геморроя, скрывающейся ножной потъ, по наблюдению нѣкоторыхъ, бываютъ также причиною сей болѣзни.

§ 282.

Предсказаніе. Такъ какъ воспаленіе сіе имѣетъ толь быстрое теченіе, то и не можетъ почитаться бе-

зопаснымъ. Будучи оставлено безъ всякаго вспомоществованія, оно часто наносить смерть чрезъ удушение. Впрочемъ дѣятельныя мѣры искусства много ограничиваютъ его умноженіе и опасность. Вообще оно удобно излѣчиваются, если только подана будетъ во время надлежащая помощь.

§ 283.

Лѣченіе: а.) *По причиннымъ показаніямъ.* Если воспаленіе произошло отъ посторонняго тѣла напр. отъ рыбьей кости, отломка иголки и т. п., то надлежитъ стараться, сколько возможно заблаговременнѣе, извлечь оныя. Острыя углы зубовъ обпилить, а камни, зараждающіеся между ими удалить и пр. При отложеніи ревматической матеріи надобно возстановлять ревматизмъ на первоначальномъ мѣстопребываніи онаго наводящими красноту и нарывными средствами, парною банею и употребленіемъ внутрь потогонительныхъ лѣкарствъ. При скрывающемся ножномъ потѣ стараться производить омынѣніемъ ногъ, сухими ваннами изъ теплой золы, либо нагрѣтой горчицы, окутываніемъ ногъ лисьимъ или другимъ подобнымъ мѣхомъ и подкладываніемъ подъ оныя нагрѣтыхъ кирпичинъ, либо кувшиновъ, наполненныхъ горячею водою. Воспаленіе языка, происходящее отъ употребленія ртути (*glossitis mercurialis*) лучше всего облегчается и уничтожается частымъ держаніемъ ворту очень холодной воды, умѣренными кисловатыми слабительными и ежедневно дѣляемыми сѣрными ваннами, довольно теплыми.

б.) *По существеннымъ показаніямъ.* Въ легкихъ слухалахъ, гдѣ проходъ въ глотку находится еще от-

крытымъ, можно доставлять большую пользу противу-воспалительнымъ содержаніемъ, слабительными изъ сѣрно-кислой магнезіи (N. 20.), рвотнаго камня, хлористой услащенной ртути и т. п.; а особливо припущеніемъ пыльцовъ въ достаточномъ количествѣ къ подбородку и окружности его, даже къ самому языку, либо вскрытиемъ жабьей вены, если позволяетъ состояніе болѣзни. Послѣ сего можно пропускать въ ротъ пары изъ настоя бузиновыхъ цвѣтовъ горячею водою съ уксусомъ и выполаскивать прилежно ротъ слизистыми отварами съ примѣсью селитры, либо пашатыря и уксуса;—если же мутильное движение челюсти, или невозможность довольно раскрыть ротъ, препятствуютъ надлежащему выполаскиванію, то лучше означенныя средства вспрыскивать въ ротъ. Для таковой же цѣли можетъ служить отваръ винныхъ ягодъ, мелилотной травы, цвѣтовъ бузины и мальвы съ молокомъ, или съ водою, также помазываніе языка миндалевымъ масломъ или слизью квитовыхъ сѣмянъ, либо медомъ съ примѣсью селитры. На шеѣ и подъ челюстью дѣлается съ пользою припарка изъ линяныхъ сѣмянъ, молока и опія, а въ послѣдствіи времени прикладывается нарывной пластырь вокругъ шеи, либо на затылкѣ при употребленіи смягчающихъ клистировъ (N. 37.), ножныхъ и ручныхъ ваннъ и пр.

Въ сильнейшей степени воспаленія необходимо нужна скорая помощь. Кровопусканіе изъ наружной яремной вены доставляетъ несравненную пользу, но жаль, что кровотеченіе послѣ того въ некоторыхъ случаяхъ весьма трудно останавливать и потому оно ча-

ще замѣняется кровопусканиемъ изъ руки. Впрочемъ несомнѣнную пользу доставляютъ здѣсь насѣчки, дѣлаемыя на самомъ языкѣ, числомъ двѣ или три, смотря по угрожающей опасности, и при томъ такъ, чтобы они, при нарочитой длины, проникали въ существо языка на двѣ трети толщины его. Кровотеченіе послѣ того надлежитъ поддерживать, сколько возможно долѣе, пропуская теплыя пары изъ отвара бузиновыхъ цвѣтковъ и пр. Послѣ сего языкъ въ скоромъ времени получаетъ натуральную свою величину и при выполоскваніи рта отваромъ мальвы съ розовымъ медомъ, чрезъ нѣсколько дней, на мѣстѣ глубокихъ нарѣзовъ остаются только возвышенныя линіи. Если же и сіе средство не оказываетъ должнаго дѣйствія, то, во избѣжаніе угрожающей ежеминутно опасности, остается ожидать помощи только отъ разсѣченія гортани или дыхательнаго горла (Glotto-chotomy s. tracheotomia).

c.) *По припадочнымъ показаніямъ.* При совершенной невозможности глотать, питательные вещества вводятся посредствомъ клистировъ нижнимъ путемъ. Можно также вкладывать для сего въ глотку эластическую трубку съ воронкообразнымъ отверстиемъ, проводя ее чрезъ носовую полость и помощьюъ оной даватьльному потребнаго лѣкарства и пищу.

Когда воспаленіе переходитъ въ нагноеніе и образуется нарывъ въ языкѣ, то надлежитъ тотчасъ вскрыть его приличнымъ орудіемъ и приводить къ заживленію вышеозначенными отварами для выполоскванія рта. При остающейся послѣ разрѣшенія или нагноенія твердости въ какомъ либо мѣстѣ языка дается съ пользою

услажненная ртуть, ext. hyosciami, belladonae etc. Антото-
новъ огонь всегда сопряженъ съ потерю большей или
меньшей части языка и съ ужаснейшими явлениями,
при коихъ большую частью слѣдуетъ смерть.

Воспаление сердца.

(*Carditis*).

§ 284.

Различные ткани, входящія въ составъ сердца, могутъ воспаляться порознь, или вмѣстѣ; но отъ разности устройства ихъ и самыя воспаленія различно выражаются. Воспаленіе серозныхъ покрововъ сердца (*pericarditis*) описано уже прежде (§ 263). Здѣсь остается еще разсмотрѣть 1) воспаленіе плости сердца, его заслонокъ и сухожильныхъ мѣстъ (*endocarditis*); 2.) воспаленіе мышечной ткани сердца (*carditis p. s. dicta*).

§ 285.

Явленія. I. Воспаленіе полости сердца (*endocarditis*) вообще несопровождается болью. Она находится только въ то время, когда существуетъ сопряженіеъ воспаленіемъ околосердечія или грудной плевы; напротивъ того здѣсь оказывается гораздо болѣе призна-

36

ковъ общаго изнеможенія, стѣсненія въ груди и тоски съ большою наклонностію къ обморокамъ. Иногда замѣчается иѣкоторая выпуклость на сторонѣ сердца, которая пріимѣтио потрясается силою ударовъ сердца и обнаруживаетъ дрожащее зыбленіе. Удареніе въ грудь издастъ глухой тонъ. Изслѣдованіе стетоскопомъ показываетъ шумъ надутаго пузыря, который часто заглушаетъ одно или оба нормальные тоны сердца и тѣмъ сильнѣе бываетъ, чѣмъ крѣпче ударенія сердца. (Сей шумъ происходитъ отъ того, что сердечные заслонки припухаютъ отъ воспаленія или покрываются пластическимъ выпотѣшіемъ и потому изліяніе крови изъ сердца болѣе или менѣе воспращается). Иногда слышится также металлическій звукъ. Ударенія сердца простираются въ минуту до 140 или до 160 и больше ча-стію бываютъ неправильныя. Жилобѣеніе нерѣдко бываетъ очень слабое и удареніямъ сердца несоответствуетъ ни числомъ, ни силою. Острое состояніе такового воспаленія сопровождается очень часто огневичнымъ противудѣствіемъ. При большомъ воспращеніи кровообращенія лице дѣлается синевато-краснымъ, но нераспухаетъ, больные имѣютъ чувство удушенія, бросаются безпрестанно туда и сюда, страждуть совершенно безсонницею, покрываются холодными потами и впадаютъ въ бредъ и обмороки.

§ 286.

II. Воспаленіе мышечнаго существа сердца (*carditis*) очень рѣдко встрѣчается само по себѣ, но больше ча-стію либо вмѣстѣ съ воспаленіемъ серозныхъ

покрововъ сердца (pericarditis), либо съ воспаленіемъ полости сердца (endocarditis). Если оно случается само по себѣ, то обнаруживается измѣненіемъ физиognomіи, величайшою тоскою и обмороками, частыми вздохами, труднымъ дыханіемъ, ослабленіемъ или совершеннымъ уничтоженіемъ голоса, безпрерывнымъ ощущеніемъ жара и тяготѣнія въ сердечной сторонѣ, сильнымъ беспорядочнымъ бѣніемъ и трепетаніемъ сердца съ твердымъ, крѣпкимъ, но неровнымъ, а иногда и перемежающимся жилобѣніемъ, холодомъ и посиненіемъ конечностей и проливными потами.

§ 287.

Течение воспаленія сердца часто бываетъ очень скотичное, иногда же оно длится значительное время. Разрешеніе его оказывается при сообразномъ лѣченіи обыкновенными переломами воспаленія. Смерть слѣдуетъ иногда въ первые два дни, но большую частью гораздо позже, въ слѣдствіе болѣзнейныхъ исходовъ воспаленія.

§ 288.

Исходы. Воспаленіе полости сердца производить часто парашеніе ложныхъ перепонокъ, отвердѣніе и отолъщеніе заслонокъ, съуживаніе сердечныхъ отверстій, произрожденіе полиповъ и различныхъ другихъ измѣненій, известныхъ подъ названіемъ пороковъ сердца; а воспаленіе мышечного существа сердца оканчивается иногда образованіемъ нѣкоторыхъ слѣдовъ гноя подъ внутрен-

нею перепонкою и между мышечными волокнами, но настоящий нарывъ сердца и антоновъ огонь въ ономъ до селѣ еще небылъ замѣченъ.

§ 289.

Причины. Особенное расположение къ воспаленію сердца имѣютъ люди очень раздражительного темперамента и такие, кои уже одинъ разъ страдали сею болѣзнию.

Случайные причины суть: сильный сердечный движениѣ, въ особенности гнѣвъ, испугъ, продолжительная печаль, чрезмѣрие движениѣ тѣла, вліяніе сильнаго огневичнаго жара, или особенной заразы, прекращенія кровотеченія, пьянство, механическія поврежденія, по преимуществу (по *Bouillaud*) мгновенная сильная простуда, напиache при разгоряченіи тѣла, почему воспаленіе сердца часто случается въ одно время съ острымъ ревматизмомъ и составоломомъ.

§ 290.

Предсказание. Что воспаленіе сердца есть одна изъ опаснѣйшихъ болѣзней, явствуетъ уже изъ предыдущаго. Впрочемъ если она заблаговременно узнается и въ самомъ началѣ пользуется правильно и съ возможною дѣятельностію, то переходитъ иногда въ совершиенное выздоровленіе. Однакожъ это случается рѣдко. Въ большей части случаетъ оканчивается она смертію, тѣмъ скорѣе, чѣмъ обширнѣе воспаленіе, чѣмъ болѣе поражаетъ оно

самое существо сердца и чѣмъ сильнѣе горячка, сопровождающа воспаленіе.

§ 291.

Леченіе. Въ остромъ воспаленіи сердца необходимо нуженъ скорый и сильный антифлогистический способъ; больной долженъ соблюдать величайшее спокойствіе, предохранять себя отъ всѣхъ, даже малѣйшихъ раздражающихъ вліяній, стараться о свободномъ испражненіи низа и тотчасъ дѣлать одно или иѣсколько обильныхъ кровопусканій, а въ слѣдъ за тѣмъ принимать услащенную ртуть каждый часъ 2—4 гранъ, пока восполнѣуетъ кашицеобразное испражненіе низа, также селитру въ большихъ пріемахъ (3—4 др. въ сутки) и другія противувоспалительныя соли, коихъ дѣйствіе можно поддерживать обильнымъ питьемъ воды съ очищеннымъ виннымъ камнемъ, растительными кислотами, малиновымъ, апельсиннымъ соками и пр. Для умѣренія сильнаго движения сердца послѣ предшествовавшаго кровоиспражненія предписывается употребленіе наперстянки (N 6.26) или табачныхъ листьевъ. Мѣстныя отвлеченія крови посредствомъ кровососныхъ банокъ или пьявокъ прикладываются къ сердечной сторонѣ (20—30) также не должны быть забываемы. Иногда при семъ полезно поддерживать легкій потъ теплымъ окутываніемъ больнаго ипр.

При медленномъ теченіи воспаленія, сверхъ кровопусканій, употребляются отводящія средства к. т. нарывной пластырь, мазь изъ рвотнаго винного камня, ручные и ножныя ванны, горчичники, прикладываемые

къ плечамъ и пр., а впурѣ сишильная кислота, (N. 36), наперстянка, (N. 26.54), лавровишневая вода (N. 5.) и пр.

По щастливомъ удаленіи воспаленія выздоравливающій долженъ еще не сколько недѣль наблюдать спокойствіе, избѣгать всякаго тѣлеснаго напряженія, всякаго душевнаго возбужденія, всѣхъ страстей и содержать строго легкую нераздражающую диету, пока исчезнутъ всѣ следы прежней болѣзни и возвышенной раздражительности кровоносной системы.

37
13. **Воспаленіе грудодоброшной преграды.**

(*Diaphragmatitis*).

Syn. Inflammatio diaphragmatis s. septi transversi; paraphrenesis, paraphritis diaphragmatica.

§ 292.

Явленія. Воспаленіе сie обнаруживается жестокою жгучею, стягивающею или скручивающею болью, которая подъ грудною костью распространяется по направлению преграды попрѣгъ чрезъ животъ и умѣжается отъ кашля, глубокаго вдыханія, глотанія и прикосновенія къ грудной ложбинкѣ, сопровождаясь также чувствомъ большой тоски. Верхняя часть брюха ощущается при семъ напряженіи; иногда сильно втянуто впурѣ, жаркою, съ примѣтнымъ въ онай біенiemъ; дыш-

ханіе бываетъ короткое и скорое, подобное дыханію собакъ въ лѣтній зной; часто также рождастся сухой кашель и икота; глотаніе затрудняется, а иногда дѣлается даже невозможнымъ; нерѣдко оказывается сильная удавка и рвота; черты лица при семъ измѣняются особыеннымъ образомъ и въ нихъ выражается тоска; жилобіеніе бываетъ скорое и твердое, часто малое и неправильное. При достижениіи высокой степени, появляются нерѣдко корчи въ глоткѣ, затылкѣ и верхнихъ членахъ, преимущественно въ личныхъ и губныхъ мышцахъ, коими причиняется сардонической смѣхъ (*risus sardonicus, spasmus cynicus*) также тихій, или свирѣпый бредъ.

§ 293.

Течение сей болѣзни, по сдѣланнымъ доселѣ наблюденіямъ, бываетъ всегда острое. Въ разрѣшеніе переходитъ оно при обыкновенныхъ критическихъ явленіяхъ. Иногда образуются нарываы, пролагающіе путь въ грудную или брюшную полость. Замѣчено также изъязвленіе грудобрюшной преграды, которое оказывалось грызущими болями, упорною икотою, частою рвотою и большою тоскою. Отолщеніе и срашеніе сей преграды, производимыя иногда воспаленіемъ онай, часто сопряжены съ иканіемъ и труднымъ дыханіемъ. Смерть приключается либо отъ повсемѣстного чрезмѣрного раздраженія первовъ, въ какомъ случаѣ она слѣдуетъ при корчевыхъ припадкахъ, либо отъ перехода воспаленія въ антоновъ огонь, или же отъ нагноенія и его послѣдствій.

§ 294.

Причины. Воспаление сие, соединенное часто съ воспалениемъ серозныхъ оболочекъ, мышицъ, сухожильныхъ частей и нервовъ, можетъ приключаться отъ виѣнъ-нихъ насилий, большихъ напряженій грудобрюшной преграды при подниманіи и ношеніи грузныхъ тяже-стей, сильномъ бѣганіи, рвотѣ и пр.; отъ вогнувшагося внутрь мечеобразнаго хряща при крѣпкомъ стягиваніи шнурованіемъ, отъ распространенія воспаленія смеж-ныхъ частей напр. воспаленія груди на грудобрюшную преграду, отъ простуды, отступившаго составолома, рев-матизма и другихъ отложенийъ.

§ 295.

Предсказаніе. Болѣзнь сія весьма опасна и въ семъ отношеніи занимаетъ ближайшее мѣсто послѣ воспаленія мозга; впрочемъ жестокость ея зависитъ при семъ отъ разности пребыванія воспаленія въ той или другой ча-сти грудобрюшной преграды, также отъ распространенія она: ибо при воспаленіи нѣкоторыхъ частей сей пре-грады припадки недостигаютъ высокой степени жестоко-сти. Кажется мѣстопребываніе его въ средней сухо-жильной части преграды преимущественно сопряжено съ опасными и мучительными явленіями.

§ 296.

Лѣченіе должно быть сильное противовоспалительное и успокаивающее. Здѣсь во особенности употребляются

обильныя кровопускания и пьявки, которыя должны быть назначаемы и тогда, когда усматриваются разительные явления ослаблений тѣла и даже корчи, также селитра въ эмульсияхъ (N 62), а потомъ услажненная хлористая ртуть, теплое питье, теплый смѣгчающій и успокаивающій мази (N 49) и припарки (N 48). При семъ всячески должно остерегаться, что бы жалобы больныхъ на чрезвычайное ослабление, тоску и другіе судорожные припадки не могли иногда склонить врача на употребленіе возбуждающаго противусудорожнаго лѣченія, а минимум гастрические припадки на предписаніе рвотныхъ. По уменьшѣніи силы воспаленія большую пользу доставляютъ употребленіе экстракта белены (N 1,77.), кодеина (N 2), лактукарія (N 3) и даже опія (N 7.77.), благоразумно предписываемаго, который наиболѣе укрощаетъ столь мучительную здѣсь и вредную для воспаленія икоту. Подъ конецъ болѣзни, для отвращенія сращеній чрезъ пластическое выпотѣніе дается съ успѣхомъ услажненная ртуть и златоцвѣтная сюрма съ болиголовомъ (N 134).

Воспаленіе поясничныхъ мышцъ.

(*Psoitis*).

Syn. Myitis lumbalis, inflammatio m. lumbalium, apoplexia psoiticum Mason Good.

§ 297.

Воспаленіе сіе имѣетъ свое мѣстопребываніе въ наружной (m. quadratus lumborum) и внутреннихъ пояс-

ничныхъ мышицахъ (m. psoas major et minor), равно какъ и въ окружающей ихъ кѣтчатой пlevѣ. Оно раздѣляется на острое и хроническое.

a) *Острое воспаленіе* (psoriasis acuta) обнаруживается сильною въ поясничной сторонѣ болью, которая простирается внизъ по ляшкѣ и вверхъ по спинѣ и умножается при всякомъ покушеніи поднять или расправить ляшку и стать прямо, оставляя послѣ того тупое чувство въ ляшкѣ. При семъ оказывается также сильная горячка, твердое жилобѣеніе, согбеніе ноги въ колѣнѣ, или въ сочлененіи бедра съ вертлужною впадиною, но отдѣленіе и испражненіе мочи большою частію совершаются нормально.

b) *Хроническое воспаленіе* (psoriasis chronica) отличается непостоянною, послабляющею болью въ пояснице, которая при движеніи ляшки неумножается до такой степени, какъ въ остромъ воспаленіи, такъ что человѣкъ можетъ ходить, согнувшись нѣсколько впередъ и не подвергается никакой, или только очень слабой горячкѣ; впрочемъ поворачивание въ постелѣ весьма мучительно для больнаго. Нерѣдко однакожъ форма сего воспаленія имѣетъ столь скрытое теченіе, что его весьма трудно примѣтить и въ существовавшей прежде болѣзни можно удостовѣриться только въ послѣдствіи времени изъ скопленія гноя въ какомъ либо мѣстѣ.

§ 298.

Распознаваніе весьма трудно, ибо воспаленіе можно смѣливо со страданіемъ, зависящимъ отъ присут-

ствія камней въ почкахъ, съ геморроемъ и первою чресленою болью (*ischias nervosa; sciaticque*). Впрочемъ явственное облегченіе при согбеніи тѣла впередъ, умноженіе боли при всякомъ покушеніи согнуться назадъ, приподняться, или поворотиться и присоединяющаяся къ тому въ скоромъ времени горячка, или медленная лихорадка (*febris lenta*) могутъ и некоторымъ образомъ служить къ отличію воспаленія поясничныхъ мышцъ отъ другихъ страданій.

§ 299.

Исходы. Болѣзнь сія разрѣшается довольно рѣдко, но большею частію переходитъ въ нагноеніе, раждающееся скоро или медленнѣе, смотря по степени воспаленія. Гной скапливается при семъ въ клѣтчатой плевѣ, окружающей внутреннія поясничныя мышцы и погружается внизъ по направленію сихъ мышцъ, образуя чрезъ то опухоль въ паху, подъ пупартовою связкою, или близъ прямой кишкѣ и пр. При таковомъ накопленіи гноя болѣй чувствуетъ боли въ пояснице, хожденіе его затрудняется, во время кашля раждается движение въ опухоли, при горизонтальномъ положеніи опухоль дѣлается менѣе, кожа на оной въ началѣ не измѣняется. Если объятность нарыва незначительна, то рѣдко раждается отъ того истощеніе тѣла съ почными потерями и медленною лихорадкою. Когда же наривъ, постепенно увеличиваясь, воспаляется и прорывается, то сперва вытекаетъ гной безъ запаха, а потомъ очень зловонный и силы болѣаго въ скоромъ времени исто-

щаются, либо отверстіе сжимается и можетъ на долгое время оставаться свищевымъ.

§ 300.

Причины: напряженіе или удрученіе поясничныхъ мышицъ, производимое скачкомъ, поднятиемъ грузовой тяжести, трудными, натужными работами, толчкомъ, паденiemъ, ушибомъ, сотрясеніемъ тѣла, очень сильнымъ разведеніемъ ляшекъ во время родовъ (*Kyll*) и пр. При незначительномъ дѣйствіи таковыхъ причинъ оказывается хроническое воспаленіе, а въ противномъ случаѣ остroe. Часто также болѣзнь сія причиняется отъ простуды, ревматизма, ломоты и золотухи, а иногда бываетъ слѣдствіемъ горячекъ или прекращенныхъ кровотечений, напиache геморроидального.

§ 301.

Предсказаніе большею частію неблагопріятное, особенно въ хроническомъ воспаленіи. По трудности распознаванія болѣзни сія рѣдко въ самомъ началѣ своемъ пользуется приличнымъ образомъ, а потому легко переходитъ въ нагноеніе, отъ коего часто разрушаются kostоюдою поясничные позвонки и слѣдуетъ смерть отъ изнурительной лихорадки.

§ 302.

Лечение должно быть сообразно степени воспаленія и его причинамъ.

1.) При *сильномъ, остромъ воспаленіи* надлежитъ поступать антифлогистически, пускать кровь изъ руки, давать внутрь селитру (N 61.62), умеренный слабительный прохладжающаго рода (N 13.14.15.), при чрезмѣрныхъ боляхъ услаженную ртуть съ опіемъ, либо съ вытяжкою белены и пр., снаружи приставлять пьявки, или кровососныя банки на поясницѣ и дѣлать теплые примочки. Больной долженъ соблюдать спокойствіе, находится въ горизонтальномъ положеніи и избѣгать всякаго разгоряченія и движенія. По прошествіи осми дній, когда припадки воспаленія уменшатся, но нагноеніе не обнаружится, внутрь дается услаженная ртуть съ златоцвѣтною сюрьмою, болиголовомъ (N 139), вытяжкою белены, камфорою и проч. а снаружи предписывается втирание летучихъ мазей и прикладываніе нарывныхъ пластырей, поддерживая ихъ нарывы долгое время въ нагноеніи.

2.) Если же *воспаленіе* болѣе медленное, скрытое и происходит отъ простуды, ревматизма или составо-лома, то употребляются уксусокислый жидкій амміакъ въ настоѣ бузиновыхъ цвѣтовъ (N 82), рвотный камень (N 108) въ малыхъ приемахъ, Доверовъ порошокъ (N 7), камфора (N 21.) и пр.; преимущественно же теплые ванны, втирание летучихъ и разрѣщающихъ мазей (N 122), нарывные пластири и фонтанели. По переходѣ воспаленія въ нагноеніе, образующіяся отъ скопленія гноя опухоли, достигшия даже значительной объятности, разрѣшаются иногда, хотя рѣдко, (*Crowther, Abernethy*) отъ продолжительного дѣйствія нарывныхъ средствъ, либо фонтанелей, дѣлаемыхъ въ поясничной сторонѣ, так-

же отъ общаго лѣченія, коимъ приводятся въ порядокъ разстроенныхъ отиравлениія брюшныхъ внутренностей и поддерживаются силы больнаго.

Когда же при такомъ лѣченіи, нарывъ безпрестанно увеличивается, то его надлежитъ вскрыть (*Bell*) топкимъ троакаромъ или ланцетомъ, который вонзается въ нарывъ въ косвенномъ направлении (*). Гной, буде возможно, испражняется разомъ весь безъ прерыванія истеченія его. Разрѣзанная рана соединяется точнѣшимъ образомъ посредствомъ липкаго пластыря (*Abernethy*) и на оную накладывается легкая компрессивная повязка; больной содергится въ спокойствіи и предложенный способъ лѣченія продолжается. Рана застаетъ обыкновенно въ не сколько дней, но гной въ большей части случаевъ скапливается опять, только не въ столь большомъ количествѣ, какъ прежде. Когда опухоль отъ вторичнаго скопленія гноя возвысится надлежащимъ образомъ, то испражненіе оной можно предпринимать показаннымъ способомъ, совершая сіе при всякомъ наколеніи, образующемся снова. Худо, если полость нарыва, по испражненіи гноя, сильно воспаляется. Здѣсь должно стараться уменьшить воспаленіе спокойнымъ содержаніемъ, приличнымъ антифлогистическимъ лѣченіемъ и испражненіемъ гноя. Когда припадки изпурительной ли-

(*) *Kirkland* уверяетъ впрочемъ, что больной погрѣшилъ выздоровѣть, если нарывъ самъ собою вскроется и гной испразнится очень постепенно чрѣзъ малое отверстіе. Хотя это согласно съ положеніями § 55; однако жъ въ этомъ отношеніи нельзя поступать во всѣхъ случаяхъ сообразно съ мнѣніемъ *Kirkland*-а.

корадки значительны, или отверстіе нарыва здѣлается фистулознымъ, (что можетъ зависѣть отъ внутренней причины, отъ костоѣды поясничныхъ позвонковъ, или отолѣтія стѣнъ наривной полости), то силы больнаго надлежитъ сколько возможно поддерживать крѣпительными средствами (№ 9. 47. 71. 96.) и приличною дѣтою, стараясь также противудѣйствовать общей причинѣ, если оная можетъ быть открыта.

ГЛАВА ОСЬМАЯ.

ВОСПАЛЕНИЯ ЖЕЛѢЗИСТЫХЪ ОРГАНОВЪ.

(*Adenitides*).

§ 303.

Желѣзы (*glandulae, adœves*), въ общириномъ значеніи слова, суть мягкие кругловатые органы, кои состоятъ изъ особенной ткани, съ значительнымъ числомъ сосудовъ и первовъ и въ коихъ либо притекаемые соки претерпѣваютъ только перемѣну смѣшанія, либо отдѣляются собственнаго рода жидкость изъ крови. Отдѣленіе въ желѣзахъ совершается дѣйствиемъ органической силы и не можетъ быть объяснено ни чисто механическимъ, ни химическимъ актомъ. Желѣзы, при безпрестанномъ вліяніи первовъ, отвлекаютъ отъ крови известныя состав-