


PK-196
504874

138²
67 21

~~21. III~~

~~79~~

~~1541~~



26/IV.

28

~~138³~~ ~~37~~ № 336
Н А У К А

О МОКРОТНЫХЪ СУМОЧКАХЪ

ТѢЛА ЧЕЛОВѢЧЕСКАГО,

сочинение Докторомъ Медицины и Хирургии, Операторомъ, многихъ ученыхъ Обществъ, разныхъ Государствъ Членомъ и Корреспондентомъ, старшимъ Докторомъ Императорскаго М. Воспитательнаго Дома и его заведѣній, Ординарнымъ Профессоромъ Императорскаго Московскаго Университета и Императорской Медико-Хирургической Академіи, и Деканомъ Врачебнаго Отдѣленія Императорскаго Московскаго Университета, Членомъ Совѣта при Министерствѣ народнаго просвѣщенія, Коллежскимъ Совѣтникомъ и Ордена Св. Владимира 4й степени Кавалеромъ,



ЕФРЕМОМЪ МУХИНЫМЪ.

для РУКОВОДСТВА ОБУЧАЮЩИХСЯ
ВРАЧЕБНОЙ НАУКѢ.

ИЗДАНІЕ ВТОРОЕ ИСПРАВЛЕННОЕ И УМНОЖЕННОЕ

МОСКВА, 1816.

Въ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ТИПОГРАФІИ.



Печатать дозволяется съ шѣмъ, чтобы по отпечатаніи, до выпуска въ продажу, представлена были въ Цензурный Комитетъ одинъ экземпляръ сей книги для Цензурнаго Комитета, другой для Департамента Министерства просвещенія, два экземпляра для Императорской публичной Библиотеки и одинъ для Императорской Академіи Наукъ. Апрѣля 24 дня 1816 года. Ординарный Профессоръ и Кавалеръ Иванъ Двигубскій.



82

ПРЕДИСЛОВІЕ

ко второму изданію.

Наука о мокротныхъ сумочкахъ никогда не была преподаваема въ Москвѣ, какъ въ Императорскомъ Московскомъ Университетѣ, также въ Медико-Хирургической Академіи, до вступленія моего въ должность Профессора Анатоміи. Не существовало также до сихъ порѣ никакого сочиненія о семъ предметѣ на отечественномъ нашемъ языке. Почему вступивши въ должность предшественниковъ моихъ по сей части Врачебныхъ наукъ, мужей толико прославившихся своею ученосшю любовію къ пользѣ наукъ и отличіями заслугъ ихъ, предлежалъ мнѣ сугубый трудъ: 1) Изобрѣсть приличнѣйша наименованія для предметовъ сей науки и сочинить оную въ классическомъ видѣ для учащихся во врачебныхъ заведеніяхъ, въ коихъ я имѣю честь меж-

ду прочимъ преподаватъ анатомической науки, а 2й надлежало мнѣ пріучить Гг. Прозекторовъ, приготавляя мокротныя сумочки, опрѣдѣльши оныя надлежащимъ образомъ анатомически, для показанія учащимся при лекціяхъ. По долговременномъ усилии моемъ въ трудахъ сихъ, весьма лестно было видѣть возрасшающіе успѣхи въ семъ новомъ и многопрудномъ начинаніи; и я нынѣ имѣю честь съ удовольствіемъ моимъ сказать, что я доспѣгъ въ семъ родѣ упражненія желаемой цѣли. Наука сія, сочинена будучи мною въ первой разѣ, на Россійскомъ языкѣ была подвержена разсмотрѣнію ученыхъ Мужей Императорскаго Московскаго Университета. Послѣ чего она признана за классическую и напечатана на иждивеніи Университета. Послѣ изданія преподалъ я практическіи оную, нѣсколько разѣ какъ въ Университетѣ, также въ Медико-Хирургической Академіи учащимся. Разностъ труповъ и способовъ приготовленія сихъ сумочекъ открыла мнѣ,

III

что нѣкоторыя мои изложенія о семъ предметѣ не совсѣмъ показались мнѣ удовлетворительными. Почему я, изобрѣтши приличнѣйшія и удовлетворительнѣйшія выраженія для предметовъ сей науки и сдѣлавши нѣкоторыя дополненія вѣ оной, сыскавъ за полезнѣйшее издать впюрично оную, изъ любви къ наукамъ и къ вѣющѣй пользѣ учащихся, для употребленія при лекціяхъ и купно съ цѣлію, что она послужитъ Врачамъ, любезнымъ соопечамъ моимъ, первымъ и надежнѣйшимъ основаніемъ къ познанію болѣзней мокропныхъ сумочекъ и къ успѣшному врачеванію оныхъ.

Разсуздая о порядкѣ Анатомическаго ученія, которое до сего времени по различію предметовъ раздѣлялся на 7 частей, а именно; на *костесловіе*, *связесловіе*, *мышцесловіе*, *внутреннословіе*, *сосудословіе*, *нервословіе* и *желѣзословіе*, я сыскиваю, что наука о *сумоскахъ*, какъ по устроенію (*structura*) предметовъ ея, также и по цѣли,

для какової м. сумочки находящіяся въ тѣлѣ человѣческомъ, не съ осиншися ни къ какой изъ числа 7ми означеныхъ частей Анатоміи; почему она должна занимать особенное мѣсто въ скаженнѣи порядкѣ. А какъ мокротыя с. принадлежатъ къ числу пособій, находящихся въ тѣлѣ, для лучшаго дѣйствія мышецъ; то и слѣдуетъ, кажется мнѣ, щитать часть сію Анатоміи 4ою. Такимъ образомъ на основаніи различія устроенія тѣла человѣческаго, помѣстивши сію науку между прочими частями Анатоміи, должно будетъ раздѣлять Анатомію на 8 частей по числительному порядку. Принявши сіе за правило, открывается, что Анатомія присвоивши науку себѣ о мокротныхъ сумочкахъ, получаетъ нарочитое приращеніе въ кругу своихъ предметовъ.

Я надѣюсь, что любители наукъ удостоятъ сей трудъ мой благосклоннаго вниманія и тѣмъ подадутъ мнѣ пріятный случай продолжать труды мои на общую пользу.

В В Е Д Е Н И Е

къ первому изданію.

Въ нынѣшнія времена, когда всѣ науки, а между оными Анатомія и Физіология, какъ надежнѣйшія основанія или опоры Врачебной и Рукодѣятельной науки, взошли и въ Россіи весьма скорыми шагами на верхъ совершенства своего, ясно доказано, что нѣтъ ни малѣйшаго сомнѣнія между прочимъ въ томъ, что всѣ органическія части тѣла человѣческаго соединены между собою клѣпчашою плею; всѣ мягкія части онаго и даже каждое волоконцо, составляющее ихъ, имѣютъ большую часть онай въ своемъ составѣ; что всѣ клѣпочки пlevы сей въ здоровомъ состояніи имѣютъ взаимное между со-

бою сообщеніе чрезъ свой отверстія, такъ чи по воздухъ, будучи вдунутъ надлежащимъ образомъ, или самъ случайно взошедши. въ одну изъ числа синихъ, также какъ влага, какъ то: вода, масло, спиртъ, кровь, гной, молоко, пасока и даже ринуть весьма удобно и довольно свободно входить изъ одной въ другія клѣпочки, ей смежныя, чи по очевидно подтверждають опеки (oedema), водянка или водяная болѣзнь клѣпчатой плевы, кровоизлѣяніе (ecchymosis) и гноянки перемѣщенныя (abscessus metastaticus) и проч.

Клѣпочки шаковыя всегда мягки, влажны, въ здоровомъ состояніи отъ жидкости, которая, испаряясь изъ пасочныхъ сосудовъ, орошающъ и смягчающъ ихъ, и составляющъ живопишу полноту (turgor animalis); а избыточ-

ствующее количество ея, находящееся въ клѣткахъ, поглощаемо будучи всасывающими сосудами, обыкновеннымъ путемъ поступающими въ кровеносные сосуды. Въ клѣткахъ совершаются живопворный процессъ (*processus phlogisticus animalis*).

Пока равномѣрное шаковое дѣйствіе всасывающихъ сосудовъ съ испаряющими существуетъ, до тѣхъ поръ не можетъ чрезмѣрно скапляться влага въ клѣткахъ и быть необыкновенный недосшагою оной; а когда испаряющіе сосуды изливаютъ гораздо болѣе влаги шаковой въ клѣтки, неожели вбираютъ всасывающіе сосуды, тогда неизбѣжно рождаются скопленія (*stases s. congestiones*) оной и другія пасочные опухоли.

То же бываетъ и въ прочихъ отдаленныхъ или уединенныхъ полостяхъ,

VIII

какъ-шо: въ полостяхъ черепа головнаго глазной, грудной, сердечни (pericardium), брюха, шульни или шуллпника, яичниковъ, матки и суспавовъ. По шаковому же закону животнаго организма рождаются животныя явленія здоровыя и болѣзни въ мокротныхъ сумочкахъ, о коихъ я намѣренъ здѣсь говорить.

Желая преподать познаніе о мокротныхъ сумочкахъ, я сыскалъ за полезнѣйшее предложить оное въ классическомъ порядкѣ кратко и ясно, въ приличномъ видѣ для сей цѣли, для вящшей пользы обучающихся Анатоміи, на отечественномъ языкѣ, по неимѣнію на ономъ шакового сочиненія по сіе время, кромѣ перевода весьма краткаго сочиненія (*).

(*) Іос. Яков. Пленка первыя чершы Анатоміи, переводъ съ Лашинскаго на Россійскій Гиа. Двигубскаго. Москва, 1796 года.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ НАУКИ

о мокротныхъ сужечкахъ.

ОТДѢЛЕНИЕ ПЕРВОЕ.

О мокротныхъ сужечкахъ сообщ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

О названии мокротныхъ сужечекъ.

Онъ сушь полые непроходные мѣшечки, изъ плевочныхъ оболочекъ состоящіе и служащіе мышцамъ пособіемъ при движениі ихъ.

Онъ получили различныя наименованія на Латинскомъ языке отъ Анатомиковъ, а именно: glandulae mucilaginosae Haversii, vaginae tendinosae, s. membranae mucosae, s. capsulae tendinum articulares Vinslovii, bursae mucosae Albini et Veitbrechti, glandulae mucosae Cowperi, capsulae synoviales Plenckii et vesiculae unguinofcae Zagorsky. Такъ названы онъ отчасти отъ слизи, которую заключающій въ себѣ, отчасти по виду своему, отчасти отъ употребленія, а отчасти отъ устроенія ихъ.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Положеніе с. м.

Положеніе ихъ не всѣхъ постоянно. Онъ преимущественно предъ прочими мышцами.

А


находящеся всегда при сухихъ жилахъ, такихъ изъ оныхъ, кои при движениі опирают-
ся о кость или другую часть тѣла, какъ бы
о блокъ, и притомъ суть нарочито длинны
или оправляющъ сильныя движения, каковы
суть: м. косая глаза, окружающая крючекъ
небнаго отростка основной кости, двуна-
чальная лопатко-лучевая, грудная большая,
широкая хребетная, многія ручныя, и м.
вертелей и спупени. — Онъ находящеся при
нихъ по одинакъ, или вмѣсто одной мно-
гія, а иногда вмѣсто многихъ малыхъ одна
великая, всегда почни при началѣ или при
концѣ м. между наружною или внутреннею
поверхностію сухой жилы и костью, так-
же и другими смежными частями, съ ко-
торыми онъ соединены болѣе или менѣе плот-
но и по большей части клѣпчашкою, если
шелько не срослися съ оными.

С. мокрошныхъ находящихся гораздо бо-
льше у младенцевъ отъ 7 до 10 лѣтъ возра-
ста, нежели у совершеннолѣтнихъ; так-
же у людей, имѣющихъ большія м. и ма-
ло жиру; ихъ удобнѣе отыскивать въ ша-
ковыхъ шрупахъ, а особливо у сихъ и про-
чихъ, кои скоропоспирно умерли, не спра-
давши предварительно предъ смертью какою-
либо изнуришельно болѣзню. Какъ число,
также и бытіе нѣкоторыхъ изъ нихъ непо-
стоянно, то въ семъ отношеніи однѣ изъ
нихъ называющіяся *постоянными* (*persistentes*),
а другія *временными* (*temporariae*).
~~~~~

### ГЛАВА ТРЕТИЯ.

*Видъ и раздѣление сумочекъ мокротныхъ.*

Очерпаніе сс. мм. вообще различно по возрасту, полу, сложенію и прудамъ тѣлеснымъ; оно неопределеное: ибо онъ сущъ или округлы, или яйцеобразны, или имѣющъ видъ трубочекъ, или вовсе неправильны; почему и раздѣляются онъ на сумочки мокротные пузырные (*burstae mucosae vesiculares*) и на трубочные или влагалищные (*burstae mucosae vaginales, s. vaginae mucosae*).



### ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

*О сумочкахъ мокротныхъ пузырныхъ.*

Онъ лежатъ по большей части при суставахъ плеча, локтя, бедра и колѣна, также при сухихъ жилахъ мм., кои, слабо или плотно прикрытыены будучи бокомъ къ одной части сухой жилы, или къ прочимъ частямъ посредствомъ сухожильныхъ нитей или пшесемочекъ, разнообразно расположенныхъ, при движениі и опираются объ кости, хрящи или связки и проч.

Онъ по большой части короче и гораздо шире влагалищныхъ сумочекъ, имѣющъ видъ пузырька округлого, овального или неправильного; оболочки ихъ понѣ оболочекъ трубочныхъ сумочекъ, а полость ихъ соотвѣтствуєтъ вѣнчному виду ихъ.

Онъ имъють полоски, наполненныя слизью, а иногда жиромъ; когда же онъ порожній, то ихъ можно надуть, налипъ или заморозить, а попомъ отдушишь, при чемъ оболочка ихъ кажется особеною или продолжениемъ клѣпчашой плевы, покрывающей смежную м. — Онъ снаружи неровны и волокнины, а внушри въ полостяхъ гладки, и влажны и лоснащіяся имъють разгородки, складки, нити и прицѣпочки. Жиръ, въ нихъ находящійся, образуетъ извѣсъ сальные опроски, подобные прибавочнымъ сальникамъ; вѣроятно, что сіи сушь слѣдствія испаряемаго жира, а особливо при движениіи или при прижатії ихъ.

Приготовивши м. с. для показанія при лекціяхъ, хранишь должно ихъ сырыми и влажными: ибо безъ сего внутрення спѣнки ихъ слипаются или присыхаютъ къ смежнымъ частямъ шакъ, чѣмъ с. дѣлающіяся вовсе неспособными для надуванія и надлежащаго показанія.

Хотя нѣкошорые Анаптомики и Физіологии, также какъ Сабапье, думали, чѣмъ шаковые жирные опроски, подобные сальничкамъ, сушь выпускники (*ductus excretorii*) мокроныхъ сумочекъ; но какъ они не имъють полосей, то и не лъзя принять ихъ за шаковые испражнительные каналы, тѣмъ болѣе, чѣмъ ихъ при влагалищныхъ сумочкахъ вовсе не находишся.

Нѣкошорые изъ числа сумочекъ иногда имъють выпускники (*emissaria s. ductus*), кои однимъ или многими отверстіями вѣроятно

сообщающа мокропу въ полости сумочныхъ связокъ. Сабаше говоришъ, чшо концы выпускниковъ сихъ сборчные или опущащие (*fimbriatus*) ; но опыты не доказываютъ сего. — Отверстия сіи бываюшъ по большей части у спариковъ и спраждущихъ болью суставовъ, золотухою, цынгопною и любо-спрасшими болѣзнями. —

Для показанія сумочки потребно впервыхъ перерѣзвши средину мышцы поперегъ, нижнюю часть ея отдѣлять отъ прочихъ симѣжныхъ частей постепенно, а попомъ сухую жилу до мокрошной сумочки.

Сумочки сіи отврашаютъ треніе сухихъ жиль при движениіи м. ; нѣкоторыя же изъ нихъ служатъ имъ вмѣсто подкладокъ или подшилокъ, какъ што: находящіяся с. с. м. при м. загражающей внутренней вершелевой, основно-язычковой и подвздошно-вершелевой внутренней. — Онѣ увлажжаютъ слизью своею сухія жилы и другія части, какъ што: блокъ косой глазной м., связку предколениниковой берцовой и проч. —

ГЛАВА ПЯТАЯ.

О мокротныхъ сумочекахъ трубочныхъ или влагалищныхъ,

(*Bursae mucosae vaginales, f. vaginae mucosae.*)

Онѣ лежать по большей части во влагалищныхъ связкахъ и заключающа въ себѣ сухія жилы м., разгибающихъ и сгибаю-

щихъ перстны рука и пальцы ногъ; онъ рѣже бываюшъ въ другихъ мѣстахъ.

Онъ вообще длинище пузырныхъ сумочекъ и имѣюшъ видъ прубочекъ по большей части цилиндрическихъ, раздѣляющихся на двое или болѣе; почему онъ суть одинакія (*simplices*), или двойныя (*duplices*, f. *ramosae*, f. *loculomen-tosae*) и проч. — Первые изъ нихъ включаютъ въ себѣ одну, а другія двѣ и болѣе сухихъ жилъ, или имѣюшъ полосы.

Сумочки сіи вообще состояшъ изъ тонкой нѣжной оболочки, составляющей пузырные сумочки. — Оболочка сія нечувствительна, сосудиста, прозрачна, снаружи негладкая отъ соединенія съ влагалищными связками и другими смежными частями клѣпчашкою, а внутренняя поверхность ея гладкая, влажная и соединяется прицѣпочками (*fila tendinea*) съ сухими жилами; чрезъ сіи прицѣпочки проходяшъ сосуды.

Сс. мм. хотя не имѣюшъ въ составѣ своеемъ чувственныхъ жилъ, кромѣ весьма немногихъ, проходящихъ чрезъ нихъ; однако же, будучи растянуты, такжে какъ при воспаленіяхъ и вывиахъ, подвергаюшися весьма жестокимъ болѣмъ.

Сс. сіи внутри по числу сухихъ жилъ, въ нихъ находящихся, раздѣляются разгородками, такъ что когда одна сухая жила раздѣляется на двѣ или болѣе, то и общая сумочка ихъ по числу сему раздвоепится или дѣлается вѣшивистою, и напротивъ, когда сухія жилы мм. соединяются въ одну

жилу, то и сумочка изъ вѣтвистой дѣлается одинакою.

Онѣ внутри соединяются съ сухими жилами, а снаружи съ смежными частями слабо или плотно; а какъ многія изъ м. с., а особенно влагалищныхъ, лежашъ по большей части во влагалищныхъ связкахъ: то, для открытия оныхъ, потребно вскрыть прежде и съ надлежащею осторожностию влагалищную связку. Какъ онѣ имѣютъ явную полость, то можно ихъ наливъ, надуть, а иногда цѣлую сумочку опадѣлишь съ мокрою, въ ней находящеюся.

Польза или употребленіе сихъ сумочекъ сосредоточить въ томъ, что онѣ защищающы сухія жилы отъ вліянія костей, хрящей и другихъ смежныхъ частей при движениі; онѣ умощающы идерживающы ихъ въ надлежащемъ положеніи, чѣмъ онѣ, какъ блоки или опоры и подставки (*hypomochlum*), вспомогающы ихъ исправленію.

---

## ГЛАВА ШЕСТАЯ.

О влагѣ мокротныхъ сумочекъ.

(*Unguen s. mucus.*)

Влага сія по виду желтоватая, масляная, сходная съ яичнымъ бѣлкомъ и съ слизью сумочныхъ связокъ. Она гуще, красноватѣе и клейче въ сумочкахъ, находящихся при сочлененіяхъ, какъ то: при сухихъ жилахъ, при надпищечной предколѣнной и другихъ под-

верженныхъ сильному и частому прижатию  
при движении членовъ.

Слизь м. сумочекъ испаряется чрезъ скважины (porus) изъ сосудовъ въ полости ихъ и преимущественно кажется въ тѣхъ мѣстахъ ихъ, гдѣ находящаяся складки, привѣточки и жиръ: ибо въ сихъ мѣстахъ болѣе прочихъ находятся шаковыхъ сосудовъ.

Влага сія, подвержена будучи испытанию, измѣняется точно такоже, какъ влага сочленений, какъ то: отъ минеральныхъ кислотъ дѣлающейся мушиною, отъ раствора суплемы со спиртомъ сгущающейся, съ водою и съ масломъ смѣшивающейся, отъ жару спасеніи кипящей воды, отъ спирту, такоже отъ морозу съдается (coagulatur) какъ яичный бѣлокъ, а отъ фіалковаго сыропу зеленѣющъ, смѣшана будучи съ водою бѣлѣющъ, высушеннай горитъ, какъ клей или рогъ.

Влага сія свойствомъ своимъ сходна съ яичнымъ бѣлкомъ и со слизью супставовъ. Это доказываетъ безболѣзное излияніе влаги м. с. въ сумочныхъ связки и напропивъ.

Влага м. сумочекъ способствуетъ движению м. сухихъ жилъ, связокъ и супставовъ. — Какъ сумочки сіи, а особливо имѣющія жиръ, въ болѣзняхъ скоропечныхъ находящаяся порожними; то вѣроятно, что онѣ всегда доспавляютъ питаніе прочимъ часѣямъ тѣла. Будучи какая-либо большая изъ нихъ открыта въ живомъ человѣкѣ, изливается сполко влаги, что въ извѣсніе время изнуряетъ больнаго. Посему кажется вообще,

Что сс. мм. весьма полезны и необходимы для здоровья нашего и самой жизни. —

Въ заключеніи сказашь должно, что не только вообще тѣло человѣческое, какъ пре-восходнѣйшее твореніе прочихъ живопиныхъ, но и каждая часть онаго получили въ удѣль свой опличныя средства и пособія для вящшаго исполненія опправленія своего, что нѣтъ ни одной части, которая бы не имѣла какого-либо рода собственной принадлежности.

Въ числѣ частей тѣла нашего могутъ служить намъ явнымъ доказательствомъ мышцы. — Напура, для предохраненія ихъ отъ слѣдствій пренія, каковыя неизбѣжно бывають за оными послѣ взаимнаго дѣйствія двухъ сухихъ тѣлъ, снабдила ихъ не только жиромъ, паромъ, но сверхъ сего мокрошными сумочками для вящшаго и успѣшнѣйшаго ихъ опправленія. —

*О различіи мокротныхъ сс. отъ частей сходныхъ съ оными.*

Мм. сумочки по первому взгляду кажущія нѣсколько сходны съ мокротными желѣзами; но какъ сіи малы, имѣющія изпражнительные каналы, кои оканчиваются въ открытыя полости или на поверхность тѣла, то онъ совершенно отличаются симъ однѣ опять другихъ.

Сочленовныя связки такжѣ имѣющія нѣкоторое сходство съ мм. сумочками; но какъ онѣ опредѣлены напурую для соединенія двухъ явно-движимыхъ костей: то сею цѣлью явно отличающіяся опять оныхъ. —

---

---

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ НАУКИ

*о мокротныхъ сумочкахъ.*

### ОТДѢЛЕНИЕ ПЕРВОЕ.

**О мокротныхъ сумочкахъ въ особенности.**

#### ГЛАВА ПЕРВАЯ.

**О мокротныхъ сумочкахъ головы.**

Сумочка мокротная влагалищная блоковая или косой надглазной мышцы (*bursa trochlearis*).

Она есть продолговато-ovalная сумочка, облагающая сухую жилу сей м. сзади блока до разширения ея при концѣ у глазного шара.

**С. м. пузырная сосковая или задняя подбородко-сосковой мышцы (b. mastoidea).**

Она лежитъ у сосковой выемки между концами подбородко-сосковой м., грудино-сосковой, наметной и зашейно-сосковой; она состоитъ изъ твердой оболочки, имѣетъ овальный видъ и прикрепляется къ сухой жилѣ подбородко-сосковой м.

**С. м. пузырь дужковая или средней сухой жилы ли. подбородковой - сосковой (b. hyoidea).**

Она яйцеобразная, лежитъ спереди конца шилодужковой м., прикрѣплена плотно клѣпчашкою къ внутренней сторонѣ жилы м. подбородко-сосковой къ прицѣпочкѣ, которая соединяется м. съ дужкою. — Она состоится изъ тоцкой плевы и имѣетъ видъ овальный. —

*С. м. пузир. челюстная междуотростковая* (b. *masseterica*).

Одна или двѣ округлые (*circulares*) м. с. лежатъ въ полуулунной междушоршниковой выемкѣ, между челюстною и м. кусательною и жевательною наружно.

*С. м. пузирная небнаго крючка или основно-язычковой м.* (m. *circumflexi palati s. b. hamularis*).

Лежитъ между сухою жилою сей м. и крючкомъ, гдѣ она зацѣпляется за онай; она имѣетъ овальный видъ и, будучи прикрѣплена плотно, служитъ сей жилѣ вмѣсто мягкой подкладки: ибо она находится всегда почти наполнена жиромъ.

*С. м. пузирная предщитная или грудино-дужковой м.* (b. *thyreoidea*).

Она лежитъ предъ верхнею выемкою щипнаго храща, между переднею дужко-щипною связкою и концами щипно и грудино-дужковой м. имѣетъ треугольный видъ, и соединена будучи клѣпчашкою съ оними, служитъ имъ вмѣсто мягкой подспилки.

## ОТДЕЛЕНИЕ ВТОРОЕ.

О локротныхъ сумочкахъ рукъ.

### ГЛАВА ПЕРВАЯ.

О локротныхъ сумочкахъ плеча.

*C. m. пузырная реберно - надгрудниковая* (subclavia s. costo - clavicularis).

Она иногда находящаяся между надгрудникомъ, ребромъ и наружнымъ краемъ ребро-надгрудниковой связки, имѣетъ видъ небольшой и овальной, будучи наполнена жиромъ, неправильный. —

*C. m. пузырная надносовая между связочная* (supracoracoidea interligamentosa).

Лежитъ подъ заднимъ концемъ надгрудника надъ носковымъ отросткомъ и между связками носко-надгрудниковыми заднею и переднею.

*C. m. пузырная остиаго отростка лопатки или надсуставная* (b. supraarticularis s. subacromialis).

Она лежитъ между м. треугольною плечю, связками, сумочною плеча и между отростковою, по большей части довольно велика, почти округлая, прикрѣплена плотно къ верхней части сумочной связки плеча, и имѣетъ иногда отверстіе въ сочленовную связку.

*C. m. пузырная подшейная лопатки или подлопатко - бугорковой мышцы.* — (b. сога-коидеа, s. subscapularis).

Лежитъ между корнемъ носковаго опропника, между шейкою лопашки и сухою жилою подлопашочной м.; иногда ихъ находишься двѣ.

С. м. пузырная грудно-плечевой м. (b. m. pectoralis majoris).

Она лежитъ между сухою жилою сей м. осицю, идущею отъ большаго бугорка плечевой кости, и соединитъ изъ тонкой плевы; иногда она заключаетъ въ себѣ щарики жира.

С. м. пузырн. реберно - сосковой м. (b. pectoralis minoris).

Она лежитъ между сухою жилою сей м., концомъ носка, сумочною связкою плеча и м. сумочкою надсусшавною.

С. м. пузырная носко-плечевой м. (b. m. coraco-brachialis).

Она лежитъ между сухими жилами сей м. и подлопашко-бугорковой.

С. м. влагалищная между бугорковая или бороздковая (b. bicipitalis).

Она лежитъ во влагалищѣ сухой жилы сей м. въ между бугорковой браздѣ, и покрываешь всю почши сухую жилу лопашко-плечевой м. до мышечной части ея.

С. м. пузырная хребтной широкой, м. (b. latissimi dorsi).

Она лежитъ между сухою жилою сей м. и плечевою костью, соединитъ изъ тонкой кльпчапки, плотно прикрепленной къ сухой жилѣ сей м. и кругловатой лопашко-плечевой.

*C. m. пузырная наружная и внутренняя лопатко-плечевой кругловатой м. (b. tectitis majoris externa et interna).*

1 я Изъ нихъ лежитъ между концомъ сухой жилы сей м., плечевою косицю и сухою жилою хребешной широкой м., а 2 я гдѣ сухожильный волокна сей м. раздѣлены на 2 доли.

---

## ГЛАВА ВТОРАЯ.

*О мокротныхъ сумочкахъ предплечнаго съчлененія.*

*C. m. пузырная локотковая или трианачальной плечевой м. (b. acsonea).*

Она лежитъ посрединѣ локотка подъ сухою жилою сей м.

*C. m. пузыр. лучевая бугорковая или лучеваго конца лопатко-лучевой м. (b. radio-bicipitalis).*

Она находится между гладкою половиною двойчатаго бугорка луча, и сухою жилою сей м. подлѣ мм. плече-локтевой и наружничковой коропшкой.

*C. m., пузыр. головки луча (b. capitulo-radialis).*

Она находится болѣе съ наружнаго боку шейки между головкою луча и общимъ начальномъ мм. коропшкой лучевой, разгибающей перспы и мыщелковой пястной.

---

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

О мокротныхъ сушечкахъ кисти руки.

Всѣ слѣдующія мокротныя сумочки полу-  
чаютъ свое наименованіе по Лашински опѣмм.,  
коимъ принадлежатъ на пр. в. *vaginales externae*  
*m. flexoris longi pollicis* и проч., выключая  
нѣкоторыя, ниже особенно названныя.

С. м. влагалищная вѣшняя м. сгибаю-  
щей большой перстъ длинной.

Она объемлетъ почти до конца всю су-  
хую жилу сей м. и лежитъ между коспями,  
угловатикомъ меньшимъ и сумочною связкою  
предплечною паспиною.

С. м. влагалищ. средняя большаго пер-  
ста и всѣхъ сгибающихъ ми.

Она объемлетъ сухія жилы озна-  
ченныхъ ми., лежитъ подъ связкою общею  
предплечною, переднею частью нижняго кон-  
ца луча и между сумочною связкою пред-  
плечною паспиною. — Она весьма об-  
ширна.

С. м. нижняя трубочная сухихъ жилъ  
м. подкожной, сгибающей 4ре перста.

Она объемлетъ всѣ вмѣстѣ сей м. 4ре  
начала сухихъ жилъ, и попомъ каждую изъ  
нихъ даже въ связочныхъ влагалищахъ по-  
рознь до концовъ предпаспинныхъ коспей.

С. м. влагалищ. сгибающихъ сухихъ жилъ  
глубокой м. внутренней.

Она объемлетъ сухія жилы глубокой м.,  
сгибающей перспы, лежитъ между нижнимъ

концомъ луча и сумочною связкою предпль-  
чія съ пястью а пошомъ, преслѣдую каждую  
жилу порознь, покрываешь ихъ во влагалищ-  
ныхъ связкахъ до конца.

*С. м. влагалищ. лучевой внутренней м.*

Она прикреплена къ сухой жилѣ сей м. и  
объемлетъ ее шакъ, что между єю, боль-  
шимъ угловатикомъ и поперечной ладонною  
связкою находящаяся межупокъ.

*С. м. пузыри. локтевой внутренней м.*

Она весьма мала и лежитъ между сухою  
жилою сей м. и косичкою кругловатикомъ.

*С. м. влагалищи. м. отводящей большой  
перстъ.*

Она объемлетъ сухую жилу сей м. и ле-  
житъ предъ концомъ лучевой кости.

*С. м. влагалищи. лучевая общая верхняя.*

Она, будучи длинна и велика, вмѣщаешьъ  
сухія жилы двуконечной мышцы лучевой опь  
мышечной часпи ихъ до мокроти. с. ихъ ниж-  
ней и продолжается съ ними подъ м. длинною,  
отводящею большой перстъ.

*С. м. влагалищная лучевая общая нижняя.*

Она также велика, какъ предыдущая, и  
вмѣщаешьъ обѣ сухія жилы м. лучевой двуко-  
нечной предъ пястью подъ м. с. ихъ верхнею.

*С. м. влагалищная лучевая длинной м.*

Она облекаетъ одну сухую жилу сей м.  
въ браздѣ снаружи предъ нижнимъ концемъ  
луча подъ мокротиною с. нижнею общею. —  
Сверхъ сей находящаяся пузирная между сего  
жилою и предпястною 2ю костью.

*С. м. пузырная лу́чевой короткой м.*

Она не велика и лежитъ между концемъ сухой жилы и 2ю костью предпястія и не всегда находится. Сверхъ сего конецъ сухой жилы сей м. покрытъ влагалищн. с.

*С. м. трубочная верхняя разгибающей длинной м. большой перстъ.*

Она продолговата, объемлетъ сухую жилу сей м. до сушава предплечія.

*С. м. влагалищная нижняя м. большой разгибающей большой перстъ.*

Она объемлетъ сухую жилу сей м. при кости предпястій большаго перстя ниже сумочки верхней м. сей.

*С. м. влагалищ. м. разгибающей персты.*

Сія сумочка заключаетъ въ себѣ до сушава ручной кісши сухія жилы м. разгибающей персты, попомъ, раздѣлившия при концѣ луча на 3 шрубочки, изъ коихъ каждая заключаетъ въ себѣ по одной сухой жилѣ сей м., даже въ полостяхъ связочныхъ влагалищъ и идетъ къ 3мъ среднимъ перстямъ до конца ихъ. —

*С. м. влагалищ. собственная м. разгибающей мизинецъ.*

Она лежитъ между сухими жилами м. лакотной вѣшней и разгибающей персты, и объемлетъ сухую жилу сей м., съ кою идетъ подъ связкою пястною почки до конца перста.

*С. м. пузырн. лакотной внутренней м.*

Она лежитъ между сухою жилою сей м. и между пястною костью, круглкомъ на-

Б



званною; сверхъ сего конецъ сухой жилы сей, покрытъ влагалищн. с. до конца ея.

*С. ми. пузырные червообразныхъ м. или междуперстные.*

Ихъ числомъ 3. Онѣ 1ыя лежатъ между мизинцомъ, а прочія между слѣдующими перстами между корнями ихъ, при соединеніи сухожильныхъ концовъ сихъ мышецъ съ сухими жилами м. общей разгибающей перспы.

## ОТДѢЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ.

*О мокротныхъ сумочкахъ ногъ.*

### ГЛАВА ПЕРВАЯ.

*О сумочкахъ мокротныхъ бедра.*

*С. м. пузырная предтазовая, (b. puberalis.)*

Сія с., весьма проспранная, лежитъ между ми. подвздошно-вертелевою внутреннею и пояснично - вертелевою, шакже между сумочною связкою бедра ниже подвздошной нижней выемки, предъ шазомъ, гдѣ прикрѣпляется къ сухимъ жиламъ сихъ ми.

*С. м. пузырн. корня меньшаго вертеля (b. trochanteris minoris).*

Она лежитъ между корнемъ его и м. предтазовою вертелевою.

*С. м. пузырн. корня большаго вертеля (b. radicis trochanteris majoris).*

Она очень велика, лежитъ между корнемъ большаго вертеля и сухими жилами ми. под-

вздошно-крестцовой бедро-влагалищной и и бедрово-предколънной. — Въ ней находящаяся по большей части сухожильная ниши, плевы, жиръ и складки. Она имѣетъ иногда многоя пещерки (*antra*) или мѣстечки (*locula-menta*).

С. м. пузыри у верхушки большаго вертела. ( b. apicis troch. majoris ).

Она лежитъ между сухими жилами м.м. подвздошно-вертелевой большой, крестцово-вертелевой и верхушкою вертеля.

С. м. пузыри, м. подвздошно-вертелевой меньшой.

Она лежитъ между сухою жилою сей м. и верхушкою большаго вертеля.

С. м. пузыри. м. заграждающей вертелевой внутренней задняя.

Она лежитъ въ выемкѣ, находящейся между сѣдалищнымъ бугоркомъ и остью подъ сухою жилою сей м. при соединеніи ея съ двойничными м.м.

С. м. пузыри. м. заграждающей вертелевой внутренней передняя.

Она лежитъ между сухими жилами м.м. сей, двойничной, сѣдалищно-вертелевой и сумочкою связкою вертлюжною. Она длинна и доходитъ почти до конца означенныхъ м.м.

С. м. пузыри м. двойничной сѣдалищно-вертелевой верхней.

Лежитъ подъ сухою жилою сей м.

С. м. пузыри. м. полусухожильной сѣдалищной предберцовой м.

Она лежитъ подъ началами сей и двуначальной при соединеніи ихъ.

*C. m. пузырн. полуулевочной л.*

Она лежитъ между началомъ сей м. чешвероугольной сѣдалищной между-вершевою, и длиннымъ началомъ м. двуначальной. —

*C. m. пузырн. м. внутренней подвздошно-вершевою.*

Она лежитъ между сухою жилою сей м. и меньшимъ вершевелемъ.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

*О мокротныхъ сужочкахъ колѣна.*

*C. m. пузырн. и предколѣнная. (b. patellaris).*

Она лежитъ между сухожильными волокнами влагалища бедра, сухою жилою надколѣнною и между костною плевою и спереди предколѣнника. —

*C. m. пузырн. подколѣнниковая (b. infrapatellaris).*

Она лежитъ подъ верхушкою предколѣнника надъ предберцовыимъ бугоркомъ подъ связкою предколѣнниковою берцовою. — Она заключаетъ въ себѣ комокъ или выпуклость покрытаго жира.

*C. m. пузырн. передняя у внутренняго мышечка берца.*

Она лежитъ между внутреннею связкою бедро-берцовою боковою и концами сухихъ жилъ м. сгибающихъ берцо.

*С. м. пузыр. задняя врутренняго мыщелка берца.*


Она лежитъ между сумочною связкою и сухими жилами м. полуплевочной и внутренниго начала пузашика.

*С. м. пузыри. задняя сустава головки трубки.*

Она лежитъ между головкою трубки, сухою жилою м. заколѣнной, наружнымъ началомъ м. пузашика и сумочною связкою трубки.

*С. м. пузыри. м. двуначальной сѣдалищно-трубочной (b. bicipitalis genu).*

Она лежитъ между окончаниемъ м. сумочною связкою головки трубки и бедро-трубочную боковою связкою.



### ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

*О покротныхъ сумочекахъ ступени.*

*С. м. пузыри. надпяточная. (b. Achillea s. supra - calcanea),*

Она лежитъ сзади плюсна между пяткою, концомъ сухой жилы надпяточной, и весьма часто включаетъ въ себѣ шарики жиру.

*С. м. влагалищная м. предберцовой клинной надплюсневая.*

Она вмѣщааетъ въ себѣ сухую жилу сей м., лежитъ предъ внутреннею лодыжкою голени и сумочною связкою надпяточно - голенюю и надъ плюсномъ.

*С. м. влагалищ. м. разгибающей большой палецъ длинной.*

Она лежитъ предъ сумочною связкою пяточно-голеною, гдѣ сухая жила сей м. идетъ въ браздѣ; она включаетъ жилу сей м. —

*С. м. влагалищная м. разгибающей предберцовой длинной надпальцевой.*

Она лежитъ подъ херообразною предплюсневою связкою у берца и плюсна; она объемлетъ сперва вмѣстѣ, а постѣ порознѣ сухія жилы сей м.

*С. м. трубочная общая м. трубочныхъ длинной и короткой.*

Она лежитъ предъ наружною лодыжкою голени на плюснѣ, включаетъ въ себѣ сухія жилы сихъ м. сперва вмѣстѣ, а постѣ порознѣ, будучи раздѣлена разгородкою. — Одна изъ сихъ м. с. подъ плюсномъ объемлетъ сухую жилу длинной сей м.; а другая, ниже общей сумочки, вмѣщаетъ въ себѣ сухую жилу короткой м. трубочной до конца.

*С. м. трубочная, м. длинной сгибающей большой палецъ пятчная.*

Она находится у наружной лодыжки въ браздѣ пятки и надпяточной кости, а постѣ подъ большимъ пальцомъ, гдѣ вмѣщаетъ въ себѣ сухую жилу сей м.

*С. м. трубоч. м. длинной сгибающей пальцы.*

Она покрываетъ сухую жилу сей м. до конца трубки съ боку пяточной кости и сзади вѣшней лодыжки.

*С. м. влагалищная м. берцовой задней.*

Она одѣваетъ сухую жилу до конца трубки и събоку надпяточной кости сзади виупренной лодыжки и подъ пяткою.

*С. м. влагалищ. общая ми. сгибающихся пальцы.*

Она лежитъ подъ ступенью, и есть общая ми. сгибающей большой палецъ и глубокой, сгибающей прочие пальцы; она одѣваетъ ихъ всѣ вмѣстѣ, а потомъ порознь даже во влагалищныхъ связкахъ.

*С. м. влагалищн. м. длинной, сгибающей большой палецъ.*

Она лежитъ подъ косточками большаго пальца.


*С. м. трубочная м. поверхней, сгибающей пальцы.*

Ихъ 4, по одной для каждой сухой жилы. — Онѣ начинаются отъ косточки коренной, а оканчиваются въ верхушечной пальца вмѣстѣ съ сухими жилами, и лежатъ во влагалищныхъ связкахъ.

*Сс. ми. между пальцевыя или влагалищные ми. червообразныхъ.*

Сколько ми. сихъ, столько же находящіяся влагалищныхъ мокротныхъ сс. по одной для каждой изъ нихъ; сверхъ сихъ находящіяся ми. сс. пузырныя, округлые небольшія между корнями пальцевъ.

КОНЕЦЪ.



## К Н И Г И,

сочиненныя и изданныя для пользы соотчи-  
чей Г. Профессоромъ Мухинымъ.

1 я. О возбужденіяхъ, дѣйствующихъ на тѣ-  
ло человѣческое живое, Лапинское изданіе. Геп-  
тингенъ 1804 года.

2 я. Разговоръ о пользѣ прививанія коровьей  
оспы, съ приложеніемъ 16 черпежей къ каждому  
экземпляру, изданіе Россійское. Москва, 1804 года.

3 я. Рассужденіе о средствахъ и способахъ  
оживопворяющъ утопшихъ, удавленныхъ, задох-  
шихся и проч., изданіе Россійское. Москва 1805  
года.

4 я. Первая начала костоправной науки въ  
двухъ книгахъ, въ пяти Частяхъ, съ приложе-  
ніемъ 37 черпежей къ каждому экземпляру, изд.  
Россійское. Москва, 1806 года.

5 я. Сокращеніе, извлеченное изъ наблюдений,  
учиненныхъ надъ прививаніемъ коровьей оспы, коего  
издано въ Московскихъ Вѣдомостяхъ болѣе 8000  
экземпляровъ, съ приложеніемъ къ каждому изъ  
нихъ 16 черпежей, 1807 года въ Февралѣ мѣсяцѣ.

6 я. Сочиненіе сіе съ вѣкоторыми прибавле-  
ніями издано въ видѣ книжки, съ приложеніемъ  
къ каждому экземпляру одного рисунка. Москва,  
1807 года въ Апрѣлѣ.

7 я. Прибавленіе къ разговору о пользѣ при-  
живанія коровьей оспы, съ приложеніемъ 16 чер-  
пежей къ каждому экземпляру, изданіе Россійское.  
Москва, 1807 года.

## II

8 я. Описаніе Хирургическихъ операций въ двухъ Частяхъ, съ приложеніемъ 12 чернѣжей къ каждому экземпляру. Москва, 1807 года.

9 я. Рассужденіе о желтой Американской горячкѣ, переводъ съ Лапинскаго на Россійской Москва, 1806 г.

10 я. Описаніе цѣлищельныхъ самородныхъ водъ, переведенное Спуденшомъ Васильемъ Наумовыимъ, подъ его руководствомъ, съ Нѣмецкаго на Россійскій. Москва, 1807 года.

11 я. Краткое наставление простому народу о пользѣ прививанія предохранительной оспы, съ чершежами. Москва, 1811 года.

12 я. Врачебное наблюденіе о дѣйствіи мухоморовъ на людей и надежнѣйшемъ способѣ лѣчить опѣ онаго. Того же году издано.

13 я. Анатомико-Патологическое наблюденіе о мышечной водянной болѣзни яичниковъ. Того же года.

14 я. Связословіе и мышцесловіе въ 1812 году, были признаны за классическія Академіею, коихъ всѣ экземпляры згорѣли со всѣми оригиналами прочихъ частей Анатоміи во время непрія-  
щела.

15 я. Сочинилъ полный курсъ Анатоміи, который, признанъ будучи за классический, изданъ на казенное издивеніе Медико-Хирургической Академіи и употребляется нынѣ, для руководства учащихся въ оной и въ М. И. Университетѣ, 1815 года.

16 я. Сочинилъ первый на отечественномъ языкѣ науку о мокротныхъ сумочкахъ, которая признана за классическую и напечатана на издивеніи Императорскаго Московскаго Универ-  
ситета, для руководства учащихся при лекціяхъ. 1815 года.

