

Blennius macropteryx Rüpp. въ Черномъ морѣ.

Н. Максимовъ.

Лѣтомъ 1908 года я нашелъ на южномъ берегу Крыма, у Мшатки, 8 экз. *B. macropteryx*, вида вообще мало извѣстнаго. Впервые эта маленькая морская собачка была открыта *Rupprel'emъ* подъ Мессиною, но описана была имъ очень коротко. Къ этому же виду *Кесслеръ* причисляетъ собачку, найденную въ восьмидесятихъ годахъ *Чернявскимъ* въ Ялтинской бухтѣ. Сравнительно большое количество экземпляровъ, найденныхъ мною, съ находимыми прежде заставляетъ меня сдѣлать болѣе подробное описаніе этого вида и вмѣстѣ съ тѣмъ лишній разъ отмѣтить его нахожденіе въ Черномъ морѣ.

Отличительные признаки. Длина головы на одну четверть больше высоты тѣла и укладывается во всей его длинѣ $4\frac{1}{2}$ — $4\frac{3}{4}$ раза. Грудные плавники очень длинные, достигаютъ до середины заднепроходнаго.

D. 13/18; A. 2/18—19; P. 11—12; V. 3; C. 14. Тѣло слегка продолговато, высота и толщина его постепенно уменьшаются по направленію къ хвостовому плавнику. Морда маленькая, тупая, съ косымъ переднимъ профилемъ; вертикальный діаметръ глаза чуть больше слегка выпуклаго межглазничнаго пространства и содержится къ длинѣ головы 3— $3\frac{3}{4}$ раза. Зубы простые, коническіе на обѣихъ челюстяхъ, загнутыхъ зубовъ нѣтъ. Ротовая щель узкая, верхняя губа прикрываетъ нижнюю. На затылкѣ два короткихъ щупальца, одно бѣльшее, сейчасъ же позади глазъ, нитевидное, другое на равномъ разстояніи между первымъ и началомъ спиннаго плавника; второе щупальце меньшихъ значительно размѣровъ, чѣмъ первое, но сохраняетъ одинаковую съ нимъ форму.

Спинной плавникъ начинается позади вертикали предкрышечной кости и имѣетъ разрѣзку между колючеперой и мягкой

частями, съ хвостатымъ плавникомъ не соединенъ. Колючіе лучи заднепроходнаго плавника очень малы, у разсмотрѣнныхъ мною 8 экземпляровъ, я видѣлъ только по одному колючему лучу, другой же (первый) составляетъ придаточную часть наружнаго мочеполового аппарата, замѣтный при небольшомъ увеличеніи въ видѣ коническаго сосочка. Это заставляетъ меня принимать всѣ разсмотрѣнные мною экземпляры за самокъ, несмотря на то, что наружный мочеполовый аппаратъ ихъ при сопоставленіи съ половозрѣлыми особями другихъ видовъ являлся не вполне развитымъ. Особенно характернымъ признакомъ для этого вида являются грудные плавники, 7-й и 8 лучи которыхъ сильно вытянуты въ нитевидные отростки. Въ хвостовомъ плавникѣ хорошо замѣтны 14 лучей, крайніе же очень мало и плохо различаемы.

Основная окраска вида желто-бурая съ восемью или десятью полосками каштановаго цвѣта съ варіаціей темнаго и свѣтлаго тоновъ, расположенными поперекъ тѣла. Три углообразныхъ полоски на горлѣ, одна темная на нижней губѣ, двѣ такихъ же вдоль рыла и одна на затылкѣ. На спинномъ плавникѣ также цѣлый рядъ полосокъ, поперечныхъ и каштановаго цвѣта. Особенно ярко окрашены грудные плавники: перепонка, связывающая лучи, густо усѣяна желтыми точками, которыя при бѣгломъ взглядѣ кажутся слитыми между собою. Края грудныхъ плавниковъ окаймлены красивой розовой полоской; заднепроходный плавникъ почти безцвѣтный, брюшные же сохраняютъ остальной цвѣтъ тѣла.

Величина бывшихъ у меня на разсмотрѣніи экземпляровъ была отъ 26—29 миллиметровъ. Всѣ были найдены мною у самаго берега, среди мелкихъ камней.