

ЛЪТОПІСЬ ХАРЬКОВСКАГО УНИВЕРСИТЕТА.

Професоръ Аполлинарій Григорьевичъ Подрезъ.

Проф. М. А. Попова.

(Продолженіе *).

35. Механическое расширение выхода желудка и выскабливание язвы желудка. Врачъ. 1895, № 8.

36. Abschaben eines Magengeschwûrs und Erweiterung des Pylorus nach Loreta. Рефератъ предыдущей статьи въ Centralblatt f. Chirurgie. 1895, № 15.

37. О забытыхъ показаніяхъ къ вытяженію нервовъ. Медицина. 1894, №№ 3 и 4.

38. Хирургическая болезни мочевыхъ и половыхъ органовъ. Часть I. Харьковъ, 1896 г. Второе, дополненное изданіе.

39. Хирургическая болезни мочевыхъ и половыхъ органовъ. Часть II. Харьковъ, 1896 г. Рецензія: Медиц. Обозр. 1896 г., стр. 355, т. II и Centralblatt f. Chirurgie. 1896, № 52.

40. О хирургии сердца. Клиническая лекція. Врачъ. 1896, № 26.

41. Новый простой способъ наложения соустія въ желудочно-кишечныхъ каналахъ. Лѣтопись русской хирургіи. 1898, кн. 4.

42. Gastroenterostomia et Enterostomosis, ein neues vereinfachtes Verfahren. Arch. f. Klinische Chirurgie. Bd. 57. Heft. 2, 1898.

43. О соединеніи мочеточника съ мочевымъ пузыремъ. Клинический лѣкціи. Лѣтопись русской хирургіи. 1898, кн. 4.

44. Uretero-cyclo-neostomia. Centralblatt f. Chirurgie. 1898, № 23.

45. Радикальное прыжесченіе Кохера при подвижныхъ и ущемленныхъ прыжахъ. Зб. слушаевъ. Медиц. Обозр. 1898.

46. Отчетъ о дѣятельности госпитальной хирургической клиники въ 1885, 1886 и 1887 годахъ. Записки Харьк. унів. 1885, 1886 и 1887 гг.

Кромѣ того подъ руководствомъ проф. Подреза изъ завѣдуемыхъ учрежденій ординаторами и посторонними врачами, занимавшимися у него напечатаны слѣдующія сочиненія:

1. N. Schiele. Zwei Fälle von Ovariotomi'e St. Petersburger Medic. Woch. № 1. 1887.

2. I. Грановскій. Къ вопросу о лѣченіи травматического столбняка прыскиваниями антитоксина. Медицина № 12. 1895.

3. A. Гуревичъ. Разлитая гипертрофія кишечка вслѣдствіе хронического воспаленія брюшины. Врачъ. № 31. 1895.

4. И. Кудинцевъ. Къ казуистикѣ и техникѣ вскрытия легочныхъ прыжовъ. Врачъ. № 28. 1895.

5. И. Кудинцевъ. Случай нефректоміи по случаю множественного пиелонефроза. Медицинское Обозрѣніе. 1897. Январь.

* См. книгу 1-ю за 1903 годъ.

„Записки Императ. Харьк. универс.“

6. Голяховскій. Коренная операция почечу́йныхъ узловъ съ обши-
ваниемъ ихъ по способу проф. Подреза. Врачъ. 1895. № 27.
7. Б. Дробный. Къ казуистикѣ самопрививки рака. Хирург. Лѣ-
топись. 1895. № 3.
8. И. Кудинцевъ. Случай огнестрѣльного раненія черепа. Хирург.
Лѣтопись. 1895. № 3.
9. Б. Дробный. Теченіе триппера въ зависимости отъ локализаціи
гонококковъ. Медицинское Обозрѣніе 1898. Іюнь.
10. С. Голяховскій. Сравнительная оцѣнка различныхъ способовъ
лѣченія переломовъ. Лѣтопись Русской Хирургіи. 1898. Кн. 2.

Перечисленныя выше научныя работы проф. А. Г. Подреза переданы были (за исключениемъ недоставленныхъ на конкурсѣ) для рецензіи гг. членамъ комиссіи для разбора сочиненій кандидатовъ на каѳедру хирургической факультетской клиники и кромѣ того и другимъ профессорамъ Медицинского факультета, причемъ послѣдними, равно какъ и членами комиссіи доставлены ниже слѣдующія рецензіи, которыя мною переданы будутъ въ хронологическомъ порядкѣ выхода въ свѣтъ сочиненій Подреза.

Не рецензировались сочиненія, помѣченныя подъ №№ 1, 4, 5, 7,
8, 17, 18, 20, 24, 25 и 28.

Рецензіи и рефераты.

Рефератъ проф. А. Х. Кузнецова сочиненія помѣченного подъ № 2.

„Случай gangraena spontaneas“, (изъ хирургической клиники Грубе). Приложение къ протоколу Харьк. Медицинского Общества 1876 г.

Описаніе случая гангреды лѣвой нижней конечности у 45-лѣтняго мужчины, которому проф. Грубе сдѣлалъ послѣдовательно три ампутаціи: сначала V-го пальца лѣвой стопы, потомъ всей стопы и затѣмъ голени по способу Пти. Авторъ произвелъ микроскопическія изслѣдованія удаленныхъ частей, на основаніи которыхъ пришелъ къ заключенію, что здѣсь была поражена intima сосудовъ, на которой образовались тромбы и потомъ развились дальнѣйшія измѣненія этихъ частей. Сравнивая описаныя въ литературѣ страданія сосудовъ при сифилисе съ найденными у своего больного, авторъ находитъ, что этотъ случай долженъ быть названъ gangraena syphilitica.

Рецензія проф. А. И. Дудукалова сочиненія № 3:

Статья „Военно-хирургическая замѣтка изъ Сербско-Турецкой войны 1877 года“ напечатана на 82 страницахъ въ томъ же году. Это одна изъ первыхъ работъ молодого хирурга, поэтому и относиться къ ней нужно съ точки зрѣнія господствовавшихъ въ науку въ то время

взглядовъ. Тогда только начало зарождаться учение о безгнилостномъ методѣ лѣченія ранъ и учение Листера почти не выходило изъ предѣловъ Англіи. Работа эта представляетъ тотъ интересъ, что знакомить нась съ характеромъ и направленіемъ дѣятельности автора, предоставленного самому себѣ и поставленного въ крайне неблагопріятныя условія хирургической дѣятельности въ странѣ, неподготовленной съ санитарно-медицинской стороны. Эта статья можетъ служить аттестатомъ личныхъ способностей кандидата для самостоятельной хирургической дѣятельности. Работа состоитъ изъ двухъ частей съ таблицею, обозначающею число, характеръ, теченіе и исходъ раненій, наблюдавшихся авторомъ, способы лѣченія ихъ, осложненія, исходы и выводы. Часть первая въ 26 страницахъ содержитъ описание мѣстныхъ условій, въ какихъ проходила дѣятельность 1-го Харьковскаго санитарнаго отряда, гдѣ авторъ состоялъ хирургомъ, а также другихъ врачей и отрядовъ, привывшихъ въ Сербію для оказанія помощи раненымъ. Здѣсь читатель знакомится съ тѣми плохими условіями въ помѣщеніи, содержаніи больныхъ и уходѣ за ними, которая вмѣстѣ съ отсутствиемъ администраціи могли совершенно парализовать дѣятельность санитарныхъ отрядовъ. Нужно было умѣніе приспособиться къ этимъ условіямъ, чтобы успѣть что нибудь сдѣлать для раненыхъ; и однако же вторая часть отчета убѣждаетъ насъ, что дѣятельность хирургического отдѣленія Харьковскаго санитарнаго отряда имѣла относительный успѣхъ. Вторая часть статьи есть хирургическій отчетъ; въ ней авторъ разбираетъ собственный матеріалъ, — 200 раненій въ разныхъ областяхъ тѣла, почти всѣ огнестрѣльныя, давшія въ общемъ, со всѣми осложненіями, $12\frac{1}{2}\%$ смертности, при чемъ 7 погибли отъ септицеміи, 4—отъ піеміи, 1—отъ дизентеріи и 4—отъ госпитальной гангрены, такъ что на долю трамвы и ея послѣдствій приходится всего $4\frac{1}{2}\%$ смерти. Процентъ небольшой, особенно принимая во вниманіе значительное число тяжкихъ раненій и плохія санитарныя условія и обстановку дѣятельности хирурга. Въ этой части разборъ хирургического матеріала расположены по группамъ—областямъ раненія. Послѣ общаго описанія каждой группы слѣдуютъ краткія исторіи наиболѣе интересныхъ случаевъ раненій. Исторіи эти часто страдаютъ неполнотою, отсутствиемъ микроскопическихъ изслѣдований и вскрытий, но такие дефекты оправдываются обстановкой и мѣстными обычаями (вскрытия были запрещены, какъ противные народному обычаю) и вполнѣ сознаются авторомъ. Статья написана хорошимъ языкомъ, легко читается, содержитъ описание многихъ серьезныхъ операций, произведенныхъ самимъ авторомъ и даетъ доказательства самостоятельного направлениія.

Рецензія проф. Я. А. Анфимова сочиненій, помѣченныхъ подъ нумерами 6 и 37: а) *О вытяжениіи нервовъ*, диссертациія на доктора медицины. Харьковъ. 1878 г. и б) *О забытыхъ показаніяхъ къ вытяженію нервныхъ стволовъ*. Медицина. 1894. №№ 3 и 4.

Вопросъ, которому посвящены обѣ работы, по моему мнѣнію, въ настоящее время почти утратилъ свое значеніе въ невропатології. Если еще можно поддерживать—названный оперативный приемъ, то область его должна быть ограничена только случаями вростанія нервныхъ стволовъ въ рубцы, костную мозоль и вообще въ случаяхъ заболѣванія тканей по сосѣдству съ нервнымъ стволовъ, заболѣваніями, механически сдавливающими нервъ или воспалительными продуктами, или рубцами. При этомъ невропатологи, на основаніи послѣднихъ экспериментальныхъ и клиническихъ изслѣдований, могли бы рекомендовать въ послѣднихъ случаяхъ не вытяженіе нервныхъ стволовъ, а самое нѣжное и деликатное освобожденіе ихъ изъ воспалительного очага, рубцовой ткани, или костной мозоли—и только! Всякое насилие надъ нервомъ, какъ показываютъ опыты Marinesco, Nissl'я и цѣлаго ряда другихъ авторовъ, влечетъ за собою восходящій и писходящій невритъ и такъ называемое вторичное пораженіе нейронъ, соотвѣтствующихъ участковъ спиннаго мозга (Дегенерація Nissl'я). Въ настоящее время вопросъ о вытяженіи нервныхъ стволовъ въ такой мѣрѣ считается сомнительнымъ, въ смыслѣ его оперативной цѣнности, что служить даже темою для статей, въ родѣ статьи Dr.—'a Schussler'a, озаглавленной: *Nervendehnund oder nicht?* (Bremen. 1899. 86 стр. in quarto). Являются даже подозрѣнія, что случаи улучшенія разныхъ болѣзнейшихъ формъ при вытяженіи нервовъ, сводятся къ явленіямъ самовнушенія. Во всякомъ разѣ теоретическая и клиническая соображенія побуждаютъ невропатологовъ настоятельно бороться съ увлеченіемъ хирурговъ вопросомъ о вытяженіи нервовъ.

Перехожу къ разсмотрѣнію названныхъ выше работъ проф. А. Г. Подреза.

Диссертациія является превосходнымъ трудомъ, въ которомъ для того времени, когда вопросъ о вытяженіи нервовъ былъ новымъ вопросомъ въ хирургії, добросовѣстно собрана вся литература, критически и экспериментально разобранъ рядъ положеній, устанавливающихъ показанія и противопоказанія къ операциі.

Перейдемъ къ послѣдней работѣ автора, которая послужила темою доклада на Пироговскомъ Съѣздѣ въ Москвѣ 2-го января 1894 года.

Докладъ направленъ къ возобновленію въ памяти хирурговъ, по-видимому, утратившаго уже къ этому времени свое значеніе вопроса

• вытяженіи нервныхъ стволовъ. Описанъ случай вытяженія ствola p. ischiadici. Показаніемъ служили боли и тяжелыя парестезіи, испытываемыя больнымъ въ теченіе долгаго времени, послѣ сдѣланной ему операциі — вылущенія средняго пальца правой ноги. Діагнозъ проф. Подреза — *Неврозъ культи*. 4-го ноября 1893 года сдѣлана операция вытяженія p. ischiadici между сѣдищнымъ бугромъ и большимъ вертеломъ. Нервъ былъ вытянутъ изъ его ложа и въ такой мѣрѣ расстянутъ, что подъ него можно было свободно пройти пальцемъ. Послѣдовало значительное улучшеніе, которое со дня на день возрастало и больной уѣхалъ почти здоровымъ. Дальнѣйшая судьба больного неизвестна.

Нужно сказать, что едва ли одно вытяженіе помогло больному. Раньше, за 3 недѣли до вытяженія, сдѣлана была операция вырѣзываія рубца на культѣ и „освобожденіе нерва изъ вростанія“. Мотивомъ этой послѣдней операциі послужило предположеніе авторомъ раньше предположенія о „вростаніи нерва въ руслѣ съ послѣдующимъ распространеннымъ невритомъ и пораженіемъ въ спинно-мозговыхъ центрахъ“. Оставляя въ сторонѣ нѣкоторыя неточности, касающіяся номенклатуры, напр., „нейрозъ“ вмѣсто „нейрить“, или напр., „параличъ трофическихъ центровъ“, я долженъ указать, что показанія для операциі были теоретически недостаточно обоснованы; авторъ рѣшился на нее скорѣе съ извѣстнымъ рискомъ на „ех jucantibus“. Вышло хорошо; но раньше самъ онъ приводитъ другой свой случай вытяженія нервовъ при *tabes*, который кончился печально: больной погибъ въ теченіе мѣсяца.

Операциі вытяженія нервовъ, которую авторъ защищаетъ, въ концѣ концовъ, въ извѣстныхъ случаяхъ, самимъ же имъ па 7 стр. подвергнута большому сомнѣнію. Приводя результатъ изслѣдований Witzel'я и Vanlair'a, которые въ случаяхъ „неврозовъ культи“ находили восходящій невритъ, распространяющійся по всему ходу нерва до спиннаго мозга включительно, авторъ долженъ быть бы въ своихъ выводахъ указать, что въ случаяхъ неврита вытяженіе не только бесполезно, но даже вредно. По моему мнѣнію ему вообще слѣдовало болѣе точно установить показанія къ операциі вытяженія нервныхъ стволовъ и не ограничиваться общимъ выводомъ, что „встрѣчаются обстоятельства, гдѣ онъ, т. е. способъ вытяженія нервовъ, незамѣнимъ и потому стоитъ въ конкуренціи“ (стр. 15).

Въ заключеніе мнѣ пріятно отмѣтить, что авторъ въ вопросѣ о вытяженіи нервовъ, разобраннымъ въ вышеизвѣстныхъ двухъ работахъ обнаруживаетъ: большую эрудицію, большой клиническій навыкъ и превосходное изложеніе своихъ мыслей.

Рецензії проф. И. Ф. Зеленева сочиненій помѣченныхъ подъ №№ 9, 10, 11, 12. А. Подрезъ. „О примѣненіи новыхъ оперативныхъ методовъ къ лѣченію каллезныхъ структуръ уретры“. Отт. изъ Русской Медицины. 1884. № 35. „Zur Frage der operationsmethoden callosen Stricturen der Harnröhre“. Aus St. Petersb. Med. Wochenschrift. 1884. № 28 (1—4 стр.).

Въ первомъ сообщеніи авторъ приводить 2 случая каллезныхъ структуръ уретры, гдѣ онъ примѣнилъ съ успѣхомъ вылущеніе изъ чрезъ промежность. Въ первомъ случаѣ операція сопровождалась умѣреннымъ паренхиматознымъ кровотеченіемъ, не дозволившимъ докончить операціи сразу, по предположенному плану (т. е. провести эластичекій катетеръ чрезъ всю уретру въ пузырь и на немъ замкнуть рану наложеніемъ швовъ). Чрезъ 6 дней операція была докончена наложеніемъ проволочныхъ швовъ на рану и проведеніемъ катетера чрезъ всю уретру. Во второмъ случаѣ, послѣ вылущенія каллуса вмѣстѣ съ подлежащею частью уретры, занимавшаго переднюю область *partis membranaceae urethrae*, операція была окончена сразу. Послѣдующее лѣченіе заключалось въ периодическомъ зондированіи уретры, чтобы противодѣйствовать стягиванію уретры рубцомъ. Авторъ рекомендуется этотъ оперативный приемъ для лѣченія каллезныхъ структуръ, а также и для другихъ упорныхъ структуръ, противъ которыхъ такую же операцію предложилъ Moller въ Lyon. Medical. 1885. № 13.

Въ нѣмецкомъ сообщеніи авторъ описываетъ одинъ первый случай изъ цитированныхъ въ предыдущемъ сообщеніи. (Оба случая цитированы въ руков. автора „Хирургическая болѣзни мочевыхъ и половыхъ органовъ, часть I, отдѣль—пластика резекція уретры“).

А. Подрезъ. О блennorrei мочеполового аппарата мужчинъ. Лекція. Отт. изъ „Русской Медицины“, №№ 4, 5 и 6 1895 г. Ueber Blennorrhœ der Harnapparates beim Manne. Separat—abdruck aus der Vierteljahrsschrift für Dermatologie und Syphilis. 1885. Mit I Tafel.

Въ этой лекціи авторъ описываетъ гонококковъ, ихъ значеніе для перелоя и свои изслѣдованія объ отношеніи гонококковъ къ клѣточнымъ элементамъ, главнымъ образомъ къ гнойнымъ тѣльцамъ. Онъ указываетъ на легкое теченіе блennорреи, если большая масса гонококковъ лежитъ внутри гноиныхъ элементовъ (приводить теорію фагоцитоза Мечникова) и на тяжелое теченіе съ различными осложненіями, разъ гонококки являются болѣе свободными. Разматривая блennоройный процессъ съ точки зрењія обязательного присутствія гонококковъ, авторъ старается разграничить собственно блennоррею т. е. періодъ специфической — культурный періодъ микробы—отъ періода слизистой блennорреи и по-

следовательного триппера. Съ той же точки зрѣнія авторъ разсматриваетъ и терапію страданія, рекомендуя растворы супемы для впрыскиванія въ гнойномъ періодѣ и болѣе мягкая дезинфицирующія (3—5% борнокислого натра, 1—1½% растворъ карболовой кислоты съ прибавленіемъ вяжущихъ и проч.) въ слизистомъ періодѣ болѣзни. Авторъ отводитъ видное мѣсто при лѣченіи затяжной бленкорреи эндоскопу. Эта лекція автора представляетъ собою для того времени (1885 г.) первые шаги въ развитіи ученія о гонококкахъ; взгляды, систематизированные авторомъ обоснованы отчасти и на личныхъ его наблюденіяхъ.

Нѣмецкая статья есть переводъ этой лекціи. (Тѣ же взгляды изложены и въ учебникѣ автора въ соотвѣтствующей главѣ).

Рецензіи prof. A. И. Дудукалова сочиненій помѣщенныхъ подъ № 13, 14, 15 и 16.

Пр.-доц. Подрезъ. Статья „Случай успѣшнаю вылущенія подбрюшинной части recti“ напечатана на 12 страницахъ въ 1886 году и относится къ тому времени, когда вопросъ о вырѣзываніи прямой кишки при ракахъ ея былъ въ періодѣ своего начального развитія: оперировались только случаи пораженія нижнихъ отдѣловъ; естественной границей операциіи считали брюшину, далѣе которой проникать не рѣшились, почему всѣ раки, лежащіе на уровнѣ Дугласовой складки ея или выше считались „неоперируемыми“ и для нихъ практиковалась palliatивная colostomia. Положеніе это, выраженное впервые Лисфранкомъ, твердо установилось въ наукѣ и лишь немногіе выдающіеся хирурги запада, какъ Фолькманнъ, Кенигъ, Бильротъ, Эсмархъ начали выставлять противъ такого ограниченія и представили нѣсколько случаевъ удачного вырѣзыванія высокихъ раковъ; но такъ какъ случаи эти были единичные и даже самый методъ операциіи не былъ разработанъ, то и самый вопросъ о высокихъ ракахъ прямой кишки оставался только возбужденнымъ. Въ это то время молодой приватъ доцентъ тоже занялся этимъ вопросомъ и въ своей статьѣ, съ одной стороны путемъ анатомическихъ вычисленій, сдѣланныхъ нѣкоторыми анатомами, а съ другой — статистикой Бріянта, старался опровергнуть положеніе Лисфранка объ опредѣленности границъ верхняго и нижняго отдѣла прямой кишки и пригодности colostomiae для замѣны экстирпации recti. Кроме того, въ доказательство справедливости отстаиваемаго положенія, авторъ представилъ описание своего, интереснаго въ клиническомъ и оперативно-механическомъ отношеніи, случая высокой экстирпации прямой кишки, окончившагося выздоровленіемъ.

Проф. A. Г. Подрезъ. Статья „О камнедробленіи при гнойныхъ инфицированіяхъ“, напечатано на 14 страницахъ въ 1885 году и относится

къ тому періоду развитія вопроса о камнедробленіи, когда старый методъ многосесансового раздробленія мочепузырныхъ камней уступилъ мѣсто односесансовой операциі Бигелова, достигшой теперь въ рукахъ нѣкоторыхъ хирурговъ широкаго распространенія въ практикѣ и которая даетъ блестящіе результаты. Во время, о которомъ идетъ рѣчь, операциі Бигелева, не смотря на доказанныя ея превосходства, находилась въ угнетенномъ состояніи, такъ какъ оставшіеся послѣ многосесансовой операциі различныя противопоказанія, имѣвшія значеніе при старомъ методѣ, стояли еще очень твердо и до того стѣсняли и ограничивали кругъ ея показаній, что почти не находилось случаевъ для примѣненія ея. Авторъ выступилъ противъ такого взгляда въ смыслѣ расширенія показаній и своей работой старается нарушить одно изъ самыхъ серьезныхъ противопоказаній — *инойна катарра мочеваго пузыря*. Приведя рядъ случаевъ изъ собственной практики, авторъ доказываетъ не только возможность производить камнедробленіе при этомъ осложненіи, но и выясняетъ, почему многосесансовая операциі должна была оканчиваться не благопріятно. Въ заключеніи авторъ ставитъ рядъ положеній относительно правильности оперированія при циститахъ между которыми находимъ два вѣскихъ положенія: *строгая антисептика и оперированіе въ одинъ сеансъ*. Несмотря на небольшой объемъ, статья эта представляетъ интересъ и научное значеніе, а также доказываетъ у автора значительный опытъ въ техникѣ производства этой операциі, хотя авторъ незнакомить читателя съ трудной техникой камнераздробленія.

Проф. А. Г. Подрезъ. Статья „*Colotomia iliacas съ полной перевѣзкой кишки и зашиваніемъ нижняго отрѣзка по модификаціи Modelung'a* напечатана на 7 страницахъ въ 1886 году.

Какъ известно, colotomia операциі старая, но та, о которой идетъ рѣчь въ разбираемой статьѣ, принадлежитъ новѣйшему времени и имѣть особое значеніе въ терапіи ракового пораженія прямой кишки. Становясь на точку зрѣнія автора, видящаго въ этой операциі не только средство для отведенія задержанныхъ фекальныхъ массъ, но и возможность воздѣйствовать на самый процессъ устраненіемъ постоянного раздраженія и уменьшенія притока крови къ пораженной области, нужно согласиться, что обыкновенная или пристѣночная colotomia недостаточна и только методъ рекомендуемый авторомъ статьи удовлетворяетъ обоимъ показаніямъ. Разобравъ показанія, авторъ переходитъ къ описанію техники операциі, которая принадлежитъ къ рѣдкимъ и въ Россіи еще не описаннымъ въ то время случаямъ. Несмотря на то, что статья эта принадлежитъ къ числу казуистическихъ, она тѣмъ не менѣе заслуживаетъ вниманія, обрисовывая автора съ точки зрѣнія хирургической техники.

A. Г. Подрезъ. Статья „Непосредственное хирургическое лечение Spondylitis cervicalis tuberculosa съ исходомъ въ выздоровление“ напечатана на 7 столбцахъ журнала „Русская Медицина“ въ 1886 году.

Въ то время конгестивные нарываы уже не представляли для хирургической терапіи опухолей „noli me tangere“, и, благодаря введенной Листеромъ антисептику, хирурги стали проникать не только въ эти опухоли, но и къ источникамъ ихъ происхожденія. Ученіе о хирургическомъ туберкулезѣ работами не только Коха, но и Гютера, Фолькманна и Кенига представлялось ученому миру почти въ законченномъ видѣ и техника производства такъ называемыхъ тотальныхъ резекцій превратилась въ тщательно парціальную съ цѣлью удаленія только разъясненныхъ мѣстъ, пораженныхъ туберкулезнымъ процессомъ, въ видѣ шѣзда по костной системѣ. Такой образъ дѣйствій былъ проводимъ почти на всѣхъ мѣстахъ человѣческаго скелета, за исключеніемъ позвоночника. Однако уже и тогда было извѣстно, что въ трехъ случаяхъ были сдѣланы попытки докторомъ Тревесомъ обнажить пораженные места позвонковъ, удалить ихъ операциею и примѣненіемъ обеззараживающихъ веществъ непосредственно къ больнымъ позвонкамъ. Полученные докторомъ Тревесомъ благопріятные результаты побудили автора примѣнить эту же операцию у 11-ти лѣтняго мальчика, страдавшаго спофагіею, затрудненнымъ дыханіемъ и прогрессивно развивающимся параличемъ верхнихъ конечностей. При наличии сказанныхъ явлений было не предполагать страданія позвоночника. Находя больного въ такомъ положеніи, по причинѣ названныхъ явлений, авторъ изъ ряда объективныхъ явлений могъ констатировать легкую припухлость въключичной области лѣвой стороны и болѣе выраженную чувствительность въ области 6 и 7 шейныхъ позвонковъ, на основаніи чего онъ разрѣзомъ чрезъ кожу и фасцію въ reg. supraclav sin., затѣмъ путемъ до V-го шейнаго позвонка, отсюда въ глубинѣ спустился къ VI и VII позвонкамъ и получилъ много гноя; по тому же пути ввелъ острую ложку и выскобилъ изъѣденныя мѣста 6 и 7 позвонковъ. Потомъ лечилъ больного вытѣтывающими снарядами съ замѣтно прекрасными результатами, относительно исчезновенія описанныхъ опасныхъ явлений. Однако рана не заживала и авторъ долженъ былъ повторить, чрезъ полгода, ту же операциѣ выскабливанія, послѣ чего окончательный результатъ получился, можно сказать, почти совершенный, смыслъ излѣченія, потому что не только уничтожились еще послѣ первой операциї угрожающіе жизни припадки, но и установились утраченныя функции во всѣхъ мѣстахъ бывшаго пораженія; пациентъ за время пополнѣль и выросъ. Случай этотъ описанъ авторомъ под-

робно, ясно, вполнѣ вѣдчно и свидѣтельствуетъ о его хирургиче-
киническихъ способностяхъ.

*Рецензіи проф. А. М. Шилтова сочиненій, перечисленныхъ
№№ 19, 40 и 41.*

Изъ многочисленныхъ сочиненій А. Г. Подреза я проштудиро-
въ только лишь нижеслѣдующія три работы: 1) (№ 19) „О личеніи
тонита чревосѣченіемъ“; 2) (№ 41) „О новомъ простомъ способѣ
желудка соустія въ желудочно-кишечномъ каналѣ“; и 3) (№ 40) „О
рурії сердца.“

1. Удачная операція у безнадежнаго больного—мальчика Бори
Б., страдавшаго перитонитомъ, можно считать безъ преувеличенія
вигомъ со стороны оператора и полнымъ торжествомъ современной,
противогнилостной хирургіи. Здѣсь каждого поражаетъ смѣлость и увѣ-
ренность въ успѣхѣ операціи со стороны хирурга въ то время, ~~когда~~
больной былъ близокъ къ агоніи: онъ находился передъ операціей ~~въ~~
полномъ упадкѣ силъ, колапсѣ и нитевидномъ пульсѣ. Здѣсь еще
стойко вниманія вѣрное опредѣленіе показанія къ операціи, несмотря
на отчаянное состояніе больного. Въ данномъ случаѣ цѣль операціи
заключалась не въ томъ только, чтобы путемъ чревосѣченія освободить
брюшную полость отъ воспалительного выпота, такъ какъ присутствовало
послѣдняго само по себѣ недостаточно объясняло грозную картину
бѣзъзни; при подробномъ изслѣдованіи больного операторъ пришелъ ~~къ~~
какому заключенію, что въ полости живота существуютъ многочисленные
склейки и перетяжки кишечка, вызывавшія глубокое разстройство ~~и~~
венообразованія.

На основаніи подобнаго діагноза, оправдавшагося при операціи,
операторъ нашелъ indicatio vitalis приѣтгнуть немедленно къ операціи, ~~и~~
не смотря на потухающую жизнь больного, предсказалъ о благоприятномъ
исходѣ операціи. Больной, пролежавъ 3 недѣли въ больнице, ~~и~~
выписался изъ нея совершенно здоровымъ.

Настоящій случай указываетъ на проницательный и вѣрный
взглядъ на болѣзнь и на діагностической способности автора, и намъ
кажется, что едва ли другой операторъ рѣшился бы на операцію ~~при~~
колапсѣ и нитевидномъ пульсѣ.

2. При непроходимости превратника вслѣдствіе различныхъ ~~причинъ~~
хирурги до послѣдняго времени примѣняли трудный и сложный
способъ gastro-enterostamiae, при чемъ больныхъ подвергали продоль-
ительному обѣтому наркозу и вскрывали сообщаемые органы—желу-
докъ и кишки—для образованія между ними соустія. Способъ ~~этотъ~~
вызывалъ шокъ и колапсѣ и смертность при немъ превышала болѣе 40%.

только въ послѣднее время со введеніемъ безгнилостныхъ пріемовъ смертность уменьшилась значительно, но зато до сихъ поръ не удавалось устранить загрязненіе брюшной полости вслѣдствіе вскрытия сообщаемыхъ органовъ.

Проф. Подрезъ значительно упростила операцию образованія соустія между желудкомъ и кишками, и предложилъ свой способъ, отличающійся простотой, безопасностью и быстрымъ выполнениемъ (10—15 минутъ). При его способѣ нѣть надобности вскрывать сообщаемые органы, чѣмъ устраняется загрязненіе брюшной полости и получается возможность излечить больныхъ чрезъ желудокъ въ первые дни послѣ операции. Громадная выгода этого способа заключается еще въ томъ, что получается возможность ограничиться вмѣсто хлориформированія мѣстною анестезіею макариномъ. Способъ проф. Подреза заключается въ томъ, что онъ спицаемые участки желудка и кишки приближаетъ и спиваетъ ихъ сквознымиъ, перекрестнымиъ швомъ; получается два сквозныхъ шва чрезъ стѣнки соединяемыхъ органовъ, которые, если ихъ сильно затянуть, въ условіямъ проникающаго шва присоединять еще защемленіе, благодаря которому наступить прободеніе обѣихъ стѣнокъ и установится соустіе между органами.

Недавно въ Обществѣ Кіевскихъ Врачей докторъ Шалита дѣлалъ до-
кладъ о gastro-enterostomiae по способу проф. Подреза. На основаніи своихъ
заблюдений докладчикъ пришелъ къ заключенію, что способъ проф. Подреза
заслуживаетъ полнаго вниманія хирурговъ и широкаго примѣненія. (Эта
же работа рецензирована еще проф. А. И. Дудукаловымъ). (См. ниже).

3. Статья о хирургіи сердца представляетъ собою извлеченіе изъ клиническихъ лекцій, читанныхъ проф. Подрезомъ въ Госпитальной клиникѣ въ теченіе 1897—98 учебнаго года. Статья начинается историческимъ обзоромъ хирургіи сердца, при чемъ приводятся статистическая свѣдѣнія о раненіяхъ сердца. Описываются проникающія и не проникающія раны сердца и ихъ послѣдствія для жизни. Далѣе указывается на присадки, служащіе критеріемъ для распознаванія сердечныхъ ранъ и на задачи хирурга въ случаяхъ раненіяхъ сердца. Попутно проф. Подреза въ случаяхъ раны сердца не слѣдуетъ тратить напрасно время на употребленіе внутреннихъ, оживляющихъ средствъ, рассчитанныхъ на поднятіе дѣятельности сердца, а немедленно приступить къ хирургической помощи, а именно: расширить рану сердечной строчки, освободить послѣднюю отъ сгустковъ крови и другихъ изліяній, послѣдовательно и обезпечить рану сердца отъ кровотеченія швомъ, и только послѣ всего этого можно надѣяться, что новое кровотеченіе и шокъ будутъ устраниены.

Salomoni давно уже производилъ опыты надъ раненіемъ и сшініемъ у собакъ сердца. Животные хорошо переносили всѣ подобныи поврежденія и жили долго послѣ операций. Rehn и Parazzani въ 1896 году производили операциі надъ людьми съ пораненіями сердца и сердечной сорочки и получили положительные результаты.

Въ концѣ статьи авторъ приводить собственное свое наблюденіе. Крестьянская девушка Меланья С., 16 лѣтъ, нечаянно ранила себѣ выстрѣломъ изъ револьвера въ грудь. Больная была доставлена въ Госпитальную хирургическую клинику 15 дек. 1897 г., где при изслѣдованіи нашли, что проникающая рана груди находится въ области сочлененія 5-го ребернаго хряща съ грудиною. Зондъ безпрепятственно проникалъ въ грудную полость на 5 сант. и упирался въ твердое тѣло, т. е. въ сердце и колебался ритмически. Въ виду того, что у больной появился полный упадокъ силъ, одышка, синюха и проч.,—приступленіе было къ вскрытию сердечной сорочки. Въ данномъ случаѣ операторъ не ограничился тѣснымъ разрѣзомъ, какъ дѣлали некоторые хирурги до него, а сдѣлалъ широкій лоскунтный разрѣзъ отъ 2 до 7-го ребра. Отдѣливъ и отвернувъ лоскунтъ, можно было видѣть почти весь правый желудочекъ сердца; часть лѣваго желудочка показывалась только во время вращательныхъ движений сердца. На поверхности праваго желудочка въ 3-хъ сантиметрахъ отъ конца его верхушки, замѣчалась продольная, бѣлесоватая щель, происшедшая отъ огнестрѣльной раны. Въ видахъ отысканія пули, операторъ рукою изслѣдовалъ всю полость сердечной сорочки, а для отысканія ея въ толщѣ стѣнокъ—сердца было захвачено подведенною подъ него ладонью лѣвой руки, а другой, правой, наложенной сверху, производилось двойное, ручное ощупываніе. Операторъ не счелъ нужнымъ вскрыть полость желудочка, такъ какъ не нашелъ ясныхъ указаній на присутствіе въ немъ инороднаго тѣла, не смотря на многократное прокалываніе сердца хирургическою иглой въ различныхъ направленіяхъ съ цѣлью изслѣдованія его полостей и стѣнокъ, а равно наложить швы на рану сердца, достаточно обезпеченну возможностью послѣдующаго наблюденія за обнаженнымъ сердцемъ, а потому ограничился тампонной, противогнилостной повязкой. Операцию девушка перенесла хорошо, и дѣятельность сердца все время не прекращалась. Лѣченіе шло успѣшно и черезъ 2 мѣсяца раны зажили. Больная выписалась изъ клиники 27 марта 1898 года совершенно здоровою.

Операциі въ области сердца принадлежать несомнѣнно къ труднѣйшимъ и блестящимъ въ современной хирургіи. Не много найдется хирурговъ, которые смѣло работали бы въ области сердца, какъ рабо-

твѣть въ другихъ областяхъ тѣла. Кромѣ основательныхъ познаній по хирургіи и топографической анатоміи—здесь необходимо имѣть смѣлую и твердую руку и большую находчивость, которая дается долголѣтнею опытностію. Счастливый исходъ настоящей операциіи я склоненъ приписать ловкости оператора, который быстрымъ опорожненiemъ сердечной сорочки и тампонадой ея предовратилъ несомнѣнно дальнѣйшіе грозные припадки—кровотеченіе и шокъ, и тѣмъ спасъ больную отъ вѣрной гибели. Въ Россіи мы не знаемъ другого примѣра подобной операциіи въ области сердца, при томъ окончившійся такъ блистательно. (Эта же работа рецензирована еще проф. М. А. Поповымъ). (См. ниже).

Кромѣ приведенныхъ здѣсь трехъ работъ проф. Подреза, я читалъ и другія его сочиненія и въ томъ числѣ прекрасное, объемистое его руководство въ двухъ томахъ о моче-половыхъ органахъ и должноъ сказать, безпристрастно, что проф. Подрезъ является однимъ изъ самыхъ желательныхъ кандидатовъ на каѳедру факультетской клиники, быть одинъ изъ лучшихъ хирурговъ въ Россіи, имѣющій за собою выдающиеся научныя заслуги.

Рецензія проф. А. И. Дудукарова сочиненія, помѣченного подъ № 23.

А. Г. Подрезъ. Книга озаглавленная „Хирургія“ напечатана на 182 страницахъ и составляетъ обзоръ и разборъ многихъ вопросовъ хирургіи на основаніи литературныхъ данныхъ 1886 года; она представляетъ приложение къ журналу „Медицинское Обозрѣніе“ за 1886 годъ.

Книга эта состоитъ изъ двухъ частей: А. *Обзоръ по общей хирургіи*, куда входятъ отдѣлы: 1—антисептика, лѣченіе ранъ, осложненія въ ранахъ; 2—опухоли, нарыва, пластическая операциіи и военная хирургія; 3—болѣзни органовъ движения; 4—хирургическая болѣзни спиннаго мозга, нервовъ, сердца и сосудовъ; 5—учебники, монографіи, хирургические отчеты. Б. *Обзоръ по отдѣламъ специальной хирургіи*, куда входитъ: 1—болѣзни головы, лица, полости рта и зѣва; 2—болѣзни головы, эпітакси, гортани и пищевода, а также бронховъ и легкихъ, легочная хирургія; 3—хирургическая болѣзни позвоночника; 4—болѣзни верхнихъ и нижнихъ конечностей; 5—хирургическая болѣзни живота: брюшины, желудка, кишечъ, печени, селезенки и 6—хирургическая болѣзни мочевыхъ и половыхъ органовъ.

Всѣ эти отдѣлы составлены на основаніи изученія большаго количества литературныхъ источниковъ, изложены во взаимной связи и последовательности развитія вопроса. Въ краткихъ, но точныхъ выраженияхъ изложены сущность и значеніе каждого изслѣдованія и затѣмъ създаны кое гдѣ выводы по извѣстному вопросу. Работа эта представляетъ интересный и полезный трудъ, чтеніе котораго для каждого

врача замѣнить изученіе громадной литературы за извѣстное время. Хотя трудъ этотъ въ формѣ обзора не имѣть вполнѣ самостоятельный характеръ, но за то здѣсь по каждому вопросу до извѣстной степени выясняются не только взгляды, но и эрудиція автора, а эти вопросы касаются очень многихъ отдѣловъ частной и общей хирургіи, то сочиненіе это является солиднымъ материаломъ для оценки литературной подготовки кандидата. Значеніе этого труда въ этомъ отношеніи во столько велико, что онъ одинъ въ состояніи дать вѣрную точку зрения для правильного сужденія въ этомъ направленіи. Въ заключеніе считаю нужнымъ сказать, что сочиненіе это доказываетъ работоспособность автора.

Рецензіи проф. И. Ф. Зеленева на сочиненія помѣченныя подъ №№ 21, 38 и 39.

A. Подрезъ. а) *Хирургическая болѣзни мочевыхъ и половыхъ органовъ.* Часть I. *Болѣзни уретры* съ 50 рисунками въ текстѣ и таблицею эндоскопическихъ изображеній. Харьковъ. 1887. (№ 21). б) *Тоже сочиненіе.* Издание второе—дополненное. 1896. (№ 38).

Хирургическая болѣзни мочевыхъ и половыхъ органовъ представляетъ собою руководство, составленное авторомъ по лекціямъ, читавшимъ имъ студентамъ медицинскаго факультета Харьковскаго университета. Первая часть этого руководства „болѣзни мочеиспускательного канала“ вышла вторымъ изданіемъ. Такъ какъ второе изданіе отъ первого отличается очень мало (введеніемъ главы „объ анатоміи мочеиспускательного канала“ около $5\frac{1}{2}$ страницъ, двумя страницами патологической анатоміи и отсутствиемъ таблицы эндоскопическихъ изображений), то все сказанное мною про второе изданіе будетъ относиться и къ первому.

Трудъ автора распадается на двѣ части: общую и специальную. Въ общей части авторъ рассматриваетъ симптоматологію и общую диагностику мочеполовыхъ болѣзней и способы хирургического изслѣдованія ихъ. Въ первой главѣ онъ описываетъ болѣвые ощущенія, ненормальная отдѣленія, уклоненія въ мочеотдѣленіи и измѣненія качества мочки. Во второй—способы катетеризаціи, бужировки и эндоскопіи. Специальный отдѣлъ начинается главой объ анатоміи мочеиспускательного канала (съ 67—71 стр.). Во второй главѣ рассматривается воспаленіе мочеиспускательного канала: 1) ученіе о бленнопрѣ, 2) urethritis simplex, 3) urethritis granulosa, 4) urethritis catarrhalis chronica и 5) urethritis herpetica. Въ третьей главѣ описываются съженія мочеиспускательного канала и ихъ лѣченіе дилатацией, уретротоміей, каутеризаціей, электролизомъ и массажемъ. Въ четвертой главѣ говорится о ложныхъ ходахъ.

ушибахъ и раненіяхъ уретры, о происхожденіи и лѣченіи мочевой инфильтрації. Пятая глава посвящена происхожденію и лѣченію уретральныхъ фистулъ, а шестая—описанію свободныхъ соединительно-канальныхъ образованій въ мочеиспускательномъ каналѣ (перепонокъ, заслонокъ, карункуловъ, папилломъ и полиповъ уретры). Всѣ отдѣлы составлены авторомъ съ полнымъ пониманіемъ дѣла, согласно новѣйшимъ изслѣдованіямъ въ этіологіи и терапіи разбираемыхъ процессовъ. Многіе факты иллюстрированы клиническими интересными случаями изъ собственной практики и обоснованы на собственныхъ наблюденіяхъ (эндоскопія, ученіе о бленорреѣ, способъ укрѣпленія постоянного катетера, принадлежащій автору, способъ резекціи уретры при каллезныхъ структурахъ, принадлежащій автору). Изложеніе ясно и въ текстѣ имѣются рисунки инструментовъ и аппаратовъ. Единственнымъ упреждомъ для автора можетъ быть то, что, выпуская второе дополненное изданіе первой части, онъ не нашелъ нужнымъ просмотрѣть литературу послѣ 1887 г. Такимъ образомъ второе изданіе (1896 г.) является почти полнымъ повтореніемъ первого (1887 г.).

A. Подрезъ. Хирургическая болѣзни мочевыхъ и половыхъ органовъ. Часть II. Болѣзни предстательной железы и мочеваго пузыря. (Съ 108 рисунками въ текстѣ). Харьковъ. 1896 г. (№ 39).

Во второй части своего труда авторъ описываетъ болѣзни предстательной железы и мочеваго пузыря (610 стр.). Описанію болѣзней предстательной железы предшествуетъ анатомія и способы изслѣдованія предстательной железы. Изъ болѣзней авторъ коротко описываетъ пороки развитія предстательной железы и болѣе подробно останавливается на воспаленіяхъ простаты, описывая и формы острого (prostatitis simplex acuta, pr. blennorrhœica и pr. phlegmonosa) и одну хронического воспаленія (pr. chronica s. catarrhalis). Значительное количество страницъ (42—94) посвящается авторомъ старческому увеличенію предстательной железы, выясненію анатомическихъ измѣненій въ мочевыхъ путяхъ, диагнозу и лѣченію страданія. Авторъ тщательно описываетъ гигиеническое, симптоматическое и оперативное лѣченіе съ прибавлениемъ новыхъ способовъ радикального лѣченія (перевязкою внутреннихъ подвздошныхъ артерій по Bier'у и посредствомъ холощенія). Далѣе следуетъ описание камней, кистъ бугорчатки, рака и ранъ предстательной железы. Нѣкоторые изъ перечисленныхъ отдѣловъ снабжены клиническимъ материаломъ изъ практики автора. Анатомія и физіология и способы изслѣдованій (наружный, зондированіе, катетеризація и цистоскопія) предшествуютъ описанію болѣзней мочеваго пузыря. Затѣмъ следуетъ описание пороковъ развитія, травматическихъ поврежденій и

кровотечений изъ пузыря. Въ главахъ неврозовъ мочеваго пузыря приведено нѣсколько интересныхъ казуистическихъ случаевъ изъ клиники автора. Очень обстоятельно обработанныя авторомъ главы объ этиологии и лѣченіи различныхъ формъ циститовъ согласно современнымъ клиническимъ и экспериментальнымъ изслѣдованіямъ въ этомъ направлении. Послѣднія страницы руководства посвящены этиологіи и лѣченію каменной болѣзни. Указавши на условія камнеобразованія и свойства камней, авторъ разбираетъ значеніе каменной болѣзни вообще, даетъ подробнную симптоматологію и диагностику камней, описывая новѣйшіе способы изслѣдованія посредствомъ резонатора Brocke'a, темфона Thopson'a, литофона Dawidson'a. Также тщательно разбираетъ авторъ и способы лѣченія каменной болѣзни (предохраняющей, камнедробленіе и камнесѣченіе), предположивши имъ историческій взглядъ на развитіе оперативнаго лѣченія каменной болѣзни. И здѣсь авторъ показываетъ себѣ хирургомъ — практикомъ, предлагая нѣкоторыя усовершенствованія техники (напр. при наложеніи мочепузырного шва). Послѣднія страницы принадлежатъ описанію инородныхъ тѣлъ и опухолей мочеваго пузыря. Если мы прибавимъ къ сказанному, что руководство написано хорошо слогомъ, снабжено рисунками анатомическими, гистологическими, различныхъ аппаратовъ и инструментовъ, употребляемыхъ для диагностическихъ и оперативныхъ цѣлей, то мы можемъ признать это руководство цѣннымъ вкладомъ въ русскую медицинскую литературу.

Рецензія Проф. А. И. Дудукарова на сочиненіе, помѣченное подъ № 22.

Статья „*O вырѣзываніи селезенки—splenotomy*“ напечатана на 20 страницахъ въ 1887 году. Одной изъ труднѣйшихъ въ техническомъ отношеніи современныхъ операций должна, безъ сомнѣнія, считаться операция вырѣзыванія селезенки. Техника ея такъ сложна и опасна, что нужно обладать увѣренностью въ своихъ силахъ, чтобы решиться на ея производство. Дѣйствительно, во всей Европѣ и Америкѣ производство ея было связано съ именами самыхъ выдающихся хирурговъ, какъ Pean, Spenser-Wells, Watson, Billroth, Kocherle, Bryant, Credi, Terrier и другіе, а у насъ въ Россіи на долю автора выпало быть первымъ, произведшимъ эту громадную операцию и притомъ съ счастливымъ исходомъ, 22 ноября 1886 года. Статья эта состоитъ изъ трехъ отдѣловъ: въ первомъ собрана и сгруппирована немногочисленная литература того времени по вопросу о вырѣзываніи селезенки; во второмъ описывается случай автора у 36-лѣтней женщины, имѣвшей огромную гипертрофию этого органа, вызвавшую кахексію и брюшную водянку. Въ третьемъ подробно разбираются показанія для спленотоміи

при разныхъ заболѣваніяхъ этого органа, какъ простой и малярійной гипертрофіи, лейкемическомъ увеличеніи, блуждающей селезенкѣ, эхинококкѣ, опухоляхъ и проч. Установка этихъ показаній сдѣлана на основаніи строгаго разбора и оцѣнки статистическихъ данныхъ и каждого отдельнаго случая. Въ заключеніе авторъ, на основаніи правильнаго анатоміи, опыта предшественниковъ и собственнаго наблюденія, подробно разбираетъ технику операциіи и устанавливаетъ правила производства этой громадной и въ высшей степени трудной операциіи. Изложеніе живое, вниманіе читателя не ослабѣваетъ до конца. Исторія болѣзни составлена подробно.

Рецензія проф. А. И. Дудукалова на сочиненіе, помѣченное подъ № 26.

А. Г. Подрезъ. Работа „Объ оперативномъ лечениіи бугорчатки суставовъ“, напечатанная въ 1888 году на 47 страницахъ съ двумя большиими таблицами, относится къ клинической хирургіи и заключаетъ 43 случая резекцій и артрактомії (по Фолькманну, Кенигу и Оллье) та забедренного и колѣннаго сочлененій изъ собственной клинической дѣятельности автора.

Работа распадается на три отдѣла:

а) *предисловіе*, въ которомъ авторъ указываетъ на недостаточную обработку этого отдѣла хирургіи и постоянный переходъ активной хирургіи къ консервативизму и обратно, и настаиваетъ на необходимости заново пересмотрѣть этотъ вопросъ на основаніи новыхъ работъ (о туберкулезѣ) современныхъ авторовъ.

б) *Обзоръ современныхъ данныхъ статистики и сравненія результатовъ консервативно выжидательного и консервативно оперативного методовъ лечения бугорчатки большихъ суставовъ*. Эта часть (35 страницъ) составляетъ интересную и цѣнную часть работы, такъ какъ въ ней собранъ и тщательно почти весь имѣющійся въ современной литературѣ статистической матеріалъ, включая сюда и отчетъ русскихъ больницъ и госпиталей. Матеріалъ этотъ авторъ рассматриваетъ по отношенію во 1-хъ къ общему проценту смертности въ ближайшее ко времени лечения и въ отдаленное (бугорчатка общая, амилоидъ, истощеніе) время; во 2-хъ—къ возвратамъ туберкулеза и въ 3-хъ къ функциональной пригодности конечности при томъ и другомъ методѣ лечения и приходить къ выводу, что несмотря на некоторую опасность въ самой операциіи (возможность смертельного исхода отъ наркоза, шока и осложненій) все же процентъ смертности при оперативномъ лечениіи въ общемъ значительно меньшій, чѣмъ при выжидательномъ, а если принять еще во вниманіе болѣе и болѣе опасные возвраты болѣзни при послѣднемъ ме-

тодѣ и возможность возстановленія подвижности суставовъ при современныхъ методахъ оперативнаго лечения, то вопросъ о преимуществѣ его выясняется еще больше. Въ этой главѣ авторъ останавливается довольно подробно на способахъ борьбы съ рецидивами суставной бугорчатки и вырабатываніи неартрозовъ. Въ третьемъ отдѣлѣ разбираются до 43 собственныхъ случаевъ автора, зарегистрированныхъ въ особомъ приложеніи въ концѣ, двухъ таблицахъ. Въ первой таблицѣ описаны 22 случая оперативнаго лечения тазобедреннаго сустава, а во второй—21 случай колѣннаго сочлененія. Матеріалъ этотъ относится къ періоду отъ 1885 по 1888 года.

Изъ этой главы видно, что авторъ обладаетъ значительнымъ клиническимъ матеріаломъ и вполнѣ зрѣлымъ хирургическимъ опытомъ, такъ какъ во 1-хъ) эти 43 оперированные случаи составляютъ сравнительно незначительную часть всего $\frac{1}{5}$ наблюдавшихся авторомъ бугорковыхъ страданій большихъ суставовъ и леченихъ консервативными методомъ; во 2-хъ) что такой сравнительно малый процентъ оперированныхъ, предъ консервативнымъ способомъ указываетъ на строгую дифференцировку случаевъ и примѣненіе точныхъ показаній къ оперативному вмѣшательству; въ 3-хъ) необыкновенно счастливый результатъ при оперативномъ лечении (изъ 43 случаевъ операций надъ тазобедреннымъ и колѣнными суставами ни одинъ больной не умеръ, ни отъ операции, ни вскорѣ послѣ нея) несмотря на то, что оперировались только тяжкія формы бугорчатки суставовъ, указываетъ на большой опытъ въ примѣненіи современныхъ безгниостныхъ методовъ лечения ранъ и хорошую оперативную технику. Но особенно интересными и плодотворными оказались стремленія автора къ функциональнымъ результатамъ оперированныхъ суставовъ. Путемъ особой техники при операции и особенно уходомъ и послѣдовательнымъ лечениемъ въ періодѣ заживленія раны авторъ стремился выработать подвижность суставовъ и изѣбѣгнуть анкилоза. Отчетъ доказываетъ, что эти попытки увѣнчались успѣхомъ, ибо въ 50% получилась почти нормальная подвижность—неартрозъ; въ 40%—подвижность была хотя и меньше нормальной, но все же достаточной для цѣлей функций—полуподвижность; только въ 10% т. е. въ двухъ случаяхъ пришлось отказаться отъ неартрозовъ. Въ вопросѣ объ оперативномъ лечении бугорчатки суставовъ видную роль играютъ укороченіе конечности, неизбѣжно получаемое въ большей или меньшей степени въ зависимости отъ разныхъ условій. Съ этимъ надо считаться и потому то вниманіе, съ которымъ авторъ отнесся къ этому вопросу служитъ признакомъ солиднаго отношенія къ хирургической помощи. Въ концѣ главы авторъ описываетъ цѣлый рядъ оперативныхъ

пріемовъ, начиная съ простыхъ выскабливаній острой ложкой (Фолькманнъ) до artrectomia и экономическихъ резекцій по Олліе и Тилингу. Всѣ эти способы примѣнялись авторомъ подъ опредѣленными показаніями. Въ заключеніе говорится объ опасности примѣненія въ случаяхъ бугорчатки ортопедической brisement forcé даже долгое время спустя послѣ кажущагося выздоровленія сустава.

Свое положеніе авторъ иллюстрируетъ нѣсколькими исторіями болѣзней. Кромѣ общаго научнаго интереса, который не утратился и въ настоящее время, брошюра эта, несмотря на то, что она написана 10 лѣтъ назадъ, заслуживаетъ вниманія и потому, что она въ свое время представляла кажется первую русскую работу по этому вопросу.

Рецензія проф. И. Ф. Зеленева сочиненія помѣченного подъ № 27.

А. Подрезъ. О быстромъ и насильственномъ расширениі мочевыхъ путей при неврозахъ мочеполового аппарата у женщинъ. (Сообщено въ засѣданіи медицинской секціи Общества Опытныхъ Наукъ при Импер. Харьков. университѣтѣ 1890 г.).

Это сообщеніе автора написано по поводу успѣшнаго примѣненія имъ быстраго и насильственного расширенія уретры и шейки мочевого пузыря у 19-ти лѣтней еврейки, долго лѣчившейся безуспѣшно отъ невроза мочеполового аппарата. Расширеніе уретры было произведено зеркалами Simon'a, согласно указанію предшественниковъ (Hewetson, Тиль и Шпигельбергъ), получившихъ благопріятный результатъ въ тяжелыхъ случаяхъ цистоспазма. Указывая на безопасность способа растяженія для функций мочевыхъ органовъ, авторъ, и рекомендуетъ способъ дилитациіи по Simon'у, какъ прекрасный хирургический методъ лѣченія цистоспазма, невроза уретры и подобныхъ имъ разстройствъ. Мы не можемъ абсолютно принять къ рекомендаціи автора, такъ какъ и въ его случаѣ неврозъ возобновляется чрезъ 3 мѣсяца и потребовалъ новаго растяженія. Какъ продолжителенъ былъ успѣхъ второго растяженія, мы не видимъ изъ сообщенія автора. Во всякомъ случаѣ эффектъ этого лѣченія обнаруживается быстро и по одной этой причинѣ способъ заслуживаетъ рекомендаціи. (Случай этотъ приведенъ въ учебникѣ).

Рецензія проф. А. В. Репрева сочиненія, помѣченного подъ № 29.

Проф. А. Подрезъ. „Къ вопросу о предъмѣахъ чревосѣчнія при перитонитахъ“. 1891 г. Оттискъ изъ трудовъ Медицинской секціи Общества Опытныхъ Наукъ при Император. Харьковскомъ университѣтѣ. 19 стр. in 8°.

Авторъ въ самомъ началѣ своей статьи отмѣчаетъ съ одной стороны быстрое распространеніе оперативнаго способа при перитонитахъ

въ послѣдніе 8—9 лѣтъ, а съ другой указываетъ на односторонность третированія перитонитовъ, кои дѣйствительно подходитъ подъ это опредѣленіе. Но и здѣсь не существуетъ солидарности взглядовъ хирурговъ, что видно изъ разсмотрѣнія 1) показаній къ производству чревосѣченій, 2) мнѣній объ антисептической хирургіи самой полости живота и 3) взглядовъ на задачи операциіи. Авторъ не считаетъ противопоказаніемъ операциіи, какъ это принято большинствомъ хирурговъ. Антисептическую хирургію считаетъ возможной и для полости живота. Относительно задачъ операциіи авторъ видѣтъ ихъ не въ удаленіи только скопищъ гноя; летальный исходъ не всегда бываетъ отъ неудаленія гнѣздъ заразы. Какая ближайшая причины въ нѣкоторыхъ случаяхъ смертей отъ перитонитовъ послѣ чревосѣченій, неизвѣстна. Послѣ такого вступленія авторъ, не имѣя въ виду подробнаго разбора ученія о перитонитахъ, приводитъ нѣсколько примѣровъ изъ своихъ клиническихъ наблюдений надъ перитонитами, лѣченными чревосѣченіемъ и отмѣчаетъ особенности этихъ случаевъ,ющими помочь постройкѣ извѣстныхъ правилъ, извѣстной законности относительно предсказанія исходовъ операциіи, хотя конечно не при нынѣшнихъ еще неопределенныхъ и шаткихъ условіяхъ. Подробно разбирая два случая и сопоставляя ихъ особенности, авторъ заключаетъ, что разные исходы оперативнаго вмѣшательства—полное выздоровленіе въ одномъ,—беззадежное, по клиническимъ признакамъ, и смерть въ другомъ случаѣ, при наличии въ обоихъ адгезивнаго перитонита, зависѣли отъ того, что въ первомъ случаѣ оперативнымъ пособіемъ возстановились нормальные отношенія въ полости живота, во второмъ же этого возстановленія невозможно было достигнуть.

Подкрѣпленіемъ своему выводу авторъ считаетъ данныя физиологии относительно иннервации и питанія кишечныхъ стѣнокъ. Нарушеніемъ n. splanchnici и симпатического нерва, нарушеніями, непоправимыми въ одномъ случаѣ и легко справлямыми въ другомъ, легко объясняется разница исходовъ, объясняется также и клиническая картина шока и исчезаніе его при возстановленіи нормальныхъ анатомическихъ отношеній путемъ операциіи.

Въ неудалимыхъ срощеніяхъ должно видѣть и предѣль успѣшности операциіи. Далѣе приводятся клиническіе признаки, по которымъ до операциіи можно съ извѣстнымъ вѣроятіемъ узнать неудалимые срощенія.

Въ дальнѣйшемъ авторъ нотируетъ выносливость брюшины въ отношенію къ самому невѣроятному загрязненію. Иллюстрируется это положеніе клиническимъ случаемъ.

Заключаетъ авторъ свою статью сравненіемъ, что положеніе современного хирурга въ разбираемомъ вопросѣ вполнѣ можетъ быть подоблено положеніемъ между Сциллой и Харібдой древнихъ.

Рецензія проф. А. В. Репрева сочиненія, помѣченного подъ № 30.

Проф. А. Г. Подрезъ. „Вліяніе удаленія мъстныхъ бугорковыхъ израженій на теченіе легочной чахотки“.
Оттискъ „Хирургического Вѣстника“. 1894 г. Іюль. 12 страницъ.

Статья начинается указаніемъ, что золотушныя и бугорковыя заболѣванія признаны въ настоящее время происходящими отъ одной и той-же причины—отъ Koch'овской бациллы; подмѣчено уже, что большій процентъ золотушныхъ людей оканчиваетъ жизнь свою въ близи или далекомъ будущемъ отъ легочной чахотки, что различные органы въ различной степени подвержены мъстнымъ бугорковымъ заболѣваніямъ, и что особенно важно удалось подмѣтить фактъ различной зависимости между заболѣваніемъ периферическихъ органовъ и легкаго, смотря потому откуда происходитъ процессъ: со стороны легкаго, или же периферическихъ органовъ. При легочномъ туберкулезѣ чаще заболѣваются кишки и брюшина, затѣмъ лимфатическая железы, rectum, мочевые и половые органы, и наконецъ кости и суставы. При хирургическомъ туберкулезѣ (отъ периферіи) порядокъ совмѣщенія этихъ процессовъ съ легочнымъ туберкулезнымъ совершенно менѣется. Туберкулезъ легкихъ рѣдокъ при пораженіи мочеполовыхъ органовъ; обратное явленіе чаще встрѣчается. Съ суставовъ туберкулезъ переходитъ чисто на легкое; обратное не наблюдается и т. д. Но вообще „число набранныхъ въ этомъ направленіи наблюдений не велико“. Не решенье выше вопросъ чисто хирургической: полезно-ли, въ смыслѣ вліянія на теченіе туберкулеза, активное хирургическое вмѣшательство, направленное противъ мъстныхъ заболѣваній бугорковаго характера, облегчить-ли оно и замедлить теченіе легочной чахотки, или наоборотъ способствуетъ ускоренному теченію ея и укорачиваетъ жизнь больного?

Изъ изученія литературы этого вопроса авторъ убѣждается, что отрицаніе вмѣшательства хирурга при наличии преобладанія легочнаго туберкулеза, не смотря на высокую авторитетность ученыхъ, совершившихъ такое положеніе, не покоятся на незыблемыхъ основахъ. Принѣ того, не всегда легко опредѣлить на живомъ, что больше ему принадлежитъ легочный, или иной какой туберкулезъ, старый процессъ или новое? Да и самый легочный туберкулезъ много различенъ по своему течению. Отрицаніе вмѣшательства хирурга при всякомъ легочномъ туберкулезѣ не справедливо и неправильно. Подкрѣпляя свой взглядъ клиническими наблюденіями надъ туберкулезными, авторъ упоминаетъ,

что онъ выступалъ уже противникомъ положенія о хирургической приосновенности легочно-туберкулезныхъ больныхъ (на 3-мъ съездѣ врачей въ память Пирогова) и тогда уже рядомъ случаевъ успѣшнаго вліянія активнаго вмѣшательства хирурга доказывалъ необоснованность положенія *noli me tangere* въ данномъ вопросѣ. Тогда высказанное на съездѣ мнѣніе авторъ въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ имѣлъ возможность подкрѣпить своими клиническими наблюденіями и все болѣе и болѣе считать его справедливымъ. Какъ доказательство высказанного авторъ приводитъ *подробно изученный клиническій случай*, где съ яркостью выступаетъ польза активнаго вмѣшательства хирурга на теченіе легочнаго туберкулеза и вообще для жизни больного.

Въ заключеніе авторъ ставить вопросъ: слѣдуетъ ли въ случаяхъ одновременного туберкулеза въ легкихъ и другихъ тканяхъ отказываться отъ операции надъ мѣстными бугорковыми пораженіями, или должно вѣрить въ полезное дѣйствіе оперативного пособія имѣя въ виду доказанную уже излечимость легочнаго туберкулеза?

Рецензія проф. А. Х. Кузнецова на сочиненіе, помѣченное подъ № 31.

A. Подрезъ. „Два случая туберкулезного прободного перитонита“. Журналъ медицины и гигиѳны 1894 г. № 1.

Во вступлениі, занимающемъ 17 страницъ, авторъ говоритъ о частотѣ бугорковаго пораженія брюшины, приводя таблицы Dick'a, Schmal-mack'a, Borschke, Fenwick'a, какъ первичнаго, такъ и вторичнаго съ разсмотрѣніемъ при этомъ вліянія возраста и пола; далѣе говорить о проникновеніи въ брюшную полость контагія, о дѣленіи перитонита, приводя мнѣнія Cimbali, Sick'a, Elliot'a, Harlick'a. Далѣе онъ указываетъ на малую извѣстность перфоративнаго туберкулезнаго перитонита, такъ какъ ему удалось въ литературѣ найти только описание двухъ случаевъ Петровскаго и Boiffini. Къ нимъ относитъ авторъ и свой первый случай. Потомъ излагаетъ припадки туберкулезнаго перитонита и распознаваніе его, при чёмъ указываетъ на трудность послѣдняго при образованіи туберкулезныхъ опухолей и при отсутствіи признаковъ туберкулеза въ другихъ органахъ и наконецъ оперативное лечение. Приводя статистическая данные Кюммеля, Trzebinsk'аго, Кенига, Cimbali и друг., авторъ указываетъ на успѣшность операциі, даже повторенной, и говорить, что, въ виду этихъ статистическихъ данныхъ, всѣ наши усиія должны быть направлены къ выработыванію способовъ возможно ранніаго опредѣленія характера страданія брюшины и что терапевтическое лечение должно уступить мѣсто хирургическому, какъ способу почти вѣрному и безопасному. Потомъ описывается выборъ мѣста разрѣза, родъ

манипуляції въ брюшной полости, склоняясь къ простому вскрытию изслѣдней, даже безъ дренажа, приводя мнѣнія Lauenstein'a, Sick'a, Cabot'a и друг.

Наконецъ онъ описываетъ два случая изъ своей клиники въ 1892—3 году. Въ первомъ случаѣ больной поступилъ съ явленіями перфоративнаго перитонита. При операциіи найденъ туберкулезный процессъ и преимущественно въ слѣпой кишкѣ. Чрезъ 16 дней операцию пришлось повторить, вслѣдствіе гнойниковаго скопленія въ области слѣпой кишки. Больной изъ клиники выписался здоровымъ и прибѣжалъ въ вѣсЬ. Здѣсь авторъ все-таки примѣнялъ дренажъ. Во второмъ случаѣ больная поступила съ хроническимъ перитонитомъ. При операции найдено, что оба листка брюшины оказались покрытыми миллиарными туберкулами. Послѣ операциіи больная почувствовала облегченіе, перевязка все время была сухая; все-таки былъ вставленъ дренажъ. Потомъ установился каловый свищъ и больная умерла чрезъ мѣсяцъ послѣ операциіи.

Въ этой статьѣ слѣдуетъ указать на недостаточность показаній для производства операциіи во 2-мъ случаѣ; на отсутствіе микроскопическаго изслѣдованія удаленныхъ изъ брюшной полости частицъ ткани; на противорѣчіе, въ которое впадаетъ авторъ, отрицая дренажъ во вступлении и примѣняя его однако при операциіи. Именно на 17 стр. говорить, что примѣненіе дренажа, какъ показываетъ опытъ лѣчения бугорчатки брюшины, имѣетъ скорѣе дурное, чѣмъ хорошее вліяніе послѣдующее лѣченіе бугорковаго перитонита.

Рецензія проф. А. И. Дудукалова на сочиненіе, помѣченное подъ № 32.

Статья „Теодоръ Билльротъ и его значеніе въ хирургіи“, рѣчъ, произнесенная въ обществѣ научной медицины и гигіиены 9 февраля 1894 года, напечатана на 14 стр.

Покойный проф. Билльротъ представлялъ весьма крупное явленіе въ хирургіи XIX столѣтія. Его обширная научно-практическая дѣятельность и его необычайная популярность, какъ учителя, составили всемирную славу и справедливо укрѣпили за нимъ название родоначальника современной школы хирурговъ. Школа эта всемирная, такъ какъ покойному Билльроту стекались учиться со всѣхъ странъ свѣта и государствъ и такъ какъ она и до сихъ поръ считается лучшою въ Европѣ, то принадлежность къ этой школѣ составляетъ величайшую честь для современного хирурга. Проф. Подре兹ъ состоялъ въ числѣ учениковъ этого замѣчательнаго хирурга и его рѣчъ служить доказательствомъ глубокаго пониманія этой выдающейся личности. Рѣчъ на-

чиается уясненiemъ знанія личностей подобнаго рода для исторіи медицины и причины той необычной популярности, которой пользовался покойный хирургъ. Далѣе ораторъ переходитъ къ характеристикѣ научныхъ и личныхъ особенностей Билльрота; какимъ образомъ формировался этотъ дѣятель, какія особенности и заслуги его въ научной и практической хирургіи и въ чемъ заключается особенность и оттѣнокъ его школы. Рѣчь эта является прекрасной и всесторонней иллюстраціей того впечатлѣнія, которое производилъ Билльротъ на своихъ учениковъ и вмѣстѣ съ тѣмъ можетъ служить критеріемъ для оценки практическихъ и ораторскихъ способностей автора. Какъ съ той, такъ и съ другой стороны рѣчь эта заслуживаетъ хорошій отзыва.

Рецензія проф. А. И. Дудукалова на сочиненіе, помѣченное подъ № 33-мъ и 34-мъ

А. Г. Подрезъ. Статья „О швѣ слизистыхъ оболочекъ“ напечатана на 11 страницахъ съ таблицею рисунковъ въ 1895 году. То же— на немецкомъ языке.

Указавъ на большое сходство въ строеніи между кожею и слизистою оболочкою, авторъ говоритъ о крайне различномъ, столь жеительномъ первичномъ натяженіи, которое почти не наблюдается на послѣдней. Онъ стремится выяснить причины столь рѣдкаго первичнаго натяженія на слизистыхъ оболочкахъ и приходитъ къ заключенію, что ближайшее изъ нихъ надо считать присутствіе продуктовъ, не только выдѣляемыхъ самой слизистой оболочкой, но и другихъ, куда относятся урина, дификаціонныя массы, пищевые и пищеварительные продукты. На основаніи такихъ соображеній онъ рекомендуетъ особый шовъ видѣ узловаго или непрерывнаго шва, которые каждымъ стежкомъ должны захватывать главнымъ образомъ подслизистую ткань и небольшую часть внутренняго слоя слизистой оболочки, причемъ самый узелъ долженъ располагаться въ нижней части раны (на днѣ), иначе онъ своимъ присутствиемъ вблизи поверхностнаго слоя слизистой оболочки можетъ при узловомъ швѣ помѣшать плотному соприкосновенію ея краевъ; при непрерывномъ швѣ начальный и конечный узлы его должны находиться вдали отъ раны. Насколько предлагаемый шовъ окажется полезнымъ въ практикѣ, покажетъ будущее, но съ теоретической точки зреія нельзя не признать, что у автора существуетъ большая доля наблюдательности, умѣніе осуществлять свои мысли, хотя, по нашему мнѣнію, трудной техникой.

Рецензія проф. А. И. Дудукалова сочиненій, помѣченныхъ подъ №№ 35 и 36.

A. Г. Подрезъ. Статья „Механическое расширение выхода желудка и высабливание язвы желудка“, напечатана на 12 страниц въ 1895 году. То же—на немецкомъ языкѣ.

Въ началѣ этой статьи авторъ пытается разобраться въ вопросѣ рубцовомъ съуженіи выхода желудка и сообразно съ этимъ выбрать соответствійный оперативный пріемъ. (Хотя извѣстные пріемы въ то время, казалось, были значительно разработаны, но практика еще не владѣла этими приобрѣтеніями техники). Поводомъ къ выясненію поставленій примѣненія различныхъ оперативныхъ пріемовъ былъ молодой больной, у которого была діагносцирована, въ терапевтическомъ отдѣленіи военного госпиталя, круглая язва желудка и съженіе его выхода.

Тщательно разобравъ различные оперативные пріемы, которыми можно было бы удалить существующій процессъ, авторъ остановился на операциіи Loreta, хотя не новой, но менѣе опасной для жизни, менѣе нарушающей физіологическія функции органовъ. Что касается язвы желудка, то авторъ высаблилъ ее,—это рѣдкая операція, уже сама по себѣ обращающая вниманіе читателя. Однако интересъ этой статьи не въ одной только смѣлой, счастливо окончившейся техникѣ, но и въ томъ, что за основаніе при выборѣ оперативнаго метода были приняты во вниманіе жизненные и физіологические интересы больного.

Рецензія проф. М. А. Попова сочиненія, помѣченаго подъ № 40.

Проф. А. Г. Подрезъ. „О хирургіи сердца“. (Извлеченіе изъ клиническихъ лекцій, читанныхъ въ зимнемъ семестрѣ 1897—8 ак. года). Отдельный оттискъ изъ газеты „Врачъ“. 1898 г. въ 39 стр.

Статья проф. Подреза относится къ самому новѣйшему интересному вопросу и еще недоступному для хирургіи органу—сердцу. Уже съ этой одной стороны статья эта возбуждаетъ особый интересъ и вниманіе современаго врача.

Содержаніе клинической лекціи проф. Подреза таково: въ первой части авторъ, приводя перечисленіе разсѣянныхъ въ медицинской литературѣ случаевъ и наблюденій надъ раненіемъ сердца, старается выяснить всѣ важныя для хирургіи особенности этихъ поврежденій, такъ-то: симптомы, теченіе, причины смерти при раненіи сердца, влияние поврежденія того или другаго отдѣла, а равно и исходы при раненіяхъ сердца и большихъ сосудовъ. Конечной цѣлью изученія всѣхъ этихъ явлений имѣется рѣшеніе важнаго вопроса: *доступна ли показанная активная хирургическая помощь для раненыхъ въ сердце или нетъ?* На основаніи литературныхъ данныхъ, а также на основаніи статистики, собранной Jamin'омъ и Fischer'омъ и наблюденій Пирогова, авторъ приходитъ къ весьма интереснымъ и совершенно новымъ выводамъ

относительно раненій сердца, а именно: *раненія сердца вовсе не безнадежны*, какъ привыкли думать, *немедленная смерть послѣ раненія сердца составляетъ болѣе рѣдкое явленіе*, такъ какъ большая часть переживаетъ травму и гибнетъ отъ осложненій и послѣдствій ее, отсюда слѣдовательно вытекаетъ, что *кажущаяся безнадежность раненія сердца происходитъ не отъ природы раненія и повреждаемой области а отъ недостаточнаго развитія активной хирургіи сердца*.

Далѣе, изучая отдельные случаи раненій сердца, проф. Подольский приходитъ къ ряду совершенно новыхъ и весьма интересныхъ изслѣдовъ относительно теченія сердечныхъ пораненій, а именно: 1—*сердечная раненія относятся къ разряду самыхъ коварныхъ*, полагаться на кажущееся благопріятное теченіе которыхъ никоимъ образомъ невозможно, даже по истечениіи многихъ недѣль послѣ поврежденія: *случаи Пирогова, Theile, Demare, Ewald'a и другихъ.*

2. Такъ какъ *первичный гемостазъ* при ранахъ сердца является *весьма непостоянное и не прочное*, ибо наблюденія доказываютъ, что большая часть раненыхъ гибнетъ отъ вторичныхъ, иногда *весьма опасныхъ* кровотечений, то хирургъ обязанъ стоять на сторожѣ и при первыхъ же признакахъ опасности, безъ колебаній, проникнуть къ сердцу и обеспечить рану его наложеніемъ шва или другимъ способомъ *прекращающаго кровоостанавливанія*.

3. Послѣ кровотеченія *самымъ опаснымъ послѣдствиемъ* при раненіи сердца является—*переполненіе сердечной сорочки кровяными и воспалительными изліяніями*: такъ погибали сотни раненыхъ въ сердце при явленіяхъ асфиксіи и паралича сердца, а между тѣмъ вовсе не трудно при участіи активной хирургической помощи спасти такихъ раненыхъ *своевременнымъ вскрытиемъ сердечной сорочки*, на что современный хирургъ импетъ не только право, но и обязанъ сдѣлать на основаніи: а) *новѣйшихъ топографо-анатомическихъ изслѣдований Delorm'a и Mignot'a* и Войничъ—Синоженцкаго, б) *опытовъ надъ животными: Salomon, Rehn's, Bode* и с) *случаевъ примѣненія активной хирургической помощи: случаи Rehn'a, Parazzani, Williams'a и автора*.

Въ своей интересной брошюрѣ авторъ обращаетъ особое внимание на признаки поврежденія сердца и его оболочекъ и характеръ сердечного кровотеченія, такъ какъ точное знаніе этихъ явленій должно лежать въ основаніи успѣха хирургіи сердца. Изучая теченіе и исходы сердечныхъ поврежденій и лично наблюдая приведенный, крайне рѣдкий случай счастливаго исхода огнестрѣльного раненія сердца, благодаря активному вмѣшательству, авторъ подмѣтилъ здѣсь очень интересное и малоизвѣстное до сего времени явленіе: *влияніе обнаженія сердца на его функции*.

Въ отдѣлѣ о хирургической терапії при раненіяхъ сердца, авторъ даєтъ описание различныхъ способовъ вскрытия около сердечной сорочки, примѣнявшихся при сердечныхъ пораненіяхъ и предлагаетъ свой способъ основанный на топографическихъ данныхъ. Способъ этотъ, обезпечивая наименьшее раненіе плевральныхъ листковъ, въ тоже время допускаетъ весьма широкій доступъ къ раненному сердцу, что составляетъ необходимое условіе для возможности активной хирургической помощи, безъ чего раненные эти обыкновенно обречены на смерть. Авторъ останавливается также и на препятствіяхъ къ примѣненію активной хирургической помощи, приводя рядъ весьма поучительныхъ случаевъ, знаніе которыхъ также необходимо, какъ и знаніе топографіи области сердца. Въ послѣднемъ отдѣлѣ своей статьи авторъ приводить описание очень интереснаго случая раненія сердца, въ которомъ имъ была сдѣлана пластическая торако—и перикардотомія и изслѣдованіе сердца на присутствіе въ стѣнкахъ и полостяхъ его инородного тѣла. Случай этотъ не только представляется уникумъ въ хирургической литературѣ, но и съ физиологической стороны возбуждаетъ большой интересъ относительно дѣятельности сердца при различныхъ его состояніяхъ. Прекрасно составленная исторія болѣзни, снабженная всѣми научными доказательствами, какъ сфигмографическими кривыми, рисунками, фотограммами и изслѣдованіями посредствомъ лучей Рентгена, имѣеть полную силу доказательствъ по вопросу, который до сихъ поръ считается спорнымъ: о жизнеспособности человѣчка съ инороднымъ тѣломъ въ сердце. Изъ приведенной исторіи болѣзни видно, что дѣвочка раненная пулею въ сердце, при приложеніи извѣстнаго хирургического лѣченія выздоровѣла и продолжаетъ жить, несмотря на то, что пуля, какъ показали лучи Рентгена, сидитъ въ одной изъ стѣнокъ сердца. Этотъ необыкновенный случай, послужившій канвою для клинической лекціи о хирургіи сердца съ своей стороны служитъ лучшимъ доказательствомъ того, что авторъ сочиненія талантливый и опытный хирургъ, умѣющій пользоваться новѣйшими научными пріобрѣтеніями. Что же касается самой статьи, то живое изложеніе и прекрасный, обстоятельный разборъ совершенно новаго въ литературѣ вопроса, въ которомъ благодаря умѣлой оцѣнкѣ фактовъ и анализу уже описанныхъ, но не освѣщенныхъ съ этой стороны явленій, мы пріобрѣтаемъ совершенно новую точку зренія на раны сердца и ихъ лѣченіе.

Рецензія проф. А. И. Дудукарова сочиненій, помѣщенныхъ подъ №№ 41 и 42.

Проф. А. Г. Подрезъ. Статья „Новый простой способъ наложенія соустія въ кишечно-желудочномъ каналѣ“ напечатана въ 1898 году на

9 страницахъ съ приложениемъ 4 фотографий. То же на немецкомъ языке.

Потребность въ образованіи искусственныхъ сообщеній въ различныхъ отдѣлахъ желудочно-кишечного тракта стала почти повседневной и настолько, что каждый занимающійся хирургіею врачъ обязанъ производить эту операцию, подобно тому, какъ онъ обязанъ дѣлать геміотомію и грыжесложеніе. Между тѣмъ, несмотря на высокое развитие современной хирургической техники и множества способовъ наложения желудочно-кишечного соустія, техника этой операции настолько сложна и продолжительна, что требуетъ отъ оператора большого опыта, времени и все таки даетъ такой же большой процентъ смертности, и болѣе сложная резекція выхода желудка—pylorectomia. Естественно, что при такихъ условіяхъ за наложеніе желудочно-кишечного анастомоза можетъ взяться только заправскій хирургъ и потому сфера его останется ограниченной небольшимъ кругомъ крупныхъ научныхъ и больничныхъ центровъ. Исходя изъ этихъ данныхъ, авторъ рѣшился упростить эту операцию настолько, чтобы она была легче по выполнению и могла быть произведена въ самое короткое время и даже подъ ингаиновымъ наркозомъ, если больной такъ слабъ, что общая анестезія является для него опасной. Предложенный недавно авторомъ способъ основанъ на извѣстномъ физиологическомъ явленіи, что если сквозь всю толщу желудка или кишкы сдѣлать сквозной шовъ, то этотъ шовъ неизбѣжно послужитъ поводомъ къ образованію сквознаго свища на мѣстѣ этого прокола. Для выполненія своего анастомоза авторъ приводить къ соприкосновеніе нижнюю стѣнку дна желудка съ одной изъ первыхъ петель тощей или подвздошной кишкы надъ или подъ поперечной ободочной кишкой и спиваетъ ихъ двумя перекрещивающимися сквозными, т. е. проникающими сквозь всю толщину обоихъ органовъ швами; если теперь эти швы сильно затянуть, до защемленія пристыжихъ частей, то къ явленіямъ физиологическимъ присоединяются химическая отъ защемленія и тогда на всемъ протяженіи сдавливаются швомъ, т. е. на пространствѣ около двухъ сантиметровъ и болѣе, смотря по желанію, произойдетъ сообщеніе между этими двумя органами. Потребное время для образованія такого свища, какъ оказалось по опытамъ на собакахъ (9 опытовъ), въ среднемъ равняется 3—4 днямъ, а потому авторъ совѣтуетъ накладывать этотъ свищъ на 2—4 дня раньше, чѣмъ по другимъ способамъ. Авторъ примѣнилъ способъ этого для наложенія желудочно-кишечного анастомоза у двухъ больныхъ. Исторія одного изъ нихъ приведена (больной умеръ) и къ ней приложенъ фотографический снимокъ анастомоза со стороны желудка и кишекъ. Кроме

того въ статьѣ этой находятся и фотографмы препаратовъ, какъ резуль-таты, полученные въ опытахъ на собакахъ. Объ этомъ способѣ можно сказать, что онъ отмѣчается оригинальностью идеи, вѣроятной, сравни-тельно, легкостью и безопасностью техники, такъ какъ сообщаемые адѣсь органы даже не вскрываются и теоретически онъ долженъ вполнѣ соотвѣтствовать цѣлямъ автора.

Рецензія проф. А. И. Дудукарова сочиненій, помѣщенныхъ подъ №№ 43 и 44.

Проф. А. Г. Подрезъ. Статья „*O соединеніи мочеточника съ мочевымъ пузыремъ*“ напечатана въ 1898 году на 19 страницахъ. То же на немецкомъ языке.

Раненія мочеточниковъ не рѣдко встрѣчается въ гинекологической практикѣ, особенно съ тѣхъ поръ, какъ стали оперировать со стороны влагалища. Раненіе это не рѣдко влечетъ за собой образованіе мочевого свища, устранить который не легко. При этомъ надо замѣтить, что большинство операционныхъ пріемовъ назначено для устраненія внѣшнихъ неудобствъ и потому они получаютъ значеніе чисто косметическое. Разобравъ всѣ эти способы авторъ останавливается на недавно предложенномъ способѣ Баци, известномъ подъ названіемъ hetero-cysto-neostomia, т. е. чрезбрюшинный способъ соединенія, который, какъ справедливо замѣчаетъ авторъ, больше всѣхъ другихъ имѣетъ цѣлью возстановить физиологическое соотношеніе частей. Не смотря на то, что эта операдія представляетъ огромныя техническія трудности и что въ литературѣ извѣстны 5—6 случаевъ ея примѣненія, авторъ въ представившемся случаѣ оперировалъ подражая этому способу. Онъ описалъ технику производства операдіи какъ она была выработана Баци, Новаромъ, Пости; онъ излагаетъ свою операдію, которая въ виду особенности его случая, въ нѣсколькихъ моментахъ отличается отъ техники его названныхъ выше предшественниковъ. На сколько помню, эта его операдія была первая въ Россіи. Случай этотъ еще разъ доказываетъ, на сколько авторъ слѣдитъ за литературой и въ этой області владѣеть недюжинной техникой, такъ какъ его больная не только выздоровѣла, но и получила возстановленіе физиологическаго отношенія и функции, которая была утрачена. Какъ всѣ сочиненія его, такъ и это изложено ясно, чрезъ что легко усваивается основная мысль автора.

Рецензія проф. М. А. Попова сочиненія, помѣщенаго подъ № 45.

Радикальное грыжеſтьченіе Кохера при подвижныхъ и ущемленныхъ грыжахъ, 36 случаевъ. Проф. А. Г. Подрезъ. Изъ госпитальной хирургической клиники Харьковского университета. Оттискъ изъ журнала „Медицинское Обозрѣніе“ за 1898 г. въ 26 стр.

Радикальное грыжесъчение представляетъ одну изъ новѣйшихъ въ то же время, одну изъ интереснѣйшихъ въ анатомическомъ отношеніи операций, такъ какъ въ основѣ каждого метода положенъ или другой анатомической принципъ. Въ своей интересной клинической работе авторъ сопоставляетъ два, наиболѣе распространенные въ практикѣ, метода: Бассини и Кохера и останавливается на послѣднемъ потому, что онъ, при такой же безопасности и вѣрности результатовъ, какъ и способъ Бассини, способенъ къ дальнѣйшему совершенствованію. Работа эта состоитъ изъ двухъ отдѣловъ: въ первомъ, послѣ предварительного разбора достоинствъ обоихъ способовъ, авторъ даетъ подробное описание техники производства операций по всѣмъ тремъ доизмѣненіямъ Кохера, иллюстрируетъ ихъ рисунками въ текстѣ, тѣмъ описываетъ новую модификацію, предложеннную недавно д-ромъ Тиле, и говоритъ, что несмотря на всѣ эти усовершенствованія методъ, все же онъ не можетъ быть распространенъ на всѣ виды и уклоненія паховой грыжи, какъ это было бы желательно, и чтобы сдѣлать пригоднымъ для этихъ цѣлей, необходимо сдѣлать еще дополненія и измѣненія, каковыя авторъ и предлагаетъ, такъ какъ онъ уже испыталъ у себя въ клиникѣ на многихъ случаяхъ, исторіи болѣзни которыхъ приведены въ концѣ этой же статьи. Измѣненія и дополненія къ методу Кохера, выработанныя самимъ авторомъ, касаются трехъ родовъ грыжъ.

1—*Ущемленныхъ*, при операциіи которыхъ авторъ разсѣкаетъ переднюю стѣнку пахового канала, удаляетъ прочь всѣ грыжевой мѣшокъ, справедливо считая его присутствіе опаснымъ въ смыслѣ инфекціи и пересаживаетъ *новообразованную* имъ же изъ брюшины ножку грыжеваго мѣшка въ толщу брюшной стѣнки.

2—*Врожденныхъ* грыжъ, где авторъ поступаетъ совершенно иначе, чѣмъ Кохерь и другіе; онъ не пользуется частью грыжеваго мѣшка для пересадки, ибо при такомъ пріемѣ нарушается неизбѣжно целостность оболочекъ яичка, такъ какъ грыжа и яичко въ этихъ случаяхъ имѣютъ общія оболочки, а образуетъ новую ножку, отслаивая брюшную вокругъ пахового кольца.

и 3,—самое интересное нововведеніе автора, касается *застарѣвшихъ*, очень большихъ грыжъ, въ которыхъ стѣнки и топографія на столѣтіи измѣнились, что онъ скрѣе напоминаютъ грыжу бѣлой линіи, чѣмъ паховую. Въ этихъ случаяхъ, если пріемъ, предлагаемый авторомъ, окажется также практическимъ, какъ онъ правиленъ съ анатомической точки зренія, то автора можно поздравить съ большими успѣхами, благодаря которому хирургія, почти безсильная въ подобныхъ случаяхъ,

получаетъ возможность управляться и съ этими тяжелыми случаями. Идея автора заключается въ томъ, чтобы путемъ передвиженія части aponeurosis musc. obliqui abdominis externi, составляющаго переднюю стѣнку паховаго канала, устроить дупликатуру изъ слоевъ этого апоневроза; чрезъ что усиливается эта, самая слабая часть паховаго канала и облитерируется самый каналъ. Всѣ эти измѣненія авторъ примѣнялъ на практикѣ почти въ половинѣ изъ своихъ 36 случаевъ, краткое описание и разборъ которыхъ представленъ во второй части его статьи.

Изъ приведенного краткаго реферата статьи проф. Подреза видно: 1.—что авторъ проявляетъ обширную хирургическую клиническую дѣятельность, ибо матеріалъ въ 36 случаяхъ радикального грыжесѣченія по одному только методу Кохера составляетъ весьма солидный трудъ, на сколько мнѣ известно, впервые опубликованный въ Россіи и, кстати замѣчу, вышедшій изъ клиники нашего университета. 2.—Сочиненіе это обнаруживаетъ въ авторѣ хорошую оперативную технику и большой хирургической опытъ, такъ какъ изъ 36 случаевъ весьма серьезной операциі, между которыми около половины были тяжкіе случаи, не было ни одного дурнаго исхода. 3.—Въ сочиненіи этомъ обнаружены авторомъ самостоятельность во взглядахъ и большая доля научной иниціативы, такъ какъ ему удалось ввести существенные измѣненія въ методѣ, надъ разработкою котораго трудились выдающіеся хирурги Запада. И, наконецъ, 4—здѣсь же авторъ выказалъ не только хорошую подготовку по анатоміи и знанію предѣла тѣхъ анатомическихъ измѣненій, которая можно допустить въ оперативной техникѣ безъ ущерба для организма, но и умѣніе эксплуатировать анатомическія особенности области въ интересахъ извѣстной идеи, что несомнѣнно доказывается, что въ авторѣ этой статьи мы имѣемъ не только хорошаго хирурга практика, но и мыслителя хирурга, знающаго анатомію.

О рецензируемой статьѣ проф. Подреза въ журналѣ „Русскій Медицинскій Вѣстникъ“ за 1899 годъ, № 1-й, помѣщенъ очень лестный отзывъ въ отдѣлѣ „Критика и библіографія“.

Рецензія проф. А. И. Дудукалова сочиненія, помѣченного подъ № 46.

Проф. А. Г. Подрезъ. Отчеты его о дѣятельности въ хирургической госпитальной клинике при Харьковской Александровской больнице за 1895, 96 и 97 годы напечатаны на 38 страницахъ въ общихъ отчетахъ о состояніи и дѣятельности Императорскаго Харьковскаго университета, изъ которыхъ слѣдуетъ заключить, что авторъ имѣлъ возможность ежегодно клинически прослѣдить отъ 503—682 больныхъ и произвести не меньшее количество различнѣйшихъ операций. При этомъ надо отмѣтить, что почти во всѣхъ случаяхъ получилъ ожида-

мый успешный результатъ. О нѣкоторыхъ случаяхъ авторъ говорилъ подробнѣе и также логически ясно толкуетъ о нихъ, какъ и во всѣхъ другихъ его сочиненіяхъ, о которыхъ я уже (см. выше) сдѣлалъ доказательства.

Въ засѣданіяхъ факультета 3-го и 11-го мая 1899 года заслушаны былъ отчетъ комиссіи по разбору сочиненій кандидатовъ и кроме того два отдѣльныхъ мнѣнія гг. членовъ комиссіи В. П. Крылова и М. А. Попова, которыя заключали въ себѣ квалификацію гг. претендентовъ на каѳедру хирургической факультетской клиники.

Не приводя здѣсь подробнѣе мнѣніе проф. Крылова, я останавливаюсь лишь на его заключеніи. Всѣ 13 кандидатовъ имѣ раздѣлены на три группы, причемъ въ первую группу, онъ, на основаніи предложенныхъ имѣ соображеній, отнесъ какъ наиболѣшихъ четырехъ кандидатовъ: Кадера, Подреза, Таубера и Салищева.

Проф. М. А. Поповъ представилъ слѣдующее мнѣніе¹⁾:

„Весною прошлаго 1898 года, вслѣдствіе распоряженія его высокопревосходительства г-на министра народнаго просвѣщенія, Харьковскимъ медицинскимъ факультетомъ былъ объявленъ конкурсъ на занятіе вакантной каѳедры факультетской хирургической клиники. Харьковскій университетъ былъ такъ счастливъ, что ко времени срока оконченія конкурса явилось 13 претендентовъ на каѳедру, изъ которыхъ 6 профессоровъ хирургіи (Подрезъ, Орловъ, Тауберъ, Салищевъ, Введенскій, Павловскій), 5 приватъ доцентовъ хирургіи (Кузнецова, Кадеръ, Волковичъ, Щеголевъ, Цейдлеръ) и 2 доктора медицины—специалисты хирургіи (Сабанѣевъ и Красновъ).

Для болѣе правильной оцѣнки достоинствъ каждого изъ кандидатовъ медицинскій факультетъ въ засѣданіи 16-го ноября 1898 года составилъ предварительно комиссію для разбора и рецензіи ученыхъ трудовъ аспирантовъ. Комиссія въ настоящее время успѣла закончить этотъ тяжелый трудъ и представила свой отчетъ въ медицинскій факультетъ. Одновременно съ этимъ я осмѣливаюсь потому-же самому дѣлу представить личныя мои соображенія, основанныя исключительно на результатахъ работы той же самой комиссіи.

Прежде, чѣмъ перейдти къ частному разсмотрѣнію отзывовъ о кандидатахъ, я хотѣлъ бы, хотя вкратцѣ, сказать о томъ, чemu, главнымъ образомъ, долженъ удовлетворять замѣститель вакантной каѳедры факультетской хирургической клиники при современномъ состояніи науки.

¹⁾ Изъ этого мнѣнія будетъ приведено только то, что касается Проф. А. Г. Подреза; о другихъ-же кандидатахъ, какъ неимѣющихъ отношенія къ этой біографіи, несказано будетъ ни слова. Авт.

(Продолженіе слѣдуетъ).