

корадки значительны, или отверстіе нарыва здѣлается фистулознымъ, (что можетъ зависѣть отъ внутренней причины, отъ костоѣды поясничныхъ позвонковъ, или отолѣтія стѣнъ наривной полости), то силы больнаго надлежитъ сколько возможно поддерживать крѣпительными средствами (№ 9. 47. 71. 96.) и приличною дѣтою, стараясь также противудѣйствовать общей причинѣ, если она можетъ быть открыта.

ГЛАВА ОСЬМАЯ.

ВОСПАЛЕНИЯ ЖЕЛѢЗИСТЫХЪ ОРГАНОВЪ.

(*Adenitides*).

§ 303.

Желѣзы (*glandulae, adœves*), въ общириномъ значеніи слова, суть мягкие кругловатые органы, кои состоятъ изъ особенной ткани, съ значительнымъ числомъ сосудовъ и первовъ и въ коихъ либо притекаемые соки претерпѣваютъ только перемѣну смѣшанія, либо отдѣляются собственнаго рода жидкость изъ крови. Отдѣленіе въ желѣзахъ совершается дѣйствиемъ органической силы и не можетъ быть объяснено ни чисто механическимъ, ни химическимъ актомъ. Желѣзы, при безпрестанномъ вліяніи первовъ, отвлекаютъ отъ крови известныя состав-

ныхъ части, измѣнила ихъ по формѣ своего устройства и по своимъ жизненнымъ качествамъ собственнымъ образомъ въ ихъ смѣшениіи и составѣ. Всѣ желѣзы имѣютъ большое число кровеносныхъ и лимфатическихъ сосудовъ, кои раздѣляются на весьма многія вѣти и представляютъ тончайшія сѣточки. Поелику отъ различнаго расположенія сосудовъ кровь проводится скорѣе или медленнѣе къ тѣмъ частямъ, кои изъ опої должны получать извѣстныя составные части, то въ нѣкоторыхъ желѣзахъ артеріи расположены лучеобразно, пучкообразно или звѣздообразно, а въ другихъ извиваются всически. Количество первовъ въ желѣзахъ въ отношеніи къ сосудамъ гораздо меньшее, а потому онѣ имѣютъ вообще малую чувствительность и поврежденіямъ противудѣйствуютъ слабо. Напротивъ того иначе бываетъ съ влияниемъ общей дѣятельности первовъ на отправление желѣзъ, ибо какъ отдаленныя раздраженія, такъ и душевныя возмущенія оказываютъ иногда могущественное влияніе на количество и качество отдѣляемаго въ нихъ сока.

§ 304.

Желѣзы раздѣляются на два главныхъ рода: а.) *на совершенныя* и б.) *несовершенныя*. Первымъ называются тѣ, кои снабжены испразнительными протоками, посредствомъ коихъ приготовляемая въ желѣзахъ жидкость испражняется; а вторыя суть тѣ, кои неимѣютъ таковыхъ протоковъ и въ коихъ соки претерпѣваютъ, по видимому, только особенное измѣненіе смѣшения.

I. Совершенныя желѣзы бывають:

1.) *Простыя* (*glandulae simplices, cryptae, folliculi*), состоящія изъ маленькихъ углубленій, полостей или перепончатыхъ мѣшечковъ, снабженныхъ либо однимъ только отверстиемъ, либо испразнительнымъ ходомъ, открывающимся въ слизистыя оболочки или на поверхность кожи, какъ напр. *folliculi mucosi, gland. sebaceæ, gland. Meibomianæ, gl. ceruminosæ.*

2.) *Скопленныя желѣзы* (*gl. congregatae*), состоящія изъ нѣсколькихъ простыхъ желѣзокъ, соединенныхъ между собою посредствомъ клѣтчатой пlevы, изъ коихъ каждая имѣеть свое особенное устье, к. напр. *gl. Peyennæ, s. agminatae, tonsillæ s. amygdalæ.*

3.) *Сложныя желѣзы* (*gland. conglomeratae*), составленныя изъ явственныхъ кусковъ, соединенныхъ клѣтчatoю плевою и раздѣляющихся опять на маленькие ку-
сочки, пока иаконецъ самые малѣйшіе изъ нихъ будуть обнаруживаться въ видѣ зернушекъ (*acini*). Сіи желѣ-
зистыя зернушки, состоять изъ тончайшихъ вѣтвей ар-
терій и венъ, образующихъ чрезъ свои переплетенія
трубочки, отъ коихъ происходятъ испразнительные ка-
налы (*ductus excretorii*). Ко таковымъ желѣзамъ принад-
лежать: *gl. lacrymales, salivales, gl. parotis, submaxillaris,*
sublingualis, mammae, pancreas, gl. Cowperianæ.

4.) *Желѣзистыя внутренности* (*viscera*) состав-
ляютъ только подраздѣление сложныхъ желѣзъ, съ тою
разностію, что онѣ не столь явственно раздѣляются на
кусочки, окружены особыннымъ серознымъ покровомъ и
испразнительные ихъ протоки открываются иногда въ
особенныя содержалища к. напр. въ яичкахъ, печени

и почкахъ. Сюда же можно отнести и предстательную желѣзу (gl. prostatæ).

II. Несовершенныя желѣзы бываютъ:

1. *Кровеносно-сосудистыя*, отличающіяся весьма значительнымъ количествомъ кровеносныхъ сосудовъ; кроме того они состоять изъ лимфатическихъ сосудовъ и клѣтчатой плевы и неимѣютъ испразнительныхъ протоковъ. Сюда принадлежатъ gl. thyroidea, gl. suprarenalis, et lien.

2. *Лимфатическія желѣзы* (gl. conglobatae) представляютъ продолговато-круглые, большую частью ровные тѣла, имѣющія красноватый видъ и состоящія изъ сплетенныхъ и различно извитыхъ всасывающихъ сосудовъ, но кроме того содержащихъ значительныя артерии и вены. Что касается до нервовъ, то доселѣ неизвестно, действительно ли проходящіе чрезъ нихъ нервы удѣляютъ имъ свои вѣточки; — известно по крайней мѣре, что чувствительность лимфатическихъ желѣзъ оказывается только въ весьма низкой степени. Къ симъ желѣзамъ относятся gl. inguinales, subaxillares etc.

§ 305.

По такому различному устройству и содержанию жизнедѣятельности желѣзъ, произрахдающіяся въ нихъ воспаленія имѣютъ неодинаковыя свойства. Сложныя желѣзы, значительно изобилуя кровью и большими стволами кровеносныхъ сосудовъ, могутъ удобиѣ воспаляться и воспаленіе ихъ въ скоромъ времени достигаетъ высочайшей степени. Напротивъ того лимфатическія

желѣзы, по скучному содержанію кровеносныхъ сосудовъ и первовъ, чаще подвергаются хроническому, малоболящему воспаленію и нагноенію. Важнѣйшее вліяніе на свойство воспаленія желѣзъ оказываютъ также различныя вѣтшия и внутреннія причины, по коимъ оно имѣеть слѣдующія разности.

а) *Ревматическое или простудное воспаление желѣзъ* (*adenitis rheumatica*) въ большей части случается имѣеть острое теченіе, рождается послѣ предшествовавшей простуды и поражаетъ наичаще шейныя и паховыя желѣзы. Рѣдко оно оказывается хроническимъ, а если это случается, то причиною сему бываетъ ревматическое худосочіе, или запущеніе болѣзни.

б) *Золотушное воспаление желѣзъ* (*adenitis scrophulosa*) случается наичаще, поражаетъ преимущественно брижечныя и шейныя желѣзы, хотя впрочемъ нещадитъ никакого желѣзистаго состава. Оно имѣеть обыкновенно весьма медленное теченіе и оканчивается удобною нагноеніемъ, либо поглощениемъ и отвердѣніемъ вмѣстѣ.

с) *Венерическое воспаление желѣзъ* (*adenitis syphilistica*) поражаетъ чаще всего паховыя желѣзы (*bubo venereus*) и обнаруживается какъ обыкновенная форма местной венерической болѣзни.

д) *Переносное воспаление желѣзъ* (*adenitis metastatica*) встречается весьма часто и поражаетъ наичаще околоушныя и паховыя, рѣже подмышковыя желѣзы. Часто образуется оно довольно скоро, иногда соединено бываетъ съ значительной опухолью и рожевымъ воспаленіемъ кожи и переходитъ обыкновенно въ нагноеніе.

Въ чумѣ, скарлатинѣ, кори, оспѣ и тифѣ оно бываетъ нерѣдкимъ явленіемъ.

е) *Раковидное воспаление желѣзъ* случается при скиррѣ и ракѣ, сопряжено съ упорнымъ язвеннымъ нагноеніемъ, хращеобразнымъ отвердѣніемъ краевъ язвы и губчатыми наростами.

Слѣдя означеному въ § 303 раздѣленію желѣзъ мы расположимъ и самыя воспаленія сихъ органовъ на пять главныхъ отдѣловъ к. т. на:

- 1.) Воспаленія скопленныхъ желѣзъ,
 - 2.) — — — сложныхъ желѣзъ.
 - 3.) — — — желѣзистыхъ внутренностей,
 - 4.) — — — кровеносносудистыхъ желѣзъ,
 - 5.) — — — лимфатическихъ желѣзъ.
-

A.) *Воспаленія скопленныхъ желѣзъ.*

Воспаленіе миндалеобразныхъ желѣзъ.

(*Tonsillitis*).

Syn. Angina s. cynanche tonsillaris, amygdalitis, antiphritis, paristhmitis; воспалительная жаба.

§ 306.

Явленія. Болѣе или менѣе сильная боль, распространяющаяся кнаружи, особенно къ уху и усиливающаяся во время глотанія. По раскрытии рта, въ поло-

сти зѣва можно видѣть, что покраснѣвшія болѣе обыкновенного миндалеобразныя желѣзы (одна или обѣ) распухаютъ иногда до такой степени, что вытѣсняютъ къ переди язычекъ (*uvula*) и приходятъ между собою въ соприкосновеніе. Снаружи на шеѣ и подъ угломъ нижней челюсти часто ощущается также небольшая опухоль, оказывающая при дотрогиваніи боль. По мѣрѣ большей или меньшей внутренней распухлости глотаніе болѣе или менѣе затрудняется, причиняетъ боль, или совершенно воспіращается, голосъ измѣняется, а произношеніе словъ дѣлается неестественнѣмъ, гнусливымъ. Если воспалены однѣ миндалеобразныя желѣзы, то и при большой распухлости оныхъ, горячка бываетъ незначительная. Впрочемъ явленія сей болѣзни, смотря по тому, воспринимаетъ ли она острую или хроническую форму, весьма разнствуютъ между собою.

1.) *Острое воспаленіе* сего рода рѣдко ограничивается одними желѣзами, но поражаетъ въ тоже время и другіе органы зѣва, особенно нѣбную занавѣску (*ang. palatina, isthmus*) язычекъ (*uvulitis*), и верхнюю часть глотки (*pharyngitis*). Въ такомъ случаѣ, по раскрытии рта, можно видѣть значительную распухлость, отъ коей входъ въ полость зѣва совершенно почти затворенъ, распухшія части сильно болятъ, представляются темнокрасными, совершенно сухими, либо покрытыми бѣлою, вязкою, гноеобразною слизью. При всякомъ движениѣ, напаче при глотаніи боли чрезмѣрно умножаются, глотаніе сперва затрудняется, а потомъ дѣлается совершенно невозможнымъ, голосъ бываетъ охриплый, дыханіе воспіращается до удушенія; соразмѣрно степени и силѣ воспа-

ления рождается болѣе или менѣе сильная горячка и значительный скопленія крови въ головѣ, при чемъ лицо представляется раздутымъ, синимъ или краснымъ, глаза выпученными, красными, обнаруживается сильная головная боль съ беспокойствомъ, бредомъ и пр. (*angina inflammatoria*). Если въ тоже время воспаленіе распространяется на Евстаѳиеву трубу, то въ ушахъ рождаются боли, наипаче при глотаніи, дѣлается звонъ и шумъ въ оныхъ и слухъ затрудняется (*angina catarrhalis*).

2.) Напротивъ того, когда болѣзнь сія воспринимаетъ хроническую форму, то переходитъ въ продолжительную распухлость, которая дѣлается твердою, хрящообразною, восплющаетъ слегка глотаніе, содѣливается произношеніе словъ гнусливыми, либо измѣняетъ оное такъ, что иѣкоторыя литеры неизвестенно выражаются. При семъ дыханіе, хотя мало затрудняется, но отличается сипящимъ, хрипищимъ тономъ, который усиливается наипаче во время сна. Въ воспаленныхъ такимъ образомъ и сильно распухшихъ миндалеобразныхъ желѣзахъ, произраждаются временно небольшіе парывы, изъ конкъ испражняется густая гноеобразная, часто зловонная, творогу подобная, бѣловато-желтая масса. Послѣ сего остается небольшое углубленіе и миндалеобразная же лѣза получаетъ неровную поверхность. Таковое состояніе зависитъ преимущественно отъ золотухи; впрочемъ оно случается не только у дѣтей, но и у взрослыхъ.

§ 307.

Исходы. Воспаленіе сія въ большей части случаевъ разрѣшается, перѣдко также *переходитъ въ парывы*,

(*angina suppuratoria*), образующейся либо въ самыхъ миндалеобразныхъ желѣзахъ, либо въ клѣтчатой плевѣ смежныхъ органовъ. Исходъ сей можно предполагать тамъ, гдѣ воспаленіе очень значительное и продолжается не сколько дней съ равнouю силою, гдѣ имѣется къ тому особенная наклонность и гдѣ ощущеніе давленія въ горлѣ безпрестанно увеличивается.

Изъязвленіе при остромъ воспаленіи рѣдко случается и при томъ тогда только, когда причиною онаго бываетъ венерическая болѣзнь или золотуха (*angina ulcerosa*).

Переходъ въ *антоновъ огонь* (*angina gangraenosa*) всегда зависитъ отъ злокачественного свойства горячки, к. т. скарлатинной, первой и гнилой.

Отвердѣніе миндалеобразныхъ желѣзъ (*angina scirrhosa*) никогда незамѣчается при сильномъ воспаленіи, имѣющемъ острое теченіе, а только въ то время, когда оно медленно протекаетъ и часто возвращается, да и въ семь случаѣ раздается болѣе разрастаніе миндалеобразныхъ желѣзъ, нежели дѣйствительное отвердѣніе.

§ 308.

Причины. Наибольшее расположение къ сему воспаленію имѣютъ дѣти и молодые люди, также нѣжныя и чувствительныя особы, отвыкшія отъ влиянія холоднаго воздуха и атмосферныхъ измѣненій, преимущественно золотушныя и такія, кои прежде были одержимы сильнымъ воспаленіемъ довольно часто.

Изъ слугайныхъ причинъ частѣйшая суть: простуда, дѣйствующая прямо на шею, всякое сильное раздра-

женіе зѣва, механическія поврежденія, случающіяся отъ костяныхъ отломковъ, рыбьихъ костей, нечаянно проглатываемыхъ иголокъ; наружныя раненія шеи, частая и сильная рвота, или вкладываніе пальцевъ въ полость зѣва для произведенія рвоты, неумѣренное употребленіе ртути. Сверхъ сего болѣзнь сія приключается иногда отъ переноса другихъ страданій, отъ венерической болѣзни, накожныхъ сыпей и часто состоить въ причинной связи съ ломотою, рожею, завалами въ брюхѣ и пр.

§ 309.

Предсказание въ сей болѣзни бываетъ различное. Она оказывается иногда въ довольно слабой степени и неугрожаетъ никакою опасностию, особенно если не распространяется на близлежащія части и не зависитъ отъ какого либо худосочія. Вообще, чѣмъ меньше опухоль и обятность воспаленія, чѣмъ свободнѣе дыханіе, чѣмъ менѣе прилива крови къ головѣ и чѣмъ слабѣе горячка, тѣмъ безопаснѣе. Напротивъ того при очень усилившейся болѣзни, при чрезмѣрной распухлости же-лѣзъ и скоплениіи крови въ головѣ могутъ быть смертельныя послѣдствія отъ удушенія, либо отъ пострѣла. Хроническое воспаленіе хотя и безопасно, но дѣлаетъ частые возвраты и склонно къ дурнымъ исходамъ.

§ 310.

При *лѣченіи* сперва надлежитъ обратить вниманіе:
а) на *причины воспаленія*: удалить всѣ механическія

или местные раздражения, противодействовать первоначальной болезни напр. венерической, золотушной и пр. предохранять страждащую части отъ всякаго напряженія и б) потомъ пользовать воспаленіе *сообразно силы и свойству его.*

1.) *Слабое воспаление*, особливо если къ оному имѣется привычное расположеніе, равнымъ образомъ хроническое, или золотушное уничтожаются иногда въ самомъ началѣ рвотными средствами, держаніемъ во рту кусочка квасцовъ или медленнымъ проглатываніемъ порошка квасцовъ, смѣшиваемыхъ по поламъ съ сахаромъ, напр. по скрупулу въ продолженіи 4 часовъ (*Reil*). Однакожъ таковыя средства могутъ быть назначаемы при самомъ только происхожденіи воспаленія, когда оно еще не совершенно образовалось. Въ противномъ случаѣ лучше предписывать внутрь въ малыхъ учащенныхъ приемахъ уксусокислый жидкій амміакъ съ нашатыремъ (N 108.110.). Вообще здѣсь прилично потогонительное содержаніе, употребленіе теплого настоя сухой малины, бузиновыхъ и липовыхъ цветковъ, выполнаскиваніе горла настоемъ шалфея съ медомъ и нашатыремъ, либо квасцовою сывороткою, втирание летучей мази на шеѣ и окунываніе оной фланелью.

2.) *Если же воспаленіе очень сильное, сопряженное съ значительною горячкою и воспалительною опухолью, которая, распространяясь на смежныя части, очень затрудняетъ глотаніе и дыханіе и причиняетъ напоръ крови къ головѣ, то необходимо нужны:*

а.) *Кровопусканіе изъ руки, а послѣ онаго припуженіе пьявокъ къ подбородку, или позади угла нижней-*

челюсти. При чрезмѣрной опухоли желѣзъ, угрожающей опасностю удушенія, величайшую пользу доставляютъ насѣчки, производимыя на желѣзахъ нѣбнымъ ланцетомъ, фаринготомомъ или обыкновеннымъ bistуреемъ, коего острѣе покрывается липкимъ пластыремъ. Кровотеченіе надлежитъ поддерживать теплою водою или парами до тѣхъ поръ, пока опухоль уменшится и дыханіе облегчено будетъ.

b.) *Внутреннія противувоспалительныя средства*, наипаче среднія соли, соединяемыя съ слизистыми веществами к. т. селитра въ эмульсіяхъ (N. 63), сѣрнокислый поташъ, сода или магнезія (N. 20), даваемыя въ отварѣ алтейного корня съ приличнымъ сиропомъ. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ доставляется пользу и услащенная ртуть, впрочемъ ее надо био предписывать такъ, чтобы она непроизводила слюнотеченія, а только послабленіе на низъ, — слѣдственно рѣже, но въ большихъ приемахъ.

c.) *Мѣстно* надлежитъ дѣйствовать на воспаленные части смягчающими, овлажающими и разслабляющими веществами въ формѣ вѣрыскованій, полосканий и мягчительныхъ паровъ. Вѣрыскивания и теплые смягчающіе пары, вдыхаемые больнымъ, лучше дѣйствуютъ потому, что неприводятъ въ такое напряженіе больныхъ частей, какъ полосканья. Спаружи на шеѣпотребляются сухіе мѣшечки изъ ароматныхъ травъ, либо теплые смягчающія припарки. Впрочемъ чѣмъ сильнѣе воспаленіе, тѣмъ большая нужна осторожность въ семъ отношеніи, покрайней мѣрѣ въ началѣ. Въ такомъ разѣ, повидимому, гораздо полезнѣе содержать шею непокры-

тою. Когда воспаление уже уменьшилось, а остается еще опухоль, то въ полосканияхъ употребляются разрышающія и стягивающія средства, чрезъ что отвращается наклонность къ хроническому распуханію частей, какъ напр.: нашатырь, разводимый въ шалфейномъ отварѣ съ прибавленіемъ уксусокислого амміака и меда.

5.) При такомъ лѣченіи должно сверхъ того обращать вниманіе на исходы воспаленія:

а.) Если въ миндалеобразныхъ желѣзахъ образуется нарыва, что можно узнать изъ выделенія жидкости, опущаемаго по приложenіи пальца къ желѣзамъ, а часто и изъ просвѣчиванія самаго гноя, и если отъ употребленія смѣгчающихъ полосканий нарывъ таковой самъ собою непрорывается, между тѣмъ предстоитъ большая опасность удушенія или погруженія гноя въ глубже лежащія части, то онъ вскрывается обвернутымъ бистуреемъ или Фаринготомомъ. Часто уже одни раздраженія зѣва, напряженія къ рвотѣ производятъ вскрытие онаго. По испражненіи гноя, можно продолжать употребленіе смѣгчающихъ полосканий съ медомъ, чрезъ что излѣченіе всегда ускоряется. Въ рѣдкихъ случаяхъ нарывъ протеснится подъ челюстью къ наружѣ, где въ то время надлежитъ поступать съ нимъ по обыкновеннымъ правиламъ пользованія наривовъ (§ 53—58.).

б.) При переходѣ воспаленія сего въ антоновъ огонь нужно обращать вниманіе на горячку и пользовать оную сообразно ея характеру. Мѣстное лѣченіе здѣсь состоить въ томъ, чтобы помертвѣлые части и дурную язвенную матерію удалить изъ горла посредствомъ впрыскиваній deco. cinchonae, scordii, ratanhiae cum alumine, spir. cam-

phlogato (N 80, 81.) etc. Большую пользу доставляет также acidum muriaticum cum melle, если антоновоогненные места намазываются сею смесью помощию корнейной кисточки.

c.) *Отвердѣнія* миндалеобразныхъ желѣзъ, остающіяся послѣ такового воспаленія, бываютъ доброкачественны, мало причиняютъ болѣй и никогда не переходятъ въ ракъ, но часто подвергаются новымъ воспалительнымъ припадкамъ. Разрѣшеніе оныхъ можно испытывать посредствомъ полосканий горла, или намазываній кисточкою, составляемыхъ ex conio maculato, belladonna, muriate ammoniae, succo chelidonii cum melle rosato (*Chelius*) etc. Иногда дѣйствуютъ хорошо и отводящія средства при повторяемыхъ насѣчкахъ и частомъ пропускании пьявокъ. Когда въ отвердѣніи произраждается воспаленіе, то нужно стараться споспѣшствовать надлежащимъ образомъ нагноенію и откладывать вскрытие нарыва дотолѣ, пока вся твердость размягчится. Буде опухоль отвердѣлыхъ миндалеобразныхъ желѣзъ столь велика, что весьма затрудняетъ дыханіе и глотаніе, то необходимо частное изсѣченіе оной (exstirratio partialis). Кровотеченіе послѣ сей операциіи останавливается обыкновенно частымъ выполаскиваніемъ горла холодною водою и уксусомъ. Въ крайней необходимости употребляется для сего раскаленное желѣзо. Во время воспаленія и нагноенія срѣзанной поверхности назначаются полосканья съ бурою. Если на гноящейся поверхности примѣтно будетъ дикое мясо, то надлежитъ предписывать сильнѣе стягивающія средства, даже адскій камень и раскаленное желѣзо.

В.) ВОСПАЛЕНИЯ СЛОЖНЫХЪ ЖЕЛЪЗЪ.

Воспаление женскихъ грудей.(*Mastitis*).

Syn: inflammatio mammarum, phlegmone mammæ; воспаление титекъ.

§ 311.

Воспаление сіе имѣеть въ теченіи и явленіяхъ своихъ дѣйствительныя разности, смотря потому, произраждается ли оно во время кормлениія грудью, или виѣ сего періода.

А.) *Воспаление титекъ у некормящихъ грудью* случается какъ у замужнихъ, такъ и незамужнихъ женщинъ и наиболѣе важнымъ почитается тогда, когда оно появляется около или послѣ того періода жизни, въ которомъ мѣсячное очищеніе прекращается навсегда по естественнымъ причинамъ.

§ 312.

Явленія. Воспаленіе таковое никогда не сопровождается сильными припадками, занимаетъ большею частию только одну часть грудной желѣзы и обнаруживается тупою, слабою болью, которая часто примѣщается толь-

ко при дотрогиваніи къ груди, но всегда соединена съ большою твердостю и малою опухолью. Вообще воспаленіе сіе имѣеть весьма медленное, скрытое теченіе и особенную наклонность оставлять по себѣ отвердѣнія, кои послѣ легко переходятъ въ скирръ и ракъ. Съ сею болѣзнию недолжно однакожъ смѣшивать той воспалительной опухоли титечныхъ желѣзъ, которая иногда случается у молодыхъ дѣвушекъ во время развитія способности къ дѣторожденію, или вскорѣ послѣ онаго и состоитъ обыкновенно въ связи съ умноженнымъ напоромъ крови, зависящимъ, по видимому, отъ возышеннаго сочувствія съ маткою и усиленной раздражительности дѣтской системы, существующихъ въ сіе время.

§ 313.

Причины. Воспаленіе сіе произраждается послѣ вышеуказанныхъ насилий, наносимыхъ ударомъ, толчкомъ, ушибомъ и прижатиемъ, особенно при всеобщемъ худосочномъ страданіи. Впрочемъ бываютъ случаи, гдѣ нельзя предполагать такового причиннаго содержанія и гдѣ воспаленіе грудей должно произходить отъ болѣзпенного сочувствія титекъ съ маткою; что случается чаще всего у бесплодныхъ женщинъ, у старыхъ дѣвицъ съ натуральнымъ прекращеніемъ мѣсячного отдѣленія и вообще у такихъ, у коихъ отправленія матки никогда не совершались надлежащимъ образомъ.

§ 314.

Предсказание. Болѣзнь сія въ особенности важна тѣмъ, что можетъ переходить въ скирръ. Врачъ недол-

жеть обманываться отсутствием боли при оставшемся отвердении и всегда быть увереннымъ въ томъ, что между доброкачественнымъ отвердениемъ и скирромъ нельзя положить вѣрныхъ границъ. Посему-то воспаленіе сіе, несмотря на его маловажные припадки, должно пользовать съ величайшимъ вниманіемъ.

§ 315.

Лѣченіе. Совершенное уничтоженіе сего воспаленія удается только тогда, когда врачъ заблаговременно можетъ подать приличное вспомоществованіе. Въ самомъ началь болѣзни должно приставлять пьявки, дѣлать приочки (впрочемъ нехолодныя) изъ раствора нашатыря (N 25), втиратъ спаружи сѣрую ртутную мазь и давать внутрь прохладжающія средства (N 13.14.19). По прошествии первого или острого периода, разрѣшеніе удается весьма рѣдко, обыкновенно при семъ остается отвердѣніе, поддерживаемое скрытымъ воспаленіемъ. Въ сіе время при лѣченіи должно обращать преимущественное внимание на различныя причинныя отношенія. Если воспаленіе произошло собственно отъ вышеупомянутаго насилия, то надлежитъ стараться дѣятельность воспалительного процесса умножить и произвести нагноеніе, съ которымъ проходитъ и самое отвердѣніе. Для сего могутъ служить втирание сѣрой ртутной или другихъ раздражающихъ мазей (N. 122.) также припарки изъ ароматныхъ травъ и пр. Когда же причиною воспаленія худосочіе, то прежде всего нужно уничтожить оное и потомъ уже назначать приличный способъ лѣченія. Гдѣ пельзя от-

крыть таковыхъ причинъ и гдѣ болѣзнь произошла болѣе въ слѣдствіе болѣзненнаго сочувствія, тамъ при лѣченіи надлежитъ соблюдать большую осторожность, да-бы не слишкомъ раздражить отвердѣніе и непрерватить его въ злокачественное. Здѣсь требуется многократное припущеніе пьявокъ, теплое окутываніе груди нѣжными веществами, внутреннее употребленіе болиголова, одурника и юдина, вообще способъ лѣченія, назначаемый въ началѣ скирра.

§ 316.

В.) *Воспаленіе титекъ у кормящихъ грудью* представляетъ всегда скоротечную форму страданія и бываетъ либо мѣстное, либо распространенное на всю грудь.

Мѣстное воспаленіе титекъ (*mastitis partialis*) начинается болѣю, опухолью и краснотою въ какомъ либо мѣстѣ груди, большему частію вблизи сосковъ и всегда почти сопряжено бываетъ съ легкими огневичными движениями. Воспаленное мѣсто мало по малу возвышается, оказываетъ зыбленіе, покрывается рожевидною краснотою, на которой появляется современемъ желтое пятно, наконецъ вскрывается и переходитъ въ небольшой нарывъ. Воспаленіе сего рода часто развивается изъ т. н. молочныхъ узловъ, рождающихся скопрѣе или медленнѣе послѣ прекращенія отдѣленія молока, либо послѣ отъученія ребенка отъ груди.

Если же воспаляется весь паренхимъ грудныхъ желѣзъ (*m. totalis*), то въ самомъ началѣ уже развивается обыкновенно горячка, усиливающаяся съ умно-

женіемъ самаго воспаленія. Грудь при симъ значитель-
но распухаетъ и твердѣетъ, боль бываетъ повсемѣстна
и отдѣленіе молока, въ усиленной степени воспаленія,
совершенно прекращается. Краснота содержитя раз-
лично: иногда вовсе незамѣчается, обнаруживаясь уже
передъ вскрытиемъ нарява краснымъ пятномъ, а иногда
ограничивается однимъ какимъ либо мѣстомъ, въ кото-
ромъ въ послѣдствіи открывается нарывъ. Въ иѣкото-
рыхъ случаяхъ, при возвышенной степени воспаленія,
поражается онымъ клѣтчатая плева и кожа, отъ чего
опухоль бываетъ очень сильная и краснота распространяется
на всю грудь. Съ воспаленіемъ симъ можетъ
быть соединена рожа женскихъ грудей и воспалитель-
ное раздраженіе подмыщиковъ желѣзъ, раждающееся
по сочувствію.

§ 317.

Исходы: а.) *Разрѣшеніе* случается только въ нача-
лѣ, когда болѣзнь еще недостигла значительной степе-
ни и ограничивается однимъ какимъ либо мѣстомъ. Час-
тие всего воспаленіе сіе у кормящихъ грудью переходитъ
б.) въ *нагноеніе*, при чмъ образуется одно или
многія гнойныя отверстія, кои въ благопріятныхъ слу-
чаяхъ въ непродолжительномъ времени закрываются, а
иногда, особенно при небрежномъ, грубомъ, неправиль-
номъ лѣченіи превращаются въ весьма *упорныя сви-щевые язвы*. Нерѣдко также послѣ предшествовавшаго
воспаленія остаются въ иѣкоторыхъ мѣстахъ с.) *отвер-дныя*, кои часто ощущаются весьма твердыми, продол-
жаются очень долго и при поверхностномъ изслѣдованіи

могутъ быть почитаемы за скирръ;—впрочемъ они всегда почти бывають доброкачественны, имъютъ одинаковое свойство съ означенными молочными узловатыми опухолями и разрѣшаются, либо смягчаются нагноеніемъ.

§ 318.

Причины. Преимущественное расположение къ сей болѣзни оказывается во время беременности и кормленія грудью, особенно вскорѣ послѣ родовъ. Замѣчено, что женщины, имѣющія весьма полныя, напряженныя груди, нѣжную кожу, слабыя мышцы и большую раздражительность въ тѣлѣ, чаще подвергаются сему воспаленію титекъ, нежели тѣ, кои одарены вялыми грудами и грубымъ устройствомъ тѣла. Вообще большая наклонность къ образованію такового воспаленія существуетъ у женщинъ, страдавшихъ прежде онимъ, также у тѣхъ, кои имѣютъ весьма малые, плоскіе соски, затрудняющіе сосаніе и вытеченіе молока и сами не кормятъ дѣтей своихъ, наипаче въ первые дни послѣ родовъ.

Изъ случаиныхъ причинъ частѣйша суть: душевныя возмущенія, особенно испугъ, гнѣвъ, досада, даже чрезмѣрия радость, нерѣдко также простуда всего тѣла, либо одной груди и разныя механическія поврежденія.

§ 319.

Предсказаніе въ семь родѣ воспаленія довольно благопріятно. При надлежащемъ лѣченіи въ большей ча-

сти случаевъ неостается никакихъ послѣдствій. Раждающееся послѣ сего отвердѣніе, подобное молочнымъ узламъ, почти всегда излѣчивается, и весьма рѣдко перерахдается въ скирръ. Впрочемъ долговременное продолженіе воспаленія и нагноенія можетъ вредить общему здоровью и причинять большія безшокойства.

§ 320.

При лѣченіи нужно обращать вниманіе на слѣдующія обстоятельства:

1.) Во всякомъ случаѣ, а особливо при существующемъ расположениіи, надлежитъ стараться сколько возможно предотвращать болѣзнь, уклоняя всѣ препятствія, могущія ограничивать свободное истеченіе молока, избѣгая всячески случайныхъ причинъ и дѣлая вліяніе ихъ по возможности безвреднымъ. Во время беременности уже должно стараться содѣлать твердые, слишкомъ углубленные, малые соски способными для кормленія чрезъ втирание смягчающихъ средствъ и надѣваніе на оные колецъ изъ слоновой кости, эластической смолы и пр. Вскорѣ послѣ разрѣшенія отъ беременности, непозже однаждѣкъ, какъ по прошествіи шести часовъ, надобно давать ребенку грудь для сосанія. Если груди крѣпки и слишкомъ напряжены, то нужно способствовать свободному вытеченію молока теплымъ окутываниемъ ихъ, припущењемъ теплыхъ паровъ и прикладываниемъ на оныя хлопчатой бумаги, окуренной сахаромъ, также теплыхъ подушечекъ съ отрубями, либо съ разрѣшающими травами (sp. resolventes) и т. п.

Когда же грудные соски изъязвляются и роженица при кормлении ребенка чувствует сильные боли, то для избежания оныхъ и предупреждения воспаленія грудей, неоставляя никакъ кормленія, лучше употреблять стеклянныя для сосковъ покрышки, вверху коихъ прикрепляется посредствомъ крепа или флерера кусочекъ губки, снабженной отверстиемъ (*K. Maygrier*). Изъязвленіе и трещины (*rhagades*) сосковъ весьма скоро уничтожаются мазью, состоящую изъ миндального масла, Перуанского бальзама и розовой воды (N 119.). Воспаленіе сосковъ требуетъ примочекъ изъ холодной воды съ краснымъ виномъ. Во всѣхъ сихъ случаяхъ груди должны быть поддерживаемы приличною повязкою къ верху и, во избѣжаніе простуды, содержимы въ теплотѣ. Душевныхъ возмущеній и погрѣшностей въ діетѣ всякая кормилица тщательно должна избѣгать. Коль скоро же окажутся признаки простуды и обнаружится болѣзньное напряженіе въ груди, то нужно тотчасъ споспѣшствовать испаренію кожи употребленіемъ теплаго бузинового чаю съ прибавленіемъ уксусокислаго амміака (N 82) и прикладывать на груди подогрѣваемые травяные мѣшечки, которые весьма полезны и въ то время, когда окажутся болѣзненныя ощущенія въ груди послѣ вліянія душевныхъ возмущеній. Въ семъ послѣднемъ случаѣ для крѣпкихъ полнокровныхъ женщинъ съ большою пользою можно давать pulv. *temperans Rosensteinii* (N 61), а для слабыхъ и вялыхъ первыя, успокаивающія (N 73.76.) средства: наливку мауна съ пастойкою опія и пр. Погрѣшности въ діетѣ требуютъ испражняющихъ средствъ.

§ 321.

2.) Если же воспаленіе не предотвращено, то на-
добно смотрѣть, въ какой степени оно обнару-
жилось уже. При всякомъ, недавно произшедшемъ во-
спаленіи, не усилившемся до значительной степени, долж-
но непремѣнно испытывать разрѣшеніе; при чёмъ пер-
вое условіе состоитъ въ томъ, чтобы поддерживать исте-
чіе молока. Ребенка въ сіе время отнюдь недолжно
отнимать отъ грудей, неопасаясь никакого вреда, могу-
щаго произойти отъ сосанія имъ больной груди, ибо до-
тѣхъ поръ, пока необразовалось еще дѣйствительное
нагноеніе молоко удерживается всегда натуральное состоя-
ніе свое. Между тѣмъ сосаніемъ ребенка, какъ самимъ
естественнѣмъ, безвреднымъ способомъ испражненія мо-
лока, предотвращается скопленіе и застой онаго, а чрезъ
то и дальнѣйшее распространеніе самаго воспаленія.
(Astley Cooper). Буде же продолженіе сосанія невоз-
можно, то слѣдуетъ прибѣгнуть къ искусственнымъ ис-
пражненіямъ молока, посредствомъ стекляннаго орудія,
снабженного длинною сосательною трубкою. Кромѣ про-
должаемаго испражненія молока надлежитъ употреблять
вибратори и внутреннія средства, дѣйствующія на раз-
рѣшеніе болѣзни.

Изъ наружныхъ средст�ъ самое приличнѣйшее есть
теплота. Вообще при умѣренной степени воспаленія
хорошо дѣйствуетъ прикладываніе пѣжной шпанской
шерсти, заячьяго или кроликоваго мѣха, согрѣваемыхъ
мѣшечковъ съ отрубями, либо съ разрѣшающими тра-

вами (*species discutientes*). Въ усиленной же степени болѣзни большую пользу доставляютъ смѣсь изъ пива, коровьяго масла и патоки, *unguentum cetylaceum*, *ug. de althea* и овсяной муки съ уксусомъ, разведеннымъ водою. Кровоиспражненія требуются очень рѣдко. Только въ самомъ началѣ болѣзни, если она обнаруживается чрезмѣрнымъ воспалительнымъ состояніемъ, припущеніе пьянвицъ можетъ доставить пользу, въ другихъ же случаяхъ болѣзни удобно дѣлается чрезъ то хроническою и, вмѣсто нагноенія, переходитъ въ отвердѣніе. Равнымъ образомъ втирание ртутной мази, доставляюще въ другихъ случаяхъ отличную пользу, здѣсь недолжно быть предписываемо, ибо вмѣсто разрѣшенія, она раздраженіемъ своимъ легко причиняетъ воспаленіе виѣшихъ покрововъ, особенно въ соединеніи съ летучею мазью. Примочки изъ воды и водки, изъ раствора нашатыря и щелочей также неумѣстны здѣсь. Внутрь могутъ быть даваемы для возбужденія легкой испарины уксусокислый амміакъ въ слабой наливкѣ мауна, ромашки или бузины (N 82), а при значительномъ раздраженіи сосудистой системы насыщеніе лимоннымъ сокомъ углекислого постапа (N 95) съ нѣсколькими каплями простой настойки опія. Дѣта должна быть нераздражающая, содержащая спокойное, а испражненіе на низъ свободное.

§ 322.

3.) *Когда разрѣшеніе неудается, или воспаленіе достигло того времени, въ которомъ невозможно предпринимать его, то надлежитъ ускорять нагноеніе и след-*

ствено превращать воспаленіе въ нарывъ титечныхъ желѣзъ, что достигается употребленіемъ теплыхъ припарокъ, долгое время прикладываемыхъ и всегда содер-жимыхъ въ ровной теплотѣ. Если воспаленіе представ-ляетъ потребную для нагноенія дѣятельность, то при-парки таковыя предписываются изъ смягчающихъ и успо-коивающихъ веществъ (N. 48); когда же воспаленіе имѣть очень медленное теченіе, груди ощущаются твер-дыми, вообще недостаетъ потребной для образования гноя дѣятельности воспалительного процесса, то надле-житъ употреблять раздражающія припарки, смѣшивая вышеозначенныя смягчающія средства съ лукомъ, даже съ горчицею (N. 106), съ аммоніаковою или сосно-вою смолою. На отвердѣлыхъ мѣстахъ, окружающихъ нарывъ, можно втирать летучую мазь въ смѣшаніи съ сирою ртутною мазью. Въ ночное время, вмѣсто припа-рокъ, лучше прикладывать смягчающую или раздражаю-щую мазь, смотря по состоянію болѣзни, напр: *ung. de althaea, elemi compositum*, или *emplastrum lithargyri com-positum Ph. Bor.* Произведши нагноеніе, нужно старать-ся о вскрытии нарява и испражненіи гноя, наблюдая при семъ все правила изложенные при лѣченіи нары-вовъ вообще. (§ 55.) Послѣ вскрытия отверстіе нарява покрывается корнейнымъ сверткомъ, овраженнымъ мазью и продолжается употребленіе теплыхъ припарокъ до тѣхъ поръ, пока исчезнетъ вся твердость. Грудь при семъ поддерживается вверхъ приличною повязкою и два раза въ день выжимается гной изъ оной самимъ легкимъ дав-леніемъ. Вкладываніе въ отверстіе свертковъ корпіи чрезвычайно вредно, ибо они раздражаютъ своимъ

поддерживаютъ воспаленіе и чрезъ то подаютъ поводъ къ образованію свищевыхъ ходовъ. Если же образуются таковые ходы, то въ оные весьма хорошо впрыскивать растворъ 2 или 3 капель крѣпкой сѣрной кислоты въ одномъ унцѣ розовой воды и дѣлать примочки на груди посредствомъ холстинки, овлажаемой таковымъ растворомъ (*Astley Cooper*). Для разрѣшенія твердости грудей, остающейся послѣ нарыва можно предписывать съ пользою *unguentum jodureta Ph. univ. emplastrum g. ammoniaci cum hydrargiro* и другія разрѣшающія мази (N. 122).

Воспаленіе околоушиныхъ желѣзъ.

(*Parotitis*).

32

Syn. *Inflammatio parotidum*, *cynanche s. angina parotidea*.

§ 323.

Явленія. Большая, твердая, неограниченная, болѣющая опухоль между ухомъ и угломъ нижней челюсти, въ томъ мѣстѣ, где находится околоушная желѣза. Чаще страждеть только одна желѣза и при томъ болѣе на правой, нежели на лѣвой сторонѣ, въ рѣдкихъ случаяхъ воспаляются обѣ желѣзы вмѣстѣ; а еще рѣже воспринимаютъ участіе другія сложныя и близьлежащія лимфатическія желѣзы съ окружающею ихъ клѣтчатою пле-

вою. Означенная опухоль въ короткое время достигаетъ столь значительной величины, что придаетъ лицу уродливый видъ, затрудняетъ жеваніе и глотаніе и дѣлаетъ си отправленія болѣзнями. Внѣшніе покровы на оной болѣшею частію неизмѣняются; въ нѣкоторыхъ случаяхъ однокожъ нѣсколько краснѣютъ или покрываются рожеобразнымъ воспаленіемъ. Горячка иногда во все необнаруживается, а иногда бываетъ довольно сильная, что зависитъ отъ разнаго свойства эпидеміи и другихъ *причинныхъ вліяній*, по которымъ воспаленіе се можно раздѣлить на слѣдующіе четыре рода.

§ 324.

a.) *Parotitis epidemica simplex*, (заушница; *umps*, *oreillons*, *Bauerwezel*,) есть собственного рода воспаленіе околоушныхъ желѣзъ, коего ближайшая причина скрыта во внутреннемъ содержаніи организма, подобно какъ оспы, кори, красухи и пр. и которая оказывается только эпидемически или эндемически, зимою и весною, при влажно холодной туманной погодѣ, послѣ простуды, напиache у дѣтей и молодыхъ людей, болѣшею частію предшествуетъ острымъ сыпямъ и имѣеть большую наклонность къ отступленіямъ и переносамъ на другіе органы. Въ нѣкоторыхъ эпидеміяхъ, отличающихся напиache сильною горячкою, случается иногда, что опухоль на 5—7 день болѣзни вдругъ исчезаетъ безъ всякаго перелома и дѣлается переносъ чаше всего на дѣтородные части, отъ чего у мужчинъ распухаютъ и воспаляются яички, а у женщинъ титѣки,—иногда же и вну-

рениїя дѣтской части. Сверхъ сего замѣчены опасные переносы сей болѣзни на мозгъ, въ слѣдствіе коихъ рождались всѣ припадки воспаленія мозга.

b.) *Parotitis critica, suppurans* случается весьма часто подъ конецъ сильныхъ и злокачественныхъ горячекъ, скарлатина, разныхъ первыхъ, простудныхъ и желудочныхъ горячекъ, образуетъ нѣкоторый родъ мѣстнаго перелома и имѣетъ особенную наклонность къ переходу въ нагноеніе.

c.) *Parotitis metastatica, impetiginosa* обнаруживается, какъ сопутникъ, или переносное послѣдствіе лихорадки, чесотки и различныхъ чесоткообразныхъ сыпей (*sydriatia*). Нерѣдко также оно оказывается послѣ отступившей ломоты, скрывшейся головной сыпи и пр.

d.) *Parotitis mercurialis* рождается отъ чрезмѣрнаго употребленія ртути, производящей обыкновенно воспаленіе слюнныхъ желѣзъ и потому всегда сопряжено бываетъ съ слюнотечениемъ. Кромѣ сихъ причинныхъ моментовъ воспаленіе сіе бываетъ иногда слѣдствиемъ труднаго прорѣзыванія зубовъ, костоѣды, слюнныхъ камней и пр.

§ 325.

Исходы. Воспаленіе околоушныхъ желѣзъ, по разному качеству своему, восприимаетъ различные исходы:

a.) *Разрѣшеніе* случается наиболѣе при эпидемическомъ воспаленіи сего рода на 4—5 и 8 день, при чемъ на опухоли выступаетъ потъ, въ мочѣ дѣлается осадокъ, иногда оказывается кровотеченіе изъ носу и опухоль, теряя постепенно свое напряженіе и упругость, въ нѣ-

сколько дней исчезаетъ. Если впрочемъ воспаленіе сіе не сопровождается горячкою, то разрѣшеніе онаго проходитъ гораздо медленнѣе. б.) *Нагноеніе* свойственно болѣе всѣхъ критическому воспаленію сихъ желѣзъ, впрочемъ оно оказывалось также въ нѣкоторыхъ случаяхъ эпидемического воспаленія (*Dionis*), въ какомъ разѣ сопровождалось весьма дурными припадками и оставляло по себѣ слюнные свищи. с.) *Отвердлѣніе*, какъ исходъ воспаленія, появляется чаще послѣ слабаго воспаленія, также въ слѣдствіе неправильнаго лѣченія, особенно употребленія холода, либо простуды и при золотушномъ расположениіи. Переходъ въ *антоновъ огонь* почти никогда не встрѣчается, исключая весьма рѣдкіе случаи критического воспаленія.

§ 326.

Предсказаніе зависитъ отъ свойства и степени воспаленія. Если эпидемія, производящая оное, неимѣтъ наклонности къ переносамъ, то болѣзнь большею частію оканчивается благополучно; въ противномъ случаѣ предстоитъ большая опасность, наипаче при переносѣ на мозгъ, отъ коего иногда слѣдуетъ смерть въ 24 часа. Критическое воспаленіе считается всегда благопріятнымъ дѣйствіемъ природы, особенно если оно въ скоромъ времени переходитъ въ нагноеніе и вскрывается. Случаи, гдѣ оно оканчивалось антоновымъ огнемъ, рѣдки. Переносное воспаленіе бываетъ различного значенія, смотря потому, отъ какой болѣзни происходитъ оно; а ртутное есть самое безопасное и уничтожается всегда

съ притуплениемъ дѣйствія ртути. Тоже можно сказать и о прочихъ сочувственныхъ воспаленіяхъ.

§ 327.

Лѣченіе должно быть располагаемо по различному свойству воспаленія, зависящему наиболѣе отъ причинныхъ моментовъ.

1. *Эпидемическое воспаленіе* (*trumps*, *oreillons*) никогда не должно быть вдругъ прекращаемо, но на противъ надлежить способствовать натуральному теченію его по періодамъ до обнаруживанія перелома. Въ обыкновенныхъ случаяхъ достаточно болезному предотвращать себя отъ простуды пребываніемъ въ постели, соблюдать противувоспалительную діету и прикрывать слегка опухоль фланелью или мѣшечкомъ, наполненнымъ отрубями, но всякой влажности надлежитъ избѣгать. По прошествіи иѣкотораго времени, особенно при наступлении перелома, весьма полезно давать умѣренныя потогонительныя к. т. *aqua flor. sambuci*, *aq. rubi idaei*, *acetas ammoniæ liquidus*, *murias ammoniæ*, *tartarus stibiatus in refr. dosi* (N 108.) и пр. Когда воспаленіе очень значительно и сопровождается сильною горячкою, то смотря по обстоятельствамъ, можно назначать, съ большою впрочемъ осмотрительностью, кровопусканіе изъ руки, пьявки вокругъ опухоли и внутреннія противувоспалительныя (N 18. 19) средства. При весьма напряженной и болѣй опухоли не возможно иногда обойтись безъ теплыхъ примочекъ; но въ такомъ случаѣ, во избѣжаніе чрезвычайно вредныхъ послѣдствій нагноенія опухоли, лучше

употреблять разрѣшающія средства (*Mason Good*), какъ примочка Руста (N 105.) Если же опухоль на первоначальномъ мѣстѣ своемъ исчезнетъ и окажется переносное страданіе въ другихъ частяхъ, то надлежитъ тотчасъ приложить раздражающую припарку (N 109.) или нарывной пластырь на околоушную желѣзу и смотрѣть, чтобы та часть, на которую перешло воспаленіе, предохранялма была всячески отъ простуды окутываниемъ теплою фланелью. При пораженіи мозга одна надежда остается только на отвлекающія и противораздраждающія средства, также на внутреннее употребленіе мускуса въ большихъ пріемахъ и камфоры (*Neumann*). При переносѣ на шульята полезно втиратъ въ мюонкѣ *oleum foetidum cum spir. angel. comp.* или прикладывать на оную *empl. foetidum Schmuckeri*; а при переносѣ на женскія груди назначаются сухие, теплые, ароматные мѣшечки съ камфорою и окутываніе грудей фланелью.

2.) *Критическое воспаленіе сухъ желѣзъ* большою частию предзначаетъ хороший исходъ въ злокачественныхъ горячкахъ. Наклонность его къ нагноенію должна быть всячески поддерживаема, къ чему въ обыкновенныхъ случаяхъ достаточны теплые смягчающія припарки (N. 48). Если же натура очень долго замедляетъ созреваніе и вскрытие нарява, между тѣмъ какъ обнаруживаются опасные припадки, удушеніе и пр. то нужно вскрывать его хирургически. При твердой, очень мало воспаленной опухоли простыя припарки недѣйствительны, а должны быть прикладываемы острыя изъ горчицы, мыла и луку (N. 106.). Переходъ сего воспа-

ления въ антслювъ огонь большею частію неопасенъ, ибо онъ занимаетъ небольшое пространство. Если же съ наступлениемъ его оказываются холодные поты, большой упадокъ силъ, перемѣжающееся жилобеніе, то надлежитъ давать внутрь летучія возбуждающія средства (N. 22), снаружи дѣлать нарѣзы и потомъ приложи прикладывать ароматныя и противугнилостныя вещества (N. 107).

3.) *Переносное воспаленіе* въ умѣренной степени можетъ быть пользуемо такъ, какъ и эпидемическое. Скрывшіяся внутрь сыпи должны быть восстановляемы на первоначальномъ своемъ мѣстѣ посредствомъ втирания мази изъ рвотнаго камня (*ungv. stibiatum*), а отступившая ломота чрезъ противураздраженіе наводящими красноту средствами и пр.

4.) *Воспаленія*, раждающіяся отъ чрезмѣрного употребленія ртути, требуютъ, въ значительной степени своей, припущенія пыльковъ и потомъ употребленія средствъ, дѣйствующихъ собственно противъ ртутнаго раздраженія к. с. камфора, опій, сѣрия печенка съ виннымъ камнемъ, сѣрия ванны и пр.

Если послѣ котораго нибудь изъ означенныхъ родовъ воспаленія остается *отвердлыie*, то при разрешеніи его должно поступать по общимъ правиламъ (§ 65.66).

Воспаление поджелудочной железы.

(*Pancreatitis*).

§ 328.

Болезнь. Ощущение тягостного давления и тупой боли подъ желудкомъ, съ которымъ сопряжено также чувство какъ бы подающагося впередъ тяжелаго тѣла при наклоненіи; болящая опухоль желудочной стороны, потеря аппетита, разстройство пищеваренія; въ послѣдствіи частая рвота водянистою, на слону похожею, иногда кислою, съ желчью смѣшанною жидкостію; запоръ на изъ продолжавшійся часто 2—3 дня, либо водянистые испражненія пиза; иногда рождается слюнотече-
ние и притомъ очень обильное, вздутие живота, желудочный спазмы и пр. Больные вскорѣ получаютъ дурной цветъ въ лицѣ (желтовато-зеленоватый), теряютъ силы и истощаются, но горячка рѣдко оказывается; развѣ по переходѣ воспаленія въ нагноеніе, въ какомъ случаѣ она наступаетъ вечеромъ и имѣеть свойство изнурительной лихорадки. Болѣзнь сія представляетъ вообще недѣятельное состояніе и весьма легко дѣлается хроническою. Разрѣшается она рѣдко,—наиболѣе критическими испражненіями пиза. Чаще всего переходитъ въ скиррозное отвердѣніе, а иногда въ нагноеніе и изъязвленіе (*phthisis pancreatic*), въ слѣдствіе коего отъ изнуренія приключается и самая смерть.

§ 329.

Случайныя причины суть наипаче злоупотребленіе ртутныхъ и драстическихъ лѣкарствъ, также куреніе

слишкомъ крѣпкаго табаку, особливо если оно сопряжено съ безпрестаннымъ плеваніемъ. Вообще ртуть поражаетъ сильно жизнедѣятельность поджелудочной желѣзы, причиняя внутреннее слюнотеченіе и сильныя испражненія низа, кои, по всему вѣроятію, происходятъ въ такомъ случаѣ не отъ примѣси зеленой желчи, а отъ болѣзненнаго отдѣленія поджелудочной желѣзы, которое воспринимается при семъ зеленый цвѣтъ (*Neumann*).

Предсказание неблагопріятно, собственно потому, что болѣзнь въ самомъ началѣ, когда очень легко доставить вспомоществованіе, весьма трудно узнается. Когда же окажется нагноеніе или скирръ, то смерть составляетъ обыкновенный исходъ.

§ 330.

Лѣченіе производится по свойству причинъ и состоянію болѣзни. Если она произошла отъ злоупотребленія ртути, то весьма полезны сѣрыя ванны, опій, камфора и пр. Въ другихъ случаяхъ лѣченіе основывается на употреблениіи обыкновенныхъ противовоспалительныхъ средствъ: *saturationis kali carbonici* сим aq. *chamomillæ* и пр. (N 5.18.35.). Отвлекающій и отводящій способъ можетъ доставлять большое пособіе, въ особенности потогонительное содержаніе и лѣкарства, усиливающія кожную дѣятельность (N 108). Въ хроническомъ состояніи строгая діета, легкіе горькіе экстракты (N 14.34.39.) съ разрѣшающими солями, Зельтерская, Фахингерская, Пирмонтская и Дрибургская воды наи-

болѣе способствуютъ исцѣленію (*Most*). Что же касается до антагонистического возбужденія слюнныхъ желѣзъ употреблениемъ услажненной ртути, то опытность достаточно еще не прѣшила, при какихъ иммунно содержаніяхъ оно можетъ быть полезно.

35
G.) ВОСПАЛЕНИЯ ЖЕЛѢЗИСТЫХЪ ВНУТРЕННОСТЕЙ.

Воспаление печени.

(*Hepatitis.*)

Syn. Inflammatio hepatis, hepatalgia phlegmonoidea; febris hepatica inflammatoria.

24.

§ 331.

Паленія. Больной жалуется на боль въ сторонѣ печени, то сильную и колющуу, то болѣе тупую и давищую, умножающуюся отъ прикосновенія, глубокаго вдыханія, кашля, перемѣны положенія—и переходящую нѣрѣдко на смежныя части, особенно на селезенку и пр. Кромѣ боли, въ сторонѣ печени ощущается также чувство полноты, тяжести, давленія, жара, даже біенія. Въ высшей степени воспаленія печечочная сторона пред-

ставляется распухшою извиѣ, твердою, напряженною и болѣе жаркою, нежели прочее брюхо. Къ симъ *мъст-ныи припадкамъ* присоединяется также разстроенное отиправлениe печени. Отдѣленіе желчи либо умножается и въ качествѣ своемъ измѣняется, либо воспльщается. Въ первомъ случаѣ находятся всегда признаки изліянія желчи въ первые пути: горькій вкусъ, обложеній желтымъ цвѣтомъ языкъ, раздраженіе подъ ложечкою, удавка, горькая отрыжка, иногда и рвота, бурыя, зеленоватыя жидкія испражненія низа; а во второмъ случаѣ кожа окрашивается желтымъ цвѣтомъ и появляются всѣ признаки желтухи, испражненія низа бываютъ скудны, тверды и сѣроваты, моча буроватая, шаффранноцвѣтная, дѣлающая сильный желчный осадокъ. По общирному сочувствію, въ какомъ печень состоитъ съ важнѣйшими частями тѣла, при воспаленіи ея оказываются также весьма многія *сопутственныи припадки*. Сюда принадлежатъ: тоска въ предсердіи съ наклонностію къ рвотѣ и икотсю, вздутость и болѣзnenное напряженіе брюха, упорный запоръ на низѣ, ощущеніе колотья и напряженія въ селезенкѣ, сильное колотье въ боку, камшель, желтоватая харкотина (*pleuritis biliosa*), головная боль, напаче надъ бровями, бредъ, кровотеченіе изъ правой ноздри, иногда боль въ правой лопаткѣ, поясница, крестцѣ и въ правой икрѣ, а иногда оиѣменіе въ сихъ членахъ. Что касается до *огневиныхъ лѣленій*, то они часто появляются уже съ первыми признаками воспаленія, часто также несколько позже, начинаясь сильнымъ ознобомъ и переходя потомъ въ настоящій жаръ и сопровождаются болѣшею частію скорымъ, твердоватою

тымъ и сжатымъ, рѣже полнымъ и болѣшимъ жилобіемъ.

Явленія сіи представляютъ одинакожъ иѣкоторую разность, смотря по мѣстопребыванію воспаленія въ той или другой части печени. Если поражается имъ *выпуклал*, лежащая подъ брюшною стѣною *частъ печеніи* и притомъ болѣе поверхностный покровъ, нежели внутреннее существо, то боль бываетъ острая, колюща и при маломъ прикосновеніи увеличивающаяся, но въ отправлѣніи печени менѣе замѣчается разстройства. Тоже самое бываетъ, если воспаляется верхній край печени, обращенный къ грудобрюшной преградѣ; въ какомъ случаѣ болѣзнь сія, по причинѣ колющей боли подъ нижними ребрами, можетъ быть смѣшиваема съ воспаленіемъ грудной плевы; а по причинѣ часто оказывающейся икоты, съ воспаленіемъ грудобрюшной преграды. Впрочемъ иногда воспаленіе печени дѣйствительно распространяется при семъ на грудобрюшную преграду и грудную плеву. Если же напротивъ того поражается воспаленіемъ *согнутая поверхность печени*, то боль бываетъ болѣе тупая и жгучая и существуютъ признаки разстройства въ отдѣленіи желчи. Тоже самое происходитъ, если воспаляется болѣе внутренній составъ печени, нежели поверхность ея; въ семъ-то случаѣ наиболѣе замѣчается опухоль. При воспаленіи правой доли печени болѣйной ощущаетъ обыкновено колющія боли въ правомъ боку и неможеть лежать на лѣвомъ, а при воспаленіи лѣвой доли печени мѣстопребываніе боли ограничивается преимущественно ложечкою, ниже коей можно ощущать иногда твердоватую опухоль печени.

При воспаленіи желчнаго пузыря (*cholecystitis*) страждущій ощущаетъ сильную боль, постоянно въ одномъ мѣстѣ пребывающую и умножающуюся отъ прикосновенія къ краю короткихъ реберъ, сверхъ сего здѣсь оказывается болѣе или менѣе явственная желтуха.

§ 332.

Течение. Воспаленіе печени бываетъ иногда *скоро-тѣнное* а иногда *продолжительное*. Въ первомъ случаѣ означенные явленія обнаруживаются съ нѣкоторою силою и развиваются быстро, да и все продолженіе болѣзни распространяется до 7 или 14 дней, рѣдко до 21 дня. Въ послѣднемъ же (т. е. въ хроническомъ состояніи) признаки воспаленія оказываются неявственно. Боль примѣщается иногда только при сильномъ давлѣніи на печень или при усиленномъ движеніи тѣла и большою частію бываетъ тупая, давящая, хотя послѣ дѣлается не рѣдко также колющею. Больные страждуть слабостію пищеваренія и желудочными судорогами, имѣютъ горькій вкусъ, запоръ на низъ, иногда рвоту, при кої извергается желчь вмѣстѣ съ створоженною кровью, ипохондрические припадки, блѣдное, желтоватое, впалое лицо, желтую кожу, кровотеченіе изъ носу, особенно язвы на правой ногѣ. и пр. Таковое медленное воспаленіе можетъ продолжаться нѣсколько мѣсяцовъ и даже цѣлые годы, навлекая общую водянную болѣзнь и изнурительную лихорадку.

§ 333.

Исходы. 1.) *Разрѣшеніе* воспаленія печени слѣдуетъ обыкновенно послѣ желчныхъ испражненій ни-

зомъ или рвотою, послѣ критического пота и мочи, часто также послѣ кровотечения изъ носа и наступленія течучаго геморроя. Иногда разрѣшенію предшествуетъ произрожденіе рожи, высыпаніе пакожныхъ сыпей, боль въ селезенкѣ и распуханіе опой.

2.) *Выпотыніе образовательной пасоки* на поверхности печени причиняетъ сращеніе оной съ брюшиной, желудкомъ, двенадцатиперстною кишкою и другими частями; въ слѣдствіе чего части сіи воспящаются въ своемъ движениіи и при поворачиваніи тѣла на лѣвую сторону рождается дергающая боль. *Серозное выпотыніе* имѣеть мѣсто при образованіи гидатидовъ, которые случаются какъ на поверхности, такъ и въ существѣ печени; серозная влага можетъ скопляться въ семъ случаѣ между существомъ печени и покрывающею его серозною оболочкою.

3.) *Отвердѣніе*, послѣ разрѣшенія, есть частѣйшій исходъ, наипаче при медленномъ теченіи болѣзни. Больной имѣеть при семъ иѣкоторое болѣзненное ощущеніе, или только давленіе и тяжесть въ сторонѣ печени, но мало по малу образуются различные гастрические припадки, желтуха и наконецъ водяная болѣзнь.

4.) *Нагноеніе и изъязвленіе* печени есть также не очень рѣдкій исходъ и чаще всего случается въ правой долѣ. Наступленіе нагноенія можно подозрѣвать, если время разрѣшенія миновало уже и, вместо сильной, острой колющѣй боли, оказывается бьющая и дергающая боль, если постоянный жаръ смѣняется повторительно наступающимъ ознобомъ, начинающимся съ печеночной стороны, за коимъ слѣдуетъ летучій жаръ и

потъ. При семъ опухоль печени еще болѣе увеличивается, больной чувствуетъ явственное давлѣніе и тяжесть въ оной. Различные брюшные припадки продолжаются, иногда оказывается поносъ съ выхожденіемъ кровяноводянистой жидкости (*Hæmoxys hepaticus*); худосочный, блѣдно-землянистый видъ больного безпрестанно умножается, — и отъ истощенія силъ нагноеніемъ образуется самая чахотка (*Phthisis hepatica*). Нарывъ открывается иногда къ наружѣ, а иногда въ брюшную и даже въ грудную полость чрезъ грудобрюшную преграду. Замѣчено также всасываніе гноя и отложеніе его съ мочею, либо переносъ къ икрамъ и образованіе въ нихъ нарыва и язвъ.

5.) *Антоновъ огонь* весьма рѣдко бываетъ исходомъ воспаленія печени и случается только тамъ, где оно развивается въ злокачественныхъ горячкахъ, напр. въ желтой американской.

Смерть приключается здѣсь либо отъ сопровождающей воспаленіе горячки, либо отъ означенныхъ исходовъ, напиache отъ нагноенія и антонова огня.

§ 334.

Причины. Особенное расположение къ воспаленію печени имѣютъ молодые люди венознаго сложенія, холерического темперамента, напиache вспыльчивые и тѣ, комо прежде уже страдали имъ. Мужчины гораздо чаще подвергаются ему, нежели женщины.

Изъ случайныхъ причинъ преимущественныя суть: яростный гневъ, сильная досада, цепомѣрный зной, па-

иначе если онъ смѣняется скоро очень прохладною температурою, какъ бываетъ въ южныхъ странахъ, по берегамъ морей; также простуда, приключающаяся другимъ путемъ, напр. чрезъ питье холодной воды при очень разгоряченномъ тѣлѣ; ударъ по сторонѣ печени или очень сильное сотрясение печеночной стороны; злоупотребление спиртныхъ напитковъ и другихъ горячительныхъ веществъ, въ особенности крѣпкаго кофія и портера; воспіящеіе прохожденія желчи въ кишечный каналъ, желчные камни, весьма острая желчь, глисты и другія раздраженія въ желчныхъ ходахъ и кишечномъ каналѣ; нѣкоторые заразительные яды, напр. тифозная зараза, воспіященіе геморроидального теченіе, скрывшіяся внутрь рожа, обширный воспаленія тѣла, головныя поврежденія и пр.

§ 335.

Предсказание. Важность печени сама по себѣ придаетъ большое значеніе воспаленію оной, тѣмъ болѣе, что съ нимъ сопряжена всегда наклонность къ органическимъ послѣдственнымъ болѣзнямъ, зависящимъ отъ устройства самаго органа. Впрочемъ опасность опредѣляется здѣсь наиболѣе по мѣстопребыванію, характеру и силѣ воспаленія. Воспаленіе вогнутой поверхности представляетъ большую опасность, нежели прочихъ частей печени. Часто дѣятельное, острое воспаленіе, несмотря на чрезмѣрную силу его, угрожаетъ меньшою опасностію и надежнѣе излѣчивается, нежели тихое, хроническое, которое всегда переходитъ въ отвердѣніе.

Если оно появляется въ злокачественной горячкѣ, то угрожаетъ большою опасностю, по причинѣ очень скотаго иногда перехода въ антоновъ огонь. Нагноеніе только тогда не опасно, когда парыцъ вскрывается къ наружи; если же внутрь, то болѣзнь часто кончается смертю,

§ 336.

Лѣченіе а). По причиннымъ показаніямъ должно избѣгать всѣхъ душевныхъ возмущеній, особенно гнѣва, также всего, что раздражаетъ печень к. т. употребленія крѣпкихъ винъ и спиртныхъ напитковъ, прялой, раздражающей пищи, жирнаго копченаго мяса, крѣпкаго кофѣя, пива, портера и пр. а соблюдать легкую растительную диету, состоящую изъ пѣжныхъ, сырыхъ либо вареныхъ плодовъ и овощей, кислого молока, сыворотки, пахтанья и пр. Сверхъ того стараться насильственно остановленія кровотеченія возстановить, переносы уничтожить, раненія печеночной стороны и головы пользовать соотвѣтственнымъ состоянію ихъ образомъ и пр.

б.) По существеннымъ показаніямъ назначается вообще противувоспалительный способъ лѣченія. Обыкновенно сперва пускается кровь изъ правой руки, а потомъ дѣлаются мѣстныя кровоотвлеченія посредствомъ значительного числа пьявокъ (*Stokes*) либо кровососныхъ банокъ къ печеночной сторонѣ; или же приставляются пьявки къ окружности прохода (*Frank, Reil.*). Сверхъ того прикладываются смягчающія и успокоивающія припарки (N 48) на правомъ подреберьи, производятся втирания на ономъ изъ сѣрой ртутной мази и пр. Внутрь даются средства, умѣряющія волненіе крови, успокои-

вающе—разрѣшающія и способствующія отдѣленіямъ печени и кишечка. Въ легкихъ случаяхъ достаточны пасыненіе углекислаго поташа (№ 95), кипучіе порошки (№ 94), манна (№ 12), отваръ пырейного корня, тамаринды, очищенный винный камень (№ 13, 14.), винокаменная кислота, вообще разрѣшающія слабительныя соли (*Pemberton, Saunders*); а въ трудныхъ случаяхъ, послѣ предшествовавшихъ испражненій крови, главное средство составляетъ услащенная хлористая ртуть, даваемая настойчиво до произведенія слизотеченія (*I. Currie, Ellington*) и втирание сѣвой ртутной мази въ правое подреберье. Иногда полезно также возбужденіе и поддержа-
ніе обильного пота.

Если воспаленіе печени имѣеть болѣе медленное течение, то назначаются не столько кровопусканія изъ руки, какъ мѣстная кровоисправленія. Здѣсь могутъ быть также употребляемы вышеозначенныя лѣкарства, только въ слабѣйшей мѣрѣ. Въ хроническомъ, худож-
сочномъ воспаленіи печени очень хорошо дѣйствуютъ селитреная и соляная кислоты. Кромѣ сего весьма по-
лезны умѣренно теплые ванны, втирание въ правое подреберье сюрмянныхъ мазей и повторительныя при-
кладыванія нарываемыхъ пластырей. Отличное дѣйствіе оказываютъ еще ванны для ногъ изъ смѣси трехъ ча-
стей селитреной, одной части соляной кислоты (такъ что бы всей смѣси кислотъ заключалось $uniz. j - j\beta$) и бутылки воды. Все сіе разводится такимъ количест-
вомъ жидкости, какое потребно для ножной ванны. Та-
ковую же пользу оказываютъ и обмыванія тѣла губкою,

которая обмакивается въ означенню смѣсь кислотъ, разведенную до надлежащей степени (*Stokes*).

с.) *По припадоchnымъ показаніямъ* должно противудѣйствовать *запору на низѣ*, препятствующему обыкновенно критическимъ желчнымъ испражненіямъ и усиливающему напоръ крови къ печени. По сему его надлежитъ всегда уничтожать легкими кисловатыми слабительными (N. 13, 14.) и разрѣшающими промывательными (N. 42).

Къ прочимъ мучительнымъ припадкамъ относятся еще *жгучая жажда, нестерпимая тоска въ предсердіи и икота*. Жажда утоляется наиболѣе прохладительными кисловатыми напитками (N. 19), лимонадомъ, или легкимъ, жидкимъ хлѣбнымъ квасомъ, уксусомъ, разводимымъ водою, сокомъ малины, клюквы, смородины и пр. прибавляемымъ къ питью растворомъ виннокаменной кислоты, Зельтерскою водою и пр. Тамъ, гдѣ слишкомъ обильное питье вредно для органовъ пищеваренія, можно замѣнять его кружками лимона или апельсина, посыпаемыми сахаромъ и держимыми на языке. Тоска, если зависить отъ чрезмѣрно усилившагося воспаленія, умѣряется общимъ кровопусканіемъ и прохладжающими средствами, а если отъ воспалительно-судорожнаго напряженія, поддерживаемаго желчнымъ раздраженіемъ, то кипучими порошками (N. 94), насыщенiemъ углекислаго поташа, втираніемъ подъ ложечкою летучихъ и жирно масляныхъ мазей, нарывнымъ пластыремъ, паркотическою припаркою и въ особенности промывательными. Таковыми же лѣченіемъ уменьшается и самая икота.

Противъ *отвердѣнія* предписываются разрѣшающія

средства, наипаче дѣйствующія на отдѣленіе печени экстракты: graminis, taraxaci (N 38,39), marrubii albi, saponariæ, sumariæ, chelidonii etc.; пѣжныя среднія соли (N 14.34.), минеральная воды, наипаче Карльсбадскія и замѣняющія ихъ щелочносоліяныя Кавказскія; услащенная хлористая ртуть и сюрьманныя лѣкарства (N 134), лавровишиневая вода, втирания юодовыхъ мазей и вансы. Рвотные, рекомендованныя многими врачами въ началѣ болѣзни, могутъ доставлять пользу, но должны быть употребляемы съ осторожностью. Противъ такого отвердѣнія печени, которое считается неизлечимымъ, гораздо лучше не предпринимать ничего, или, по крайней мѣрѣ, одни незинныя средства, дабы не подвергнуть больного иногда еще большему вреду отъ самаго лѣченія.

Въ патогенезѣ печени рекомендуются минеральная кислоты и хина, даваемая отъ половины до цѣлой драхмы пять или шесть разъ въ день (*Mason Good*). Въ некоторыхъ случаяхъ можно надѣяться на всасываніе гноя и отложеніе его съ мочею, слѣдственно должно способствовать тому, средствами возвышающими дѣятельность всасывающей системы, особенно наперстянкою (N 6) и ртутными составами (N 134). Впрочемъ, если предвидится успѣхъ отъ вскрытия печепочного царыща кнаружи, то всячески надлежитъ способствовать созреванію его смягчающими припарками и вскрывать, какъ можно скорѣе.

Воспаление почек.

(*Nephritis*).

Syn. Inflammatio renum, phlegmone renum, nephralgia inflammatoria.

§ 337.

Явление. Въ поясничной сторонѣ, въ томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ имѣютъ положеніе почки, ощущается сильная раздирающая, колющаia или жгучая, а иногда и тупая боль, которая распространяется нерѣдко на мочевой пузырь, дѣтородныя части, мошонку и пр. и умножается не столько отъ давленія, какъ отъ потрясенія тѣла при кашлѣ, рвотѣ, чиханіи, хожденіи и пр. заставляя болниаго лежать неподвижно на спинѣ. Сверхъ сего въ поясничной сторонѣ замѣчается чувство жара, а иногда сжатія либо раздирашенія. Моча вытекаетъ по каплямъ, обыкновенно бываетъ малоколичественная, красная, кровянистая, а если воспаляются обѣ почки, то отдѣленіе ея совершенно прекращается. Въ некоторыхъ случаяхъ одинакожъ она представляется водянистою и прозрачною и отлагаетъ на дно сосуда бѣлый единобразный осадокъ, либо камешки, подобные песку.

Къ сочувственнымъ явленіямъ относятся: сжатіе яичка и поднятіе его вверхъ къ брюшному кольцу, также онемѣніе яичка той стороны, на которой воспалена почка; отрыжка, выхождящіе вѣтровъ, тошнота и рвота,

чувство сжатія подъ ложечкою, боли и вздутие живота, повось съ натугами, сухость языка, болѣе или менѣе сплюшная жажда, жилобіеніе полное, твердое, а иногда малое и перемежающееся. Состояніе кожи не представляетъ ничего постояннаго: обыкновенно она бываетъ сухая и жгучая, иногда же покрытая потомъ, который, при совершенномъ прекращеніи мочеотдѣленія, принимаетъ иногда амміачный запахъ. Въ иѣкоторыхъ случаяхъ замѣчена также икота, сухой кашель, трудное дыханіе, боль головы и безсонница.

§ 338.

Воспаленіе почекъ имѣетъ либо *острое теченіе*, оканчивающееся въ 7 или покрайнѣй мѣрѣ въ 14 дней, наппаче если оно оказывается въ сильной степени; либо *медленное, скрытое теченіе*,—въ какомъ случаѣ боли бываютъ тупыя и припадки вообще неявственные такъ, что воспаленіе сіе, по причинѣ случающагося при ономъ скуднаго отдѣленія мочи и водянистыхъ опухолей на тѣлѣ, принимается часто за водянную болѣзнь. Только въ томъ медленномъ воспаленіи, которое произраждается отъ камней, боли бываютъ очень сильны.

Исходы воспаленія почекъ суть:

- 1.) *Разрѣшеніе*, слѣдующее при выхожденіі обильной, мутной, часто кровянистой, а потомъ прозрачной мочи съ сильнымъ слизистымъ и даже гноеобразнымъ осадкомъ, также при наступленіи обильнаго пота, а иногда текучаго почечуя, или мѣсячнаго очищенія.

2.) *Нагноеніе*, случающееся чаще всего, оказывается при бьющихся боляхъ въ почечной сторонѣ и при озобѣ, происходящемъ отъ почекъ. Гной при семъ: а.) либо испражняется съ мочею, составляя чрезъ внутреннее соединеніе съ нею единобразную очень мутную жидкость, смѣщенную также съ кровью, (чѣмъ и отличается отъ того гноебразнаго осадка, который появляется при разрѣшеніи воспаленія); б.) либо остается въ существѣ почекъ, не выходя съ мочею и образуетъ т. н. почечную чахотку (*phthisis renalis*); с.) либо пролагаетъ себѣ путь къ наружѣ; д.) либо просачивается между поясничными мышцами и опускается къ пахамъ и пр.

3.) *Отвердѣніе* есть рѣдкій исходъ воспаленія почекъ и узнается по чувству давленія и тяжести въ сторонѣ почекъ, а иногда примѣчается и посредствомъ ощущенія.

4.) *Антоновъ огонь* произрастаетъ преимущественно въ томъ случаѣ, когда воспаленіе происходитъ отъ почечныхъ камней. Узнается онъ изъ общихъ признаковъ антонова огня (§ 69), также изъ выхожденія съ мочею черноватыхъ, гнилыхъ темныхъ катышковъ, а иногда изъ совершенного прекращенія мочеотдѣленія.

Смерть можетъ приключаться здѣсь какъ во время самого воспаленія отъ жестокости припадковъ, такъ и по переходѣ его въ другія болѣзни, особенно въ чахотку, какъ слѣдствіе нагноенія и въ водянную болѣзнь, какъ слѣдствіе отвердѣнія почекъ.

§ 339.

Причины. Воспаленіе почекъ гораздо чаще случает-

ся у взрослыхъ, нежели у дѣтей и старииковъ, чаще у мущинъ, нежели у женщинъ, чаще въ холодныхъ, нежели въ жаркихъ странахъ и притомъ наиболѣе у особъ, рожденныхъ подагриками и страдавшими ревматизмомъ.

Изъ слугайныхъ пригнѣвъ частѣйша суть: виѣшнія насилия, дѣйствующія на почки к. т. удары и паденія на почечную сторону, раны, проникающія въ существо почекъ, иногда сильныя потрясенія тѣла при танцахъ, во время верховойъ ъезды, при дальнихъ поѣздкахъ въ слишкомъ тряскомъ экипажѣ и по дурнымъ дорогамъ. Къ довольно перѣдкимъ причинамъ относятся также всѣ вещества, дѣйствующія раздражающимъ образомъ на почки, особенно при излишнемъ употреблѣніи, какъ напр. спаржа, петрушка, лукъ, иѣкоторые соли и кислоты, крѣпкое пиво, молодыя вина, особенно мозель-виенъ и шабли, спиртные напитки: ромъ, коньякъ и аракъ, а изъ лѣкарствъ терпентинъ, испанскія мушки, вообще всѣ острый мочегонительныя средства. Весьма часто дѣйствуютъ на произведеніе сей болѣзни вдругъ произшедшее приостановленіе накожной испаринъ, отступившій составоломъ и почечуй; распространеніе воспаленія ближайшихъ органовъ, присудствіе въ почкахъ глистъ, острокопечныхъ камней и пр.

§ 340.

Предсказаніе въ остромъ воспаленіи почекъ гораздо благопріятнѣе, нежели въ медленномъ, потому что первое удобно узнается и следственно заблаговременнѣе

можетъ быть уничтожаемо; между тѣмъ, какъ послѣднее, проходя очень скрытно, воспринимаетъ неблагопріятные исходы. Впрочемъ здѣсь весьма много зависитъ также отъ удобства уклонять причины, производящія воспаленіе,—и потому, гдѣ камни почечные бывають тому причиною, тамъ предсказаніе всегда дурное. При переходѣ въ нагноеніе, благополучное или неблагополучное окончаніе болѣзни опредѣляется потому, какой путь воспринимаетъ гной для испражненія его къ наружу.

§ 341.

Лѣченіе. а.) По причинамъ показаніямъ должно стараться удалять всѣ вещества, кои могутъ дѣйствовать раздражающимъ образомъ на почки: слѣдствѣнно отнюдь недавать никакихъ раздражающихъ почки напитковъ, а только самые пѣжные, оболакивающіе, какъ отварь перловыхъ, рисовыхъ, овсяныхъ крупъ, миндальное, маковое, конопляное молоко и пр., наблюдая при этомъ, чтобы и таковые напитки небыли принимаемы въ слишкомъ обильномъ количествѣ, отъ коего процессъ отдѣленія мочи можетъ увеличиться и привести органы въ большое напряженіе, особенно если воспалены обѣ почки. Въ самомъ даже предписаніи лѣкарствъ нужно поступать съ большою осторожностию, назначая противувоспалительныхъ солей, имѣющихъ мочегонительную силу, какъ селитра, винный камень и пр., а въ нарывныхъ средствахъ избѣгая всячески шпанскихъ мухъ, и замѣния ихъ горчичнымъ тѣстомъ. Вмѣстѣ съ симъ

предписывается строгая диета, избежание соленой и пряной пищи, спиртныхъ напитковъ, копченыхъ и маринованныхъ кушаньевъ при соблюдении совершеннаго спокойствія.

б.) *По существеннымъ показаниямъ въ острыхъ воспаленіи* предписывается противовоспалительный способъ во всей его силѣ. Сюда относятся: общія кровопускания, на первый разъ довольно сильныя и повторяемыя, смотря по надобности; приложение нѣсколькихъ кровососныхъ банокъ къ поясничной сторонѣ, или припущеіе пьявокъ къ проходу и проходной промежности. Изъ внутреннихъ средствъ наибольшую пользу доставляетъ услащенная хлористая ртуть вмѣстѣ съ экстрактомъ белены и оболакивающими, слизистыми или масляными лѣкарствами, между коими эмульсія изъ маковыхъ и конопляныхъ сѣяній занимаетъ преимущественное мѣсто. По уменьшѣніи силы воспаленія можно приступитьъ къ употребленію отводящихъ средствъ на нижнихъ конечностяхъ, безъ всякихъ примѣсей испанскихъ мухъ. Особенную пользу въ семъ отношеніи доставляетъ накапываніе горячаго камфорного масла на поясничную сторону (*Roche*) и легкое послабленіе на низъ, производимое впрочемъ съ большою осторожностью.

Въ медленномъ, хроническомъ воспаленіи весьма хорошо дѣйствуютъ припарки на поясницѣ изъ толченыхъ чечевичныхъ сѣяній и углекислота въ минеральныхъ водахъ и другихъ формахъ. Преимущественное одобрение заслужили пилюли *Beddoes*, составляемыя изъ двухъ драхмъ углекислой сухой соды, травы

болиголова и мыла и принимаемыя 4 раза въ день отъ 6 до 12 грань.

с.) *По припадожнымъ показаніямъ.* Запоръ на низъ, сопровождающій всегда почти сіе воспаленіе, уничтожается наилучше клещевиннымъ масломъ (ol. ricini), а боли въ брюхѣ и коркевые припадки умѣряются общою теплою ванною въ 28—30°, прикладываніемъ теплыхъ смягчающихъ припарокъ и примочекъ изъ отвара льняныхъ сѣяній и болиголова. Противъ труднаго мочегонспусканія, если воспаленіе причинено испанскими мушками, назначается наружное и внутреннее употребленіе камфоры. Въ такомъ случаѣ большое облегченіе доставляетъ обмываніе разведенными камфорнымъ спиртомъ мошонки, проходной промежности и уда.

Для уменшения нагноенія въ погкахъ, если гной выходитъ съ мочею, рекомендуется молочная сыворотка, миндальное молоко, известковая вода съ молокомъ, Зельтерская, Фахингерская, Гейльнаерская воды съ свѣжимъ сывороточнымъ молокомъ, также мирра (N 71.), бальзамъ копайника, перуанский бальзамъ, листья толокнянки, исландскій мохъ, хина, желѣзные составы; впрочемъ съ раздражающими почки, напаче съ бальзамическими средствами должно поступать съ осторожностю. Если гной пролагаетъ путь чрезъ брюшную стѣну къ наружи, то надлежитъ споспѣшствовать созрѣванію нарыва и вскрывать его какъ можно скорѣе.

Воспаление шуламъ.(*Orchitis*).

Син. Воспаление мужескихъ яичекъ; *inflammatio testiculorum, testitis, didymitis, hernia humoralis*.

Болѣзнь сїя случается довольно часто, но поражаетъ большою частію только одно яичко и притомъ чаще лѣвое, нежели правое. Въ явленіяхъ своихъ она обнаруживаетъ двѣ формы: *острую* и *хроническую*.

A.) **Острое воспаление яичекъ.**(*Orchitis acuta*).

§ 342.

Явленія. Въ *сочувственномъ* воспаленіи, раждающемся при страданіяхъ въ мочевыхъ путяхъ, первый припадокъ составляетъ раздраженіе въ перепончатой или предстательно-желѣзистой части мочеиспускательного канала, оказывающееся чувствомъ какъ будто нѣсколько капель мочи задержалось въ началѣ мочеваго ствола; послѣ сего появляется возвышенная чувствительность въ сѣмяниномъ канатикѣ и брюшномъ кольцѣ, такъ же опухоль и боль въ прибавкѣ яичка, наконецъ страданіе распространяется на самое яичко.

Въ другихъ же *идиопатическихъ* случаяхъ, болѣнь начинается въ самомъ яичкѣ непосредственно, при чёмъ оно распухаетъ въ два или въ три раза болѣе натуральнаго состоянія и дѣлается столь чувствительнымъ, что не можетъ переносить давленія ляшки. Боль бываетъ тупая, но весьма несносная, подобна той, какая ощущается при ущемлѣніи яичка. Боль и опухоль распространяются вдоль семинаго канатика въ паховой каналѣ, отъ чего рождается непріятное чувство въ пахахъ, въ подвздохахъ и внутренней поверхности ляшки большой стороны. По причинѣ сообщенія между сѣмянными, почечными и желудочными нервами, рождается сочувственное страданіе брюшныхъ органовъ: колика въ кишкахъ, тошнота, рвота, упорный запоръ на пизѣ и проч. Иногда затрудняется испражненіе мочи и дѣлается частый позывъ къ оному. Мощонка бываетъ толще и краснѣе обыкновеннаго и вены оной отъ наполненія кровью представляются явственнѣе. Прибавокъ (*epididymis*) распухаетъ гораздо сильнѣе, пежели яичко, вѣроятно отъ того, что покровы на немъ не столь плотны. Сѣмянной канатикъ дѣлается толще и чувствительнѣе и, будучи сжимаемъ сухою жилою внутренней косой мышцы брюха, причиняетъ весьма непріятное чувство; въ нѣкоторыхъ случаяхъ обнаруживается также судорога *musculi cremasteris*. Когда мѣстные припадки очень усилията, то къ онымъ присоединяются общія страданія, обнаруживающіяся въ формѣ воспалительной горячки. Языкъ бываетъ очень обложенъ, жилобіеніе скорое и твердое, кожа горячая, испражненіе низа задержанное и выпущенная кровь изъ руки покрывается воспалительною плевою.

§ 343.

Исходы. а.) *Разрѣшеніе* удается часто, хотя не всегда бываетъ совершение, ибо прибавокъ и даже самое яичко, увеличившись болѣе обыкновенаго, остаются не рѣдко въ такомъ состояніи, не безъ вреда для здоровья, на вѣсколько лѣтъ. б.) *Нагноеніе* случается очень рѣдко и притомъ въ идиопатическомъ только воспаленіи. Гной заключается подъ белочкою оболочкою, которая, по причинѣ плотности своей, не скоро уступаетъ дѣйствію онаго и потому нарывъ, даже послѣ обнаруживанія зыбленія, довольно долго еще не вскрывается. Вскрытие же его происходитъ обыкновенно во многихъ мѣстахъ, въ коихъ оказываются свищевые ходы, испражняющіе сѣмя и гной и очень затрудняющіе лѣчение (*A. Куперъ*). Если нарывъ образуется въ самомъ яичкѣ, то въ отверстіи онаго каждый день появляются пепельносѣрыя полоски, кои могутъ быть ежедневно вынимаемы въ большомъ количествѣ изъ нарыва (*Kirkland, Rust, Chelius*). с.) *Отвердѣніе* послѣ разрѣшенія есть частѣйшій исходъ сей болѣзни, по причинѣ желѣзистаго устройства яичекъ. Иногда оно бываетъ доброкачественное, а иногда перераждается въ хроническое распуханіе (*saicocele*), либо въ скирръ. Во многихъ случаяхъ оно зависитъ только отъ сращенія между собою оболочекъ яичка. д.) *Серозное выпотливаніе*, при которомъ образуется водяная болѣзнь въ мешокъ, принадлежащий къ рѣдкимъ исходамъ. е.) *Изъяніе яичка*, какъ послѣдствіе воспаленія, замѣчено

было также некоторыми авторами. f.) *Антопосъ огонь* оказывается либо въ слѣствіе худосочія, либо отъ ущемленія сѣмяннаго канатика въ брюшномъ кольцѣ и неправильнаго лѣченія.

§ 344.

Распознаваніе. Острое воспаленіе шулять въ возвышенной степени имѣть большое сходство съ ущемленію монеточкою грыжею, которая сопровождается также тошнотою, рвотою, коликою, запоромъ на низъ и мѣстными припадками, похожими на воспаленіе. Впрочемъ при воспаленіи опухоль бываетъ тверже, очертаніе оной отличное и боль въ самомъ яичкѣ гораздо сильнѣе. Поелику при ущемленной грижѣ раждается всегда непреодолимый запоръ на низѣ, а при воспаленіи, хотя и существуетъ онъ, но легко можетъ быть уничтожаемъ приличными лѣкарствами, то въ совершенно сумнительныхъ случаяхъ, для вящшаго удостовѣренія, лучше всего тотчасъ поставить промывательное, или предписать слабительное и изъ дѣйствія оныхъ решать сумнѣніе.

Накопленіе крови во влагалищной оболочкѣ яичка (*haematocele*) можетъ быть такъ же смѣшиваемо съ воспаленіемъ онаго; но болѣй при семъ гораздо менѣе страждеть и, при точнѣйшемъ изслѣдованіи, всегда можно открыть признаки, отличающіе таковое накопленіе отъ воспаленія. *Sarcocelle*, *hydrocele*, *fungus medullaris* et *cancer testiculi* могутъ быть такъ же отличаемы по про-

должительному течению и по недостатку чисто воспалительныхъ явлений.

§ 345.

Причины. Болѣзнь сія произраѣдается либо сочувствио отъ раздраженій въ мочевыхъ путяхъ, либо отъ вліяній, непосредственно дѣйствующихъ на яичко, либо отъ переносовъ. Къ *причинамъ сочувственнымъ* относятся: перелойное воспаленіе мочеиспускательного канала, особенно въ періодѣ послабленія, употребленіе стягивающихъ или раздражающихъ впрыскиваний, насильственное введеніе катетера, либо врачебныхъ свѣчекъ, вооруженныхъ факимъ средствомъ, раненіе предстательной желѣзы при операциіи для извлечения мочепузырныхъ камней, воспаленіе шейки мочеваго пузыря, давленіе мочепузырнаго камня на устье мочеиспускательного канала, равно какъ и присудствіе камня въ мочеточникахъ. *Причины, дѣйствующія непосредственно* на произведеніе сего воспаленія суть вѣнчнія насилия: удары, ушибы, ущемленія во время верховой Ѣзды, раны, проникающія въ самое яичко, проколы посредствомъ ланцета, или троакара при водяной болѣзни въ мочонкѣ, ношеніе грыжеваго бандажа при такой грѣжѣ, которая сопряжена съ выхожденіемъ яичка вверхъ изъ мочонки; сверхъ сего сюда же относится скорое смененіе температуры и мгновенный переходъ отъ слишкомъ теплого къ очень легкому одѣянію, обмываніе яичекъ холодною водою при разгоряченіи тѣла, холодная ванна послѣ патужнаго движенія тѣла, чрезмѣрие воз-

бужденіе дѣтороднаго побужденія при не возможности удовлетворять опое. Что касается до *переносовъ*, то частѣйшіе изъ нихъ суть: отложеніе перелойнаго страданія на яички при уничтоженіи его въ мочеиспускательномъ каналѣ, перенось воспаленія околоушныхъ желѣзъ, также геморроидальнаго и ломотнаго страданія.

§ 346.

Предсказание. Сильное воспаленіе яичекъ составляетъ довольно важную болѣзнь, которая, распространяясь иногда вдоль сѣмяннаго канатика въ брюхѣ, можетъ причинять воспаленіе брюшины и кишокъ, либо переходить въ опасное по своимъ послѣдствіямъ отвердѣніе. Впрочемъ легкіе случаи, при коихъ страждеть болѣе прибавокъ яичка и сѣмянной канатикъ удобно разрѣшаются безъ всякихъ послѣдствій. Люди, страдавшіе прежде сею болѣзни, при малѣйшемъ поводѣ, удобно опять поражаются опою.

§ 347.

При *лъгнѣ* должно сообразоваться съ причинами болѣзни, противудѣйствовать воспаленію мѣстными и общими средствами и обращать особенное вниманіе на исходы его.

А.) *По причиннымъ показаніямъ.* Если воспаленіе шулять произошло отъ прекращеннаго перелойнаго теченія, то теплые припарки, прикладываемыя къ дѣто-

родному уду съ надлежащимъ подвязываніемъ мошонки, большою частію возстановляютъ теченіе изъ мочеиспускателнаго канала и тѣмъ умѣряютъ страданіе яичекъ. Воспаленіе, причиняемое механическими вліяніями, хотя по свидѣтельству иѣкоторыхъ авторовъ лучше переносить холодныя примочки, однакожъ новѣйшия опыты доказали, что и въ семъ случаѣ теплыя припарки гораздо болѣе соотвѣтствуютъ цѣли (*Astley Cooper*). Если причиною болѣзни геморрой, то пьявки, приставляемыя къ проходу доставляютъ всегда весьма хорошую услугу. При явственномъ содѣйствіи ревматизма или составолома на произрожденіе воспаленія влажность мѣстныхъ лѣкарствъ не можетъ быть терпима, а только сухіе травяные мѣшечки, вощенка, фланель, шатираемая камфорою и пр. также подкуриванія можжевеловыми ягодами, курительными порошками (*species ad suffiendum*), припущеніе паровъ и проч. Для отведенія страданія могутъ быть предписываемы нарываы и красноту наводящія средства на ляшкахъ. Иногда болѣзнь сія проходитъ отъ раздраженій въ мочевыхъ путяхъ, отъ введенія катетера, бужей и пр.; въ такомъ случаѣ, нужно тотчасъ удалить постороннія раздраженія: *sublata causa tollitur effectus*.

B.) *По существеннымъ показаніямъ* надлежить противудѣйствовать воспаленію мѣстными и общими средствами.

1.) Изъ мѣстныхъ средству отличное дѣйствіе оказываетъ поднятие и поддерживаніе яичекъ къ верху посредствомъ приличной повязки, особенно сложеннаго трехугольникомъ платка. По положеніи таковой повязки

необходимо нужно, что бы больной находился въ горизонтальномъ положеніи и лежалъ на спинѣ. Весьма полезно такъ же припущеніе пьявокъ къ проходной промежности, къ верхней части ляшекъ или къ самой мошонкѣ отъ 10-15 штукъ, повторяемое въ первое время воспаленія иѣсколько разъ, смотря по надобности. Вскрытие на мошонкѣ посредствомъ ланцета 3—4 veinъ испражняетъ достаточное количество крови (3—4 унц.) и доставляетъ скорѣйшее облегченіе (*A. Куперъ*). Послѣ испражненія, крови можно предписывать для обмывашки страждущихъ частей растворъ уксусо-кислого свинца (N 510.) Примочки или обмыванія изъ винного уксуса, изъ уксусо-кислого амміака, изъ раствора нашатыря (N 25.) доставляютъ ту пользу, что при испареніи своею развиваются холода и умѣренныя раздраженія отвлекаютъ кровь отъ личекъ къ мошонкѣ. По прошествіи иѣсколькихъ дней теплый припарки составляютъ лучшія разрѣшающія средства, кои, раздражая своею теплотою всасывающіе сосуды, дѣйствуютъ на удаление жидкости, отдѣленной воспалительнымъ процессомъ. Припарки таковыя должны быть жидкі, иначе тяжестью своею могутъ причинять большое отягощеніе. Для составленія ихъ можетъ служить бѣлый хлѣбъ, овсяная либо льняная мука, варимыя съ молокомъ или съ водою. Впрочемъ отъ выбора таковыхъ ингредиенцій мало зависитъ, ибо здѣсь, по видимому, дѣйствуетъ преимущественно теплота и влажность. Иѣкоторые для укрощенія болей примѣщиваютъ къ припаркамъ растворъ уксусо-кислого свинца, траву болиголова, белены, одурника (N 48.) и проч.

Подъ конецъ воспаленія, когда болѣзнь начинаетъ дѣлаться хроническою, превосходное дѣйствіе оказываютъ тепловатыя ванны. Въ сie время приличны такъ же разрѣшающіе пластыри (N 135), какъ напр. *emplastrum hydrargiri, conii, dyachylon* и пр. сами по себѣ, либо съ камѣрою и опіемъ. Въ такомъ случаѣ днемъ можно дѣлать теплые припарки, а напочь прикладывать пластиры. Если по устраненіи всѣхъ воспалительныхъ припадковъ остается еще некоторая твердость въ яичкѣ и прибавкѣ онаго, то не должно оставлять употребленія означенныхъ пластырей и носить подвязку (*suspensorium scroti*).

2.) *Общія средства* должны такъ же соотвѣтствовать противовоспалительной цѣли лѣченія. Больному нужно соблюдать возможное спокойствіе, находиться непремѣнно въ горизонтальномъ положеніи, покрайней мѣрѣ дотолѣ, пока умѣрится сила воспаленія, избѣгать горячительной пищи и напитковъ, кушать очень умѣренно и содержать себя въ прохладной температурѣ. Кровопусканія изъ руки потребны только въ очень сильномъ воспаленіи, для уничтоженія флогистического расположения, при угрожающей опасности распространенія воспалительнаго страданія на брюшину и кишкі. Изъ противовоспалительныхъ лѣкарствъ наилучшія суть тѣ, кои способствуютъ умѣренному испражненію на пизъ, какъ сѣриокислая соли, (N 20), фосфорокислый патръ (N 15), тамарицы (N 13), манна съ александрийскимъ листомъ (N 101). *pulpa prunorum, electuarium lenitivum* etc. Возбужденіе тошноты и рвоты при семъ воспаленіи, такъ какъ и при другихъ страданіяхъ яичекъ, оказываетъ

весьма хорошее дѣйствіе; паипаче послѣ предшествовавшихъ кровоизпражненій и при существующихъ нечистотахъ въ желудкѣ. Впрочемъ должно замѣтить, что у особъ, страждущихъ первою слабостію продолжительный ослабляющій способъ лѣченія не соотвѣтствует цѣли,—и потому, если жилобіеніе скорое, болѣй очень раздражителенъ и въ страждущей части обнаруживаются чрезмѣрныя боли, то лучше всего предписывать услащенную хлористую ртуть съ Доверовымъ порошкомъ (A. Куперъ).

C.) Что касается до исходовъ сего воспаленія, то на онѣ надлежитъ обращать особенное вниманіе. Если появляются признаки нагноенія, то теплые примочки и припарки суть лучшія лѣкарства, но для ограничепія процесса нагноенія и воспащенія дальнѣйшему разрушенію существа яичекъ, можно приставлять и пьявки. Коль скоро же примѣтио будетъ скопленіе гноя, то нужно испразнить оный посредствомъ вскрытия лапцетомъ;—въ противномъ случаѣ существо яичка можетъ потерпѣть большое разрушеніе и нарывъ вскроется во многихъ мѣстахъ, отъ чего и самое излѣченіе болѣзни можетъ на долго продлиться.

При умноженіи обѣяности и отвердѣлости яичка, остающихся послѣ воспаленія, могутъ быть предписываемы сначала припарки изъ виннаго уксуса и овсяной муки либо обмываніе изъ наливки набора разѣшающихъ травъ съ нашатыремъ и уксусомъ, такъ же втирание *cera f saponis Phar. univers. Unguenti et limimenti hydrargirii*, либо *unguenti hydrojodatis potassae* и проч. Превосходное средство составляетъ также въ

семъ случаѣ англійская вощеная тафта, изъ которой можно приготавлять поддергивающую повязку для шулять. Разрышающіе пластири (N 135), оказываютъ также значительную пользу. Внутреннее лѣченіе, самое лучшее состоитъ въ малыхъ пріемахъ сулемы (*A. Куперъ*), испекакуанника въ томпнотворныхъ пріемахъ (N 104), услажненной хлористой ртути и наперстянки (N 26). Настойка ѹодина можетъ быть полезна, но требуетъ величайшей осторожности при употреблениі. Если подозрѣвается венерическая причина такового исхода, то надлежитъ прибѣгнуть къ методическимъ ртутнымъ втираниемъ и теплымъ валинамъ, либо употреблять настоятельно pil. hydrargiri submuriat. comp. Ph. Lond., давая ихъ ежедневно отъ 3 — 10 и болѣе по утру и вечеромъ съ сложнымъ отваромъ сарсанарили.

Переходъ *въ Антоновъ огонь* случается при жестокомъ воспаленіи личка и сѣмяннаго канатика, особенно если брюшное кольцо имѣетъ необыкновенную узкость и неподана была во время надлежащая помощь. Въ та- томъ случаѣ, буде можно съ достовѣрностію предполагать ущемленіе сѣмяннаго канатика, ничего болѣе не остается, какъ предпринимать операцио грыжесѣченія т. е. разрѣзать брюшное кольцо въ мѣстѣ его ущемленія. Когда же при семъ окажется дѣйствительно антоновоогненное состояніе, то потребно сдѣлать еще нарезы для уничтоженія распухлости частей, а если не смотря на то антоновъ огонь будетъ болѣе и болѣе распространяться, то лучше всего сдѣлать отсѣченіе личка (*Boyer*), дабы предупредить распространеніе антонова огня на брюшную внутренности.