

**Orchis elegans Heuff. und deren Hybride mit Orchis coriophora L.
in der Flora Russlands.**

von K. Ugrinsky.

**Orchis elegans Heuff и его помѣси съ
Orchis coriophora L. въ русской флорѣ.**

К. А. Угринскій.

Встрѣчающійся въ окрестностяхъ Харькова *Orchis* изъ подрода *Euorchis* съ овальными клубнями, длинно-заостренными, вверхъ стоящими листьями и рыхлымъ длиннымъ соцаѣтіемъ пурпурно-лиловыхъ цвѣтовъ первоначально былъ опредѣленъ мѣстными систематиками, какъ *Orchis mascula* L. ¹⁾, съ которымъ наше растеніе въ дѣйствительности вовсе не сходно. Позже это растеніе фигурируетъ подъ именемъ *O. laxiflora* Lam ²⁾. Далѣе, въ 1910 г. опубликована моя замѣтка ³⁾, въ которой, затрудняясь отождествить наше растеніе съ какимъ-либо изъ 2-хъ сходныхъ западно-европейскихъ *Orchis*'овъ: *O. palustris* Jacq. или *O. laxiflora* Lam. (= *O. ensifolia* Vlll.), я констатировалъ, все же, относительно большее сходство съ послѣднимъ видомъ.

Въ послѣдующіе годы, съ одной стороны, наблюдавъ это растеніе русской флоры въ иныхъ мѣстахъ Харьковской губ., и получивъ гербарные экз. его изъ Крыма отъ И. В. Ванькова, изучивъ, наконецъ *O. laxiflora* гербарія Р. Фл. изд. Имп. Ак. Наукъ (изъ Полтавской губ.), съ другой стороны, въ результатѣ

¹⁾ Gromow. Enum. stirp. agri charcoviensis. Тр. О. Наукъ Х. Университета т. I. 1817. р. 136—154.

²⁾ Черняевъ, Conspectus etc. р. 62. № 1412; Наливайко, Списокъ и т. д. въ томѣ 33 Тр. О. И. Пр. при И. Х. Унив. р. 122 № 741.

³⁾ Угринскій, Критич. замѣтка и т. д. въ т. 43 Тр. О. Исп. Пр. при И. Х. Унив. 1910.

дальнѣйшаго обмѣна мнѣній съ двумя западно-европейскими специалистами: E. G. Samus въ Парижѣ и Dr. G. Keller въ Аарау, я составилъ себѣ, мнѣ кажется, опредѣленный взглядъ на систематическое положеніе нашего *Orchis*'а, и считаю цѣлесообразнымъ опубликовать свои выводы, и заодно описать наблюдавшіеся у насъ гибриды этого *Orchis*'а съ *O. coriophora* L.

I. *Orchis elegans* Heuffel.

Современные систематики расчленяютъ сборный видъ прежнихъ авторовъ *Orchis laxiflora* Lam. на нѣсколько меньшихъ единицъ; наиболѣе характерны слѣдующія: *O. ensifolia* Vill., *O. elegans* Heuff. и *O. palustris* Jacq. Намѣтитъ характеристики этихъ 3-хъ единицъ можно приблизительно слѣдующимъ образомъ.

***O. palustris* Jacq.**, повидимому, довольно хорошо характеризуется средней долей губы, превышающей боковую или, по крайней мѣрѣ, имъ равную. Листья у этого вида обыкновенно очень узкіе и немногочисленны, (—однако, бываютъ исключенія). Доли околоцв. короче, чѣмъ у *O. ensifolia* Vill.

Для ***O. ensifolia* Vill.** характерны: отсутствіе или слабое развитіе средней доли губы; бóльшая длина и оттопыренность долей околоцв.; бóльшая ширина листьевъ, которая часто бываетъ нѣсколько сближена у основанія стебля, отъ котораго они болѣе или менѣе отогнуты; шпора длинная и узкая, иногда изогнутая и на концѣ булавовидно вздутая; кисть *очень* рыхлая, немногочвѣтная. Цвѣтетъ этотъ видъ нѣсколько раньше *O. palustris* Jacq.

***O. elegans* Heuff.** отличается: губой сильно измѣнчивой, какъ въ отношеніи размѣровъ, такъ и въ отношеніи очертаній и въ частности развитія средней доли; въ отношеніи губы этотъ видъ обыкновенно бываетъ ближе къ *O. palustris* Jacq., но во всѣхъ остальныхъ отношеніяхъ никакъ не можетъ быть отождествляемъ съ послѣднимъ. Листья у *O. elegans* Heuff. еще шире, чѣмъ у *O. ensifolia* Vill., они разсѣяны по стеблю и достигаютъ основанія соцвѣтія. Кисть обыкновенно длинная (до 1 фута) и богата цвѣтами, собранными гораздо болѣе густо, чѣмъ у *O. ensifolia* Vill. *O. elegans* Heff. очерченъ, какъ будто, наименѣе полно, и этимъ объясняется тотъ фактъ, что нѣкоторые систе-

матики соединяють его съ *O. palustris* Jacq.¹⁾ Однако, самостоятельность *O. elegantis* Heuff. подчеркивается, по моему мнѣнію, отношеніемъ его ореала распространенія къ таковому *O. ensifoliae* Vill. и *O. palustris* Jacq. Именно, распротр. этихъ видовъ въ общемъ (по Gandoger'у Nov. Con. El. Eur. 1910. p. 462) таково: *O. ensifolia* Vill. и *O. palustris* Jacq обитаютъ въ средн. и южн. Европѣ, *O. elegans* Heuff—въ восточной. Наши русскія мѣстонахожденія являются продолженіемъ венгерскихъ.

Ни одинъ изъ видѣнныхъ мною экз. растенія южной Россіи не можетъ быть отождествленъ ни съ *O. ensifolia* Vill., ни съ *O. palustris* Jacq., но всѣ они принадлежатъ къ одному и тому жд типу, весьма близкому къ *O. elegans* Heuff или м. б. вполне съ нимъ идентичному—таково мнѣніе Е. Г. Camus'a, D. G. Keller'a и мое. Растенія изъ Крыма слегка отличаются отъ растеній Харьковской губ. только въ томъ отношеніи, что прицвѣтники у нихъ развиты сильнѣе,—и въ этомъ смыслѣ крымскіе экз. еще ближе къ венгерскимъ. Вообще же говоря, всѣ извѣстные мнѣ экз. изъ Россіи имѣютъ полное основаніе именоваться ***O. elegans* Heuffel.**

Рисунокъ нашего р. помѣщенъ на таблицѣ, изображающей такимъ образомъ: *O. elegans* Heuff. изъ Харькова, *O. ensifolia* Vill. изъ Далмаціи и *O. palustris* Jacq. изъ Швейцаріи. Считаю, поэтому, излишнимъ иллюстрировать *habitus* нашего р., я прилагаю здѣсь только фотографію соцвѣтія и рисунокъ отдѣльнаго цвѣтка, какъ необходимое дополненіе къ упомянутой таблицѣ.

Гибриды *O. elegans* Heuff. съ *O. coriophora* L.

Еще въ 1906 году я нашелъ въ окр. с. Каменнаго Orichis, который, по моему мнѣнію, долженъ былъ быть опредѣленъ, какъ *O. elegans* × *coriophora*. Для увѣренности въ своемъ мнѣніи я посылалъ наше р. западно-европейскимъ специалистамъ, которые вполне согласились съ моимъ опредѣленіемъ. Между посланными мною въ 1907 г. въ свѣжемъ видѣ Е. Г. Camus'у въ Парижѣ гибридами, оказался одинъ экз. съ нѣкоторыми особенностями, опираясь на которыя Е. Г. Camus предложилъ мнѣ назвать эту—новую по его мнѣнію—систематич. единицу и

¹⁾ Ascherson et Graebner in Synopsis d. mitteleurop. Fl. (Bd. III. p. 710—713), даютъ слѣдующую схему подчиненія этихъ системат. единицъ:

O. laxiflorus A. ensifolius { = *B. micrantha*.
B. paluster { — *C. elegans*.

опубликовалъ отъ моего имени предварительный діагнозъ ея въ своей Monogr. d. Orchidées d'Europe etc. (1908. p. 230).

Впослѣдствіи я находилъ гибриды *O. elegans* × *coriophora* въ различныхъ мѣстахъ Харьк. губ., а въ послѣднее время они были найдены въ Крыму И. В. Ваньковымъ, любезно приславшимъ мнѣ на просмотръ свои сборы.

Оставляя пока открытымъ вопросъ относительно «гибридности» найденныхъ мною р.,—вопросъ, экспериментальнымъ рѣшеніемъ котораго я предполагаю заняться въ ближайшемъ будущемъ,—я ограничусь опубликованіемъ описанія упомянутыхъ гибридовъ.

Я различаю 3 типа:

1. Цвѣты и habitus, какъ у *O. parviflora* Chaub., отъ котораго наше р. почти не отличается—***O. pseudoparviflora* Ugr.** 1912 = *O. parviflora* in: К. Угринскій, Замѣтка о нѣкоторыхъ рѣдкихъ р. Харьк. флоры. Тр. О. Исп. Пр. при И. Харьк. Унив. т. 43. 1910. р. 9. № 20 а = *O. parviflora* in: К. Угринскій Мат. къ фл. Ахтырск. у. Харьк. г. Ч. I. Тр. О. Исп. Пр. при И. Х. Ун. 1912. р. 355 № 114. Рисунки: 1) tab. nostra II, 2) въ Иконографіи Орхидей Европы Dr. G. Keller'a.

Встрѣчается чаще другихъ гибридовъ на суховатыхъ лугахъ. Было найдено около: Васищева, Куряжа, Шпаковъ, Каменнаго; с. Чернетчины Ахт. у., и въ Крыму. Южн. берегъ—Лимены (въ герб. И. В. Ванькова).

2. Отличается отъ предыдущаго: 1) кистью болѣе рыхлой; 2) окраской цвѣтовъ, гораздо болѣе блѣдною, сходной съ окраской цвѣтовъ *O. elegantis* Heuff.; 3) наружными долями околоцв. отклоненными другъ отъ друга и не образующими шлема; 4) пятнышками на губѣ болѣе многочисленными, покрывающими большую часть губы—***O. Reinhardii*** ¹⁾ **Ugr.** 1908. in Camus, Monogr. des Orchidées d'Europe etc. p. 230. *O. Reinhardii* in: К. Угринскій Замѣтка о нѣк. рѣдк. р. Харьк. фл. (см. выше) р. 10. № 20 β. Рисунокъ—tab. nostra III.

Встрѣчается значительно рѣже: мною найдено нѣсколько экз. въ окр. с. Каменнаго, Харьк. уѣзда.

3. Цвѣты по величинѣ и окраскѣ и общій habitus растенія напоминаютъ *O. elegans* Heuff., чѣмъ оно и отличается отъ предыдущихъ. Губа очень крупная, округлая, съ большими боко-

¹⁾ Въ честь заслуженнаго профессора Людвигъ Васильевича Рейнгарда.

выми листьями, покрыта крупноватыми многочисл. пятнышками—**O. Kelleriana Ugr.** 1912. ¹⁾—*O. Reinhardii* in: К. Угринский Матер. къ ф. Ахт. у. Ч. I. р. 354 № 113 (см. выше). Рисунокъ—tab. nostra V.

Найдено въ 2-хъ совершенно одинаковыхъ экз. на лугу р. Ворсклы около с. Чернетчины, Ахтыр. у., Харьк. г., 15 июня 1911 г. въ полномъ цвѣту.

Гибридъ, собранный И. В. Ваньковымъ около д. Коккозъ въ Крыму не соотвѣтствуетъ, повидимому, въ точности ни одному изъ описанныхъ здѣсь, но относительно ближе къ *O. pseudoparviflora* Ugr.

¹⁾ Въ честь Dr. Gotfried Keller'a въ Аарау, извѣстнаго знатока орхидныхъ Европы.


F. 3a.



F. 1a.



F. 4.



F. 4.



F. 1.



F. 2.



F. 3



