

ГЛАВА ОСЬМАЯ.

УМАЛЕННЫЯ И ВОСПЯЩЕННЫЯ ОТДѢЛЕНИЯ.

Воспященное испарение кожи.

(*Adiaphoresis, adiaphoresia*).

§ 274.

Подъ симъ названіемъ разумѣется то страданіе, при которомъ накожный органъ, отдѣляющій и испражняющій чрезъ поверхность тѣла не потребныя для него вещества въ парообразномъ или капельномъ видѣ, нарушается въ своей дѣятельности и чрезъ то разстроиваетъ гармонію органическихъ отиправленій.

Страданіе сіе бываетъ троекое: а) *идиопатическое*, зависящее отъ первоначального или непосредственнаго пораженія накожнаго органа; какъ при простудахъ разнаго рода; б) *антагонистическое*, оказывающееся въ слѣдствіе чрезмѣрно усиленшаго дѣйствія другихъ отдѣлительныхъ органовъ, какъ въ хроническихъ поносахъ, чрезмѣрномъ мочетеченіи, водяныхъ болѣзняхъ и пр. с) *припадочное*, сопровождающее горячки, воспаленія, накожные сыпи и раждающееся отъ чрезмѣрного возбужденія и напряженія какъ кожи, такъ и прочихъ системъ тѣла.

§ 275.

Явленія. Совершенная сухость и жесткость кожи съ умноженною полнотою и болѣе или менѣе возвышенною температурою оной, либо напротивъ съ уменьшеною полнотою, блѣдностю, вялостью и сморщиваніемъ; разстройство общаго чувствованія, оказывающееся ощущеніемъ холода, подираніемъ по кожѣ, не пріязненнымъ впечатлѣніемъ на сердечно-душевную способность; устремление и напоръ крови къ внутреннимъ органамъ и происходящее отъ того разстройство кругообращенія, затруднительное дыханіе; неправильное пищевареніе, иногда умноженное отдѣленіе и испражненіе кишечнаго канала, мочевыхъ путей и пр.

§ 276.

Причины. Большая неопрятность и нечистота кожи, отъ коей механически затворяются накожные поры; долговременное пребываніе въ холодномъ, нечистомъ, влажномъ воздухѣ; продолжительное вліяніе суроваго холода; злоупотребленіе холодныхъ ваннъ, стягивающихъ обмываній тѣла; слишкомъ тонкая и легкая одежда, напичкѣ въ женскомъ полѣ; частое и скорое смѣщеніе температуры тѣла; чрезмѣрное возбужденіе и напряженіе кожи отъ слишкомъ раздражающихъ вліяній на оную на пр. непомѣрного жара, острыхъ, Ѣдкихъ и т. п. веществъ, приводящихъ накожный органъ въ судорожное состояніе; превратное дѣйствіе испаряющихся сосудовъ, какъ бываетъ въ подкожной водяной болѣзни;

состраданіе кожи при общемъ воспалительномъ и огневичномъ возбужденіи; антагонистически умноженная дѣятельность какихъ либо отдѣлительныхъ и испражнительныхъ органовъ; сердечно-душевныя возмущенія, наипаче сильный испугъ, страхъ и пр.

Сущность. При воспещеніи накожномъ испареніи гасообразныя части, непотребныя для тѣла, наипаче углетворь и азотъ, задерживаются и скопляются въ ономъ; сверхъ того вхожденіе кислотвора, а можетъ быть, гальванической и электрической матеріи, воспещается и такимъ образомъ надлежащее оживленіе первной системы эфирнымъ началомъ виѣшняго міра умалется (*Jördens*). Вообще, такъ какъ кожа состоить, посредствомъ безчисленныхъ ея нервныхъ вѣтвей, въ тѣсной связи съ общимъ чувствилищемъ и поддерживаетъ безпрестанное вліяніе виѣшняго міра на первую и репродуктивную сферу организма, то нарушеніе нормальной дѣятельности ея можетъ разстроивать всю гармонію органическихъ отправленій и быть источникомъ не только вышеозначенныхъ болѣзненныхъ явлений (§ 275), но и безчисленныхъ другихъ болѣзней, обнаруживающихся какъ въ самой кожѣ, такъ и въ другихъ отдаленныхъ органахъ и частяхъ тѣла.

§ 277.

Леченіе должно быть назначаемо въ семъ случаѣ сообразно состоянію жизнедѣятельности и главному свойству болѣзни. Въ идиопатическомъ страданіи, наипаче при воспещеніи привычныхъ потовъ, нужно стараться,

сколько можно скорѣе, возстановить оные. Здѣсь, при чрезмѣрно возбужденномъ и напряженномъ состояніи кожи, избираются т. н. противувоспалительныя потогонительныя напр. насыщеніе углекислого поташа съ утонченнымъ приемомъ рвотнаго виннаго камня, уксусная кислота, малиновый уксусъ, лимонный сокъ, уксусокислый амміакъ (N 108) съ употребленіемъ притомъ обильнаго количества водянистыхъ, разводящихъ напитковъ. Въ нѣкоторыхъ обстоятельствахъ большую пользу доставляетъ селитра въ достаточныхъ приемахъ, златоцвѣтная сюрма, минеральный кермесъ, либо ипекакуаникъ въ тошнотворныхъ приемахъ; даже обливаніе холодною водою и струистыя ванны. Напротивъ того тамъ, гдѣ жизнедѣятельность кожи слабая и стремленіе соковъ къ периферіи тѣла скудное, предписываютъ съ пользою летуче-раздражающія потогонительныя напр. теплый настой бузинныхъ и ромашковыхъ цвѣтовъ, наливка мауна и змѣевика, liquor ammonii succinici, oleum animale Dipellii, tinctura valerianae ammonia ta, aether sulphuricus camphoratus, мускусъ, камфора, опій, особливо въ соединеніи съ ипекакуаникомъ (N 7). Изъ паружныхъ средствъ весьма хорошо дѣйствуютъ здѣсь теплые ароматическія ванны, парные бани, напаче послѣ предшествовавшаго тренія тѣла раздражающими веществами. При сильномъ напорѣ къ головѣ и груди необходимо нужны теплые пожные ванны и полуванны съ горчицею, либо золою и солью, натирание нижнихъ копечностей tinct. pyretri, t. capsici anui; раздражающими спиртами, прикладываніе крѣпкихъ горчичниковъ и пр.

Въ антагонистическомъ задержаніи испаренія

кожи надобно стараться, при употреблении потогонительного способа лѣченія, воспышать чрезмѣрное отдѣленіе либо испражненіе другихъ отдѣлительныхъ органовъ. Сюда принадлежатъ наипаче хроническіе поносы (§ 227), изнурительное мочетеченіе (§ 252) и подкожная водянная болѣзнь.

Въ припадокъ страданіи сего рода должно противудѣйствовать преимущественно главной болѣзни, отъ коей зависитъ прекращеніе испаринь.

Уменіе и прекращеніе отдѣленія молока.

(Agalactia).

Син: Agalaxis, agalactatio, galactio defectiva *Mason Good.*

§ 278.

Такое название дается тому болѣзненному состоянію, при которомъ въ обыкновенное время кормленія грудью т. е. по разрѣшеніи отъ беременности, молоко либо вовсе не отдѣляется въ женскихъ грудяхъ, либо въ слишкомъ скучномъ количествѣ.

§ 279.

Явленія. Отдѣленіе молока въ женскихъ грудяхъ имѣеть въ семъ случаѣ разныя уклонности. Оно либо, по разрѣшеніи отъ бремени, вовсе не появляется, либо

отдѣляется въ столь маломъ количествѣ, что для прокормленія ребенка потребна еще другая пища, либо отдѣлявшись прежде въ достаточномъ количествѣ, вдругъ прекращается и притомъ или вскорѣ послѣ родовъ, или спустя нѣсколько недѣль и мѣсяцовъ. Груди при семъ могутъ находиться въ двоякомъ состояніи; то въ нераздражительномъ, вяломъ и ослабленномъ, то напротивъ въ твердомъ, болящемъ, очень раздраженномъ. Если молоко теряется постепенно, то большею частію не причиняетъ женщинѣ никакого вреда; ежели же напротивъ того отдѣленіе его прекращается вдругъ, то отъ сего произраѣдается обыкновенно воспаленіе, отвердѣніе и нагноеніе въ женскихъ грудяхъ, равно какъ воспаленіе, выпотѣніе и нагноеніе въ другихъ отдаленныхъ частяхъ (*metastasis lactis*).

Посему и самое *продолженіе* сей болѣзни не одинаково. Тамъ, гдѣ прекращеніе молока рождаются вдругъ, оно продолжается короткое время, нѣсколько дней, или даже нѣсколько часовъ; напротивъ того, гдѣ скудное отдѣленіе развивается медленно, тамъ и самая болѣзнь имѣеть продолжительное теченіе и возстановленіе нормального отдѣленія молока рѣдко возвращается.

§ 280.

Расположеніе къ таковой неправильности отдѣленія молока имѣютъ преимущественно женщины вялые, нераздражительныя, имѣющія флегматическое, одутливо-губчатое сложеніе тѣла, выходящія въ позднихъ лѣтахъ замужъ, либо не кормившія грудью послѣ предшество-

вавшихъ родовъ. *Къ служайнамъ причинамъ* относятся: а) такія вліянія, кои непосредственно поражаютъ грудныя желѣзы, производя въ нихъ чрезмѣрное раздраженіе и самое воспаленіе, какъ напр. простуда и застой молока въ грудяхъ отъ прекращеннаго не во время кормленія младенца; б) чрезмѣрно усиленная дѣятельность и раздраженіе другихъ отдѣлительныхъ органовъ, напаче состоящихъ въ сочувствіи съ женскими грудями. Сюда принадлежать сильныя испражненія при кровотеченіяхъ, простыхъ и натужныхъ попо сахъ, слюнотеченіи, бѣляхъ и пр. также онанія, частое плотское совокупленіе, зачатіе во время кормленія грудью, воспаленіе матки и брюшины при родильной горячкѣ; в) общія ослабляющія вліянія, чрезмѣрныя душевныя и тѣлесныя напряженія, угнетающія страсти, особенно печаль, беспрестанская досада, страхъ, сердечное сокрушеніе, скучная или дурная пища, совершенный голодъ, изнурительныя болѣзни, напр. чахотка и пр.

Изъ сего явствуетъ, что *сущность* сего болѣзнейнаго состоянія можетъ заключаться либо въ воспалительномъ напряженіи грудныхъ желѣзъ, отъ коего собственно прекращается отдѣленіе, такъ какъ и при всякомъ усилившемся воспаленіи какого либо отдѣлительного органа, либо въ антагонистическомъ раздраженіи другихъ органовъ, либо во всеобщемъ ослабленіи жизнедѣятельности, по причинѣ недостаточнаго питанія, или оскудѣнія первной силы.

§ 281.

Предсказание основывается здесь на важности возбуждающихъ причинъ. Прекращеніе молока, происходящее отъ непосредственно на груди дѣйствующихъ раздраженій гораздо малозначительнѣе того, которое произраждается отъ важныхъ антагонистическихъ и ослабляющихъ вліяній. Вообще болѣзнь сія можетъ быть опасною преимущественно чрезъ переносы, а иногда и чрезъ то, что оставляетъ по себѣ отвердѣнія, переходящія послѣ въ ракъ. Часто однокожъ прекратившееся одинъ разъ отдѣленіе молока весьма трудно содѣлать правильнымъ и достаточнымъ.

§ 282.

Лѣченіе. а) *По причинамъ показаніямъ* должно стараться уклонять тѣ болѣзнейшыя состоянія, въ слѣдствіе коихъ произошло прекращеніе отдѣленія. По сему, гдѣ оно зависитъ отъ воспаленія грудей, тамъ нужно противудѣйствовать сему послѣднему внутреннимъ противувоспалительнымъ и наружнымъ смягчающимъ способомъ лѣченія (см. воспал. женскихъ грудей ч. II). Гдѣ же образовалась болѣзнь антагонистическимъ путемъ, тамъ надлежитъ съ одной стороны прекращать чрезмѣрныя раздраженія и испражненія въ отдаленныхъ органахъ; а съ другой возвышать жизнедѣятельность грудей наружными раздражающими средствами, увеличивающими приливъ крови къ онимъ. Если отдѣленіе молока уничтожилось въ слѣдствіе голода и дру-

гихъ ослабляющихъ вліяній, то необходимо нужно до-
ставить кормилицѣ надлежащее питаніе и возбудить
жизнедѣятельность приличными укрепляюще-возбуждаю-
щими средствами. Во всякомъ случаѣ надобно назна-
чить приличную состоянію больной діету, доставлять
въ ночное время надлежащее спокойствіе и сонъ, пору-
чая ребенка надежному присмотру, запрещать плотское
совокупленіе и всякое душевное возмущеніе и, въ случаѣ
угрожающаго затвердѣнія грудей, которое случается на-
иболѣе у первородящихъ, отнюдь не допускать застоя
молока, а испражнять его частымъ кормленіемъ ребенка,
или даже искусственнымъ высасываніемъ его посредствомъ
стеклянныхъ насосцовъ.

b) *По существеннымъ показаніямъ* требуется
противудѣйствовать главному свойству болѣзни. Если она
сопровождается очень возвышеннымъ настроеніемъ жиз-
недѣятельности, чрезмѣрнымъ раздраженіемъ и воспали-
тельнымъ напряженіемъ въ женскихъ грудяхъ, то предпи-
сываются мѣстныя, а иногда и общія кровоотвлеченія,
употребленіе внутрь прохладжающихъ и нѣсколько на-
низъ слабящихъ лѣкарствъ (N 11, 14, 18, 61, 62), а
снаружи смягчающихъ припарокъ и болеутолительныхъ
мазей (N 48, 49). На противъ того, когда уменьшено, или
совершенно прекращенное отдѣленіе молока зависитъ
отъ ослабленной жизнедѣятельности въ женскихъ гру-
дяхъ, то надлежитъ возбуждать первную дѣятельность
и умножать приливъ крови къ онѣмъ, увеличивая при-
томъ всю массу соковъ. Для такового намѣренія слу-
житъ треніе грудей, частое сосаніе ребенка, приклады-
ваніе раздражающихъ пластырей и теплыхъ припарокъ,

даже парыниаго пластира между грудями и сухихъ насосныхъ банокъ, либо электризованіе грудей. Вмѣстѣ съ этимъ груди надлежитъ содержать въ теплотѣ, окутывая ихъ фланелью или хлопчатою бумагою, дѣлать раздражающія ручныя ванны и тотчасъ послѣ оныхъ обвязывать покрѣпче верхнія конечности, а внутрь давать средства, специфически раздражающія грудную же лѣзы к. с. укропныя сѣмена, анисъ, кервель, тиманъ, pulvis fæniculi compositus s. galactopœticus Ph. Br. либо означенный подъ № 99., рекомендуя притомъ обильное употребленіе крѣпительно-питательной пищи, состоящей изъ крѣпкихъ мясныхъ наваровъ, недавно выдоенного молока, лицъ въ смятку, жаренаго мяса, вмѣстѣ съ достаточнымъ количествомъ питья изъ хорошаго сладкаго пива и пр.

При величайшей слабости и параличномъ состояніи нервной системы, послѣ жестокихъ угнетающихъ страстей, или тифозныхъ горячекъ, большую пользу доставляютъ маунъ, змѣевикъ, баранка, бобровая струя, эфиры, амміакъ, камфора, мскусъ, амбра и весь аппаратъ первыхъ средствъ (№ 8, 22, 73, 76).

с). *По припадочнымъ показаніямъ* должно обращать главное вниманіе на переносы, и при дѣятельномъ стараніи возстановить нормальное отдѣленіе молока въ грудяхъ, пользоваться также произшедшее отъ переносовъ страданіе, сообразно существенному его свойству.

Скудое ложе.

(*Acholia*).

§ 283.

Подъ симъ названіемъ разумѣется недостаточное, или воспященное отдѣленіе желчи въ печени, разстроивающее болѣе или менѣе отправленіе пищеварительныхъ органовъ.

§ 284.

Явленія: частая отрыжка, скопленіе вѣтровъ въ брюхѣ, пученіе живота и происходящія отъ того боли, потеря аппетита, рѣдкое испражненіе пиза, а иногда и долговременный запоръ, экскременты не связные, выходящіе катышками и, по недостатку желчнаго вещества, бѣлые, сѣроватыя, глинистыя. Часто при этомъ оказываются также колики въ животѣ, тошнота, удавка, рвота и сильная жажда. Въ дальнѣйшемъ течениіи болѣзни появляется истощеніе всего тѣла, иногда желтуха, водянная болѣзнь и вѣтрепная немочь (*tympanites*).

§ 285.

Причины: воспалительное напряженіе въ печени, совершенный застой крови въ воротной системѣ, слишкомъ водянистое, либо гнилое качество крови вообще; сверхъ сего сидячій родъ жизни и непривычное упот-

ребление слишкомъ влзкой, слизистой, безвкусной пищи, напаche послѣ употребленія очень раздражающихъ лествъ, простуда желудка и печени холоднымъ питьемъ, или мороженымъ и т. п.

Ближайшую причину или *сущность* сей болѣзни составляетъ либо возвышенная до чрезмѣрности жизнедѣятельность печени, либо оскудѣніе оной и недостатокъ въ крови началь, служащихъ къ приготовленію желчи, либо паконецъ воспаянный приливъ венозной крови, по причинѣ заваловъ.

§ 286.

Предсказаніе зависитъ отъ причинъ, произражающихъ недостатокъ желчи. Впрочемъ, такъ какъ здѣсь разумѣется то состояніе, которое происходитъ болѣе отъ динамическихъ вліяній и удерживаетъ болѣе острую форму, то и уклоненіе его не представляетъ того затрудненія, какое встрѣчается при хроническомъ страданіи сего рода, зависящемъ отъ органическихъ пороковъ (см. желтуха).

§ 287.

Лечение требуетъ соображенія съ состояніемъ жизнедѣятельности въ печени. Во всякомъ случаѣ однажды здѣсь весьма полезны разрѣшающіе растительные соки, экстракты her. et rad. taraxaci, graminis (N 38), saponariae officinalis, marrubii albi (N 39), fumariæ off., tussilaginis farf., nasturtii aquatici, разрѣшающія и

отдѣленію желчи способствующія соли: tartarus tartaratus (N 39), t. natronatus, t. boraxatus, supertartras potassæ (N 14), acetas potassæ, acetas sodæ, tartras stibii et potassæ, chloridum hydrargiri (N 26) etc. При недѣятельности брюшныхъ внутренностей приличны extractum chelidonii majoris, stipites s. dulcamarae; rad. rhei (N 32), alœ, sapo medicatus et antimonialis, sel tauri (N 44, 45) etc. Часто доставляютъ большую помощь тошнотворное лѣченіе и рвоты, наипаче изъ сюрмяныхъ солей. При значительныхъ завалахъ внутренностей можно употреблять съ пользою clysmata visceralia изъ отвара одуванчиковъ и пр. (N 42). Больной (если въ состояніи) долженъ дѣлать ежедневно достаточное движение на свободномъ воздухѣ, избѣгать всячески простуды, труднопаримой, вязкой, мучнистой пищи; а употреблять легкія мясные кушанья, хороший кофій, старое пиво, портеръ и пр. наипаче при вяломъ лимфатическомъ тѣлосложеніи и здѣланный издавна привычкѣ къ раздражающей пищѣ и напиткамъ.

*Задержание испражнений низомъ.
(Segnities et obstipatio alvi).*

Син. Запоръ панизъ; alvus tarda, stricta, segnis, pigra, clausa, obstrucia, compressa etc.

§ 288.

Задержаниемъ или запоромъ нанизъ называется

обыкновенно либо долговременное неисправненіе низомъ и чрезмѣрное отвердѣніе экскрементовъ (*alvus stricta*), либо совершенное прекращеніе таковыхъ испражненій (*obstructio alvi*) съ болѣе или менѣе ощутительнымъ вредомъ для здоровья страждущаго, а часто и съ опасностю.

§ 289.

Явленія. Брюхо дѣлается при семъ болѣе или менѣе твердымъ и болѣй ощущаетъ полноту и раздутость живота, а вмѣстѣ съ симъ оказывается потеря аппетита, отягощеніе головы и усталость. При совершенномъ и долговременномъ задержаніи испражненій низа рождается колика и рѣзи въ животѣ, брюхо бываетъ сильно вздuto, напряжено и очень чувствительно, причемъ иногда обнаруживаются припадки воспаленія кишечка и сильная желчная рвота, кою подъ конецъ извергается самъ даже каль. Жилобіеніе въ такомъ случаѣ дѣлается очень раздраженнымъ и щеки горятъ, либо напротивъ лице и руки ощущаются холодными, а лобъ покрываетъся холоднымъ потомъ.

Страданіе сіе переходитъ въ *выздоровленіе* послѣ выхожденія вѣтровъ и послѣдующаго за тѣмъ испражненія, сперва совершенно твердаго, потомъ кашицеобразнаго кала, а иногда очень жидкихъ и учащенныхъ экскрементовъ; при чѣмъ весьма скоро исчезаютъ боли и другіе припадки, хотя и остается большое расположение къ возвратамъ запора. Смерть приключается только при очень долговременномъ продолженіи болѣзни, на-

иболѣе отъ произрожденія воспаленія въ кишкахъ и не-
рекода его въ аптоновъ огонь, либо отъ разрыва ки-
шечкъ.

§ 290.

Расположение къ запору имѣютъ преимущественно
пожилые, флегматические, очень тучные, вялые особы,
вообще болѣе женщины, нежели мужчины.

Случайные причины очень различны, но ихъ можно
раздѣлить на слѣдующіе три класса:

1.) На такія, кои умалляютъ отдѣленіе кишечнаго сока,
желчи и сока поджелудочной желѣзы, либо задержива-
ютъ таковые соки въ ихъ каналахъ, либо содѣлываютъ
ихъ очень вязкими и воспаляютъ чрезъ то необходи-
мому разжиженію кала. Сюда принадлежать: слишкомъ
большое издерживаніе соковъ въ другихъ органахъ, на-
пр. при сильныхъ напряженіяхъ тѣла, чрезмѣрныхъ
потахъ, умноженномъ отдѣленіи мочи, скопленіи сороз-
ныхъ влагъ въ водяной болѣзни и пр.; сверхъ того вос-
палительное напряженіе кишечнаго канала, застой въ
воротной системѣ, задержаніе желчи въ желчномъ про-
токѣ, или скудожелчіе, ослизеніе первыхъ путей, упо-
требленіе опія, недостатокъ въ жидкой пищѣ и пр.

2.) Такія, кои измѣняютъ червообразное движеніе ки-
шечкъ, причиняя либо недѣятельность и скудное дви-
женіе, либо судорожное сжатіе въ какомъ либо мѣстѣ
кишки, либо т. п. превратное червообразное дви-
женіе (*motus antiperistalticus*). Такъ дѣйствуютъ об-
щая и мѣстная слабость, параличное состояніе, недо-

статокъ привычнаго раздраженія пищи, скудное отдѣленіе желчи и слизи, овлажающей кишкы, употребленіе такихъ веществъ, кои умаляютъ чувствительность кишекъ, напр. опія; далѣе чрезмѣрное раздраженіе кишекъ и произведеніе воспаленія и корчей острыми веществами, внесенными въ кишечный каналъ, предшествовавшая продолжительная рвота и пр.

3.) Такія, кои механически воспящаются испражненію кала: напр. очень твердый и свернувшіяся въ камокъ массы кала, поглощенные фруктовыя косточки, свернувшіеся въ клубокъ глисты, мѣшкообразное разширеніе, завертываніе внутрь кишекъ (*volvulus, intussusceptio*), ущемленіе сальникомъ, отолщеніе кишечныхъ стѣнокъ, скиррозное перерожденіе, полипозные нарости, ущемленная грыжа, давленіе чрезмѣрно увеличившейся печени и беременной матки, большія гемороидалныя шишкы и затвореніе прохода сращеніемъ онаго.

§ 291.

Предсказаніе зависитъ отъ свойства возбуждающихъ причинъ и отъ возможности, или невозможности удалить онага. Вообще оно благопріятно, тамъ гдѣ запоръ происходитъ отъ порочнаго отдѣленія и судорожнаго состоянія, не столь благопріятно при ослабленіи и недѣятельности кишекъ, а очень сумнительно и опасно, гдѣ запоръ произрастаетъ въ слѣдствіе воспаленія и механическихъ препятствій. Привычный запоръ иногда очень трудно уничтожается.

§ 292.

Лъженіе. а) *По пригіннимъ показаніямъ* необходимо нужно сперва уклонить всѣ вліянія, произведшія и поддерживающія запоръ. Такимъ образомъ противъ существующаго воспаленія кишкъ назначаются приличныя противувоспалительныя и отвлекающія средства; дѣйствіе свинца уничтожается противуядіями, специфически на то дѣйствующими; употребленіе опія замѣняется слабительными изъ солей: существующіе глисты удаляются противуглистными средствами, а ущемленная грыжа и всѣ вліянія механически воспішающія испражненіе низа устраиваются не иначе, какъ рукодѣятельнымъ или механическимъ вспомоществованіемъ.

§ 293.

б.) *По существеннымъ показаніямъ.* Болѣзnenное состояніе кишкъ, отъ коего наиболѣе зависитъ запоръ, составляютъ умаленное отдѣленіе и порочное червообразное движеніе. Противъ обѣихъ сихъ состояній надлежитъ дѣйствовать вмѣстѣ, хотя въ одномъ случаѣ требуется болѣе усиливать отдѣленіе, а въ другомъ болѣе червообразное движеніе. Для умноженія отдѣленій предписываются преимущественно соли: сѣрнокислая магнезія (N 20), сѣрнокислый натръ и поташъ, фосфорокислая сода (N 15., винный камень (N 14), tartarus tartarisatus, tartarus natronatus, boraxatus и пр. Если кишечный каналъ не переноситъ солей (напр. при воспаленіи) и должно дѣйствовать болѣе разжигающимъ

образомъ, то избирается услащенная хлористая ртуть. Въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ нужно дѣйствовать вмѣстѣ болѣе возбуждающимъ и крѣпительнымъ образомъ, употребляется ревень и сабуръ. Когда же требуется преимущественно вспомоществовать отдѣленію желчи, то дается *tartarus tartarisatus*, *tartras potasse et sodae, extract. taraxaci, rheum, aloe cum sapone* (N 45), *bilis tanrina*, а если раздражающее дѣйствие сихъ послѣднихъ средствъ опасно, то услащенная хлористая ртуть. Вмѣстѣ съ симъ надлежитъ стараться вознаграждать не достаточное отдѣленіе обильнымъ питьемъ и нѣжными масляными средствами.

Для споспѣществованія червообразному движенію, если восплющаетъ тому судорожное напряженіе кишечкъ, нужно сперва смягчать кишечный каналъ масляными микстурами и масляными слабительными напр. клещевиннымъ масломъ (*ol. ricini*), дѣлать ванны, теплые припарки, давать испекакуанникъ въ малыхъ пріемахъ (N 53) и другія легкія противусудорожныя. При недѣятельности кишечкъ нужно стараться пріучать натуру къ ежедневному испражненію иза въ известное время, а изъ слабительныхъ предписывать преимущественно т. н. драстическія лѣкарства, напр. александрийскій листъ (N 101), ялапшу, ревень (N 24), сабуръ (N 45), желтую камедь, колоцинтъ (N 46), *oleum crotonis* (N 101), *oleum euphorbiae lahyridis etc.* и дѣйствие сихъ средствъ поддерживать промывательными изъ отвара отрубей, ромашковой наливки съ прибавленіемъ масла и нѣсколькою поваренной соли, мыла или меду, либо также изъ наливки александрийскаго листа, а въ крайнихъ случаяхъ

даже изъ табачныхъ листьевъ, къ чему могутъ служить и сосульки изъ меду, мыла и т. п. (N 52). Вообще, смотря по разнымъ обстоятельствамъ и случаямъ, избираются и различные слабительныя, такъ напр. при воспаленіи кишекъ услащенная хлористая ртуть, при коликѣ и сильныхъ рѣзахъ клещевинное масло, при глиставахъ ялаппа, при сильномъ обложеніи языка разрѣшающія соли и пр.

Очень полезно также соединять одно средство съ другимъ для замѣненія такого дѣйствія, котораго одно изъ нихъ не имѣть; напр. часто нужно бываетъ къ сладкой ртути присоединять ялаппу для того, что бы произведенія сладкою ртутью отдѣленія скорѣе испражнить. Хорошо также соединять соли съ александрийскимъ листомъ, ибо соли способствуютъ болѣе отдѣленіемъ, а листъ александрийскій усиливаетъ болѣе червообразное движение.

§ 294.

с.) *По припадочнымъ показаніямъ.* Если къ запору присоединяется сильная колика, то съ слабительными средствами, разумѣется не раздражающими, какъ клещевинное масло, или услащенная ртуть, соединяются и успокаивающія (N 77), а вмѣсть съ тѣмъ употребляются болеутолительныя мази (N 49) и припарки (N 48). Рвота укрощается обыкновенными средствами (N 68, 69, 70, 94, 95), а начинаяющееся воспаленіе кишекъ должно быть предотвращаемо кровоиспражненіями, успокаивающими и смягчающими припарками и проч.

Уменьшное и прекращенное отде́ление мочи.

(*Uropoësis suppressa; inuria*).

Син. *Jchuria renalis, sputia; suppressio urinae.*

§ 295.

Такъ называется то неправильное отде́ление почекъ, при которомъ отде́ление мочи бываетъ очень скучное, или совершение прекращается.

§ 296.

Явленія. Больной, при обыкновенномъ количествѣ употребляемаго имъ питья и пищи, весьма мало или вовсе не испражняется мочи, не чувствуя никакого побуждения къ тому и никакихъ ирипадковъ, случающихся при задержаніи мочи въ мочевомъ пузырѣ. При наружномъ и внутреннемъ изслѣдованіи не оказывается никакой опухоли въ мочепузырной сторонѣ и при вложеніи катетера мало, или вовсе не испражняется мочи. Вмѣстѣ съ симъ обнаруживаются и другія явленія, зависящія либо отъ страданія самихъ почекъ, к. т. воспаленія, камней и другихъ почечныхъ разстройствъ, либо отъ антагонистического и сочувственнаго пораженія отдаленныхъ органовъ, куда принадлежатъ паинache умноженные отде́ления слюны, пота и другихъ водянистыхъ жидкостей, воспринимающихъ иногда запахъ и вкусъ мочи, чрезмѣрныя испражненія низомъ и ртомъ, (какъ при холерѣ), скопленія серозныхъ жидкостей въ разныхъ по-

лостяхъ, (какъ при водянной болѣзни), отрыжка, мочевой запахъ во рту, беспрестанная тошнота и наклонность къ рвотѣ, тоска, трудное дыханіе, вздутие живота, большая наклонность ко спу, иногда спячка, бредъ, корчи и проч.

§ 297.

Причины: судорожное и воспалительное напряженіе почекъ, либо недѣятельность ихъ отъ всеобщей слабости и параличей, органическія измѣненія, окостѣніе почечныхъ артерій, свернувшаяся кровь, песокъ, камни, гной въ почкахъ и пр.; антагонистически умноженныя отдѣленія другихъ отдѣлительныхъ органовъ, на пр. при чрезмѣрной потливости, усилившемся слюнотеченіи, частыхъ и очень обильныхъ поносахъ, холерѣ, водяныхъ болѣзняхъ и т. п. Часто однакожъ ограничивается и прекращается мочеотдѣленіе при болѣзниомъ состояніи сосудистой и нервной системы к. т. въ огневичныхъ болѣзняхъ, въ истерикѣ, гипохондріи, въ судорожныхъ страданіяхъ и параличахъ, а иногда въ составоломныхъ переносахъ, въ чесоткѣ, лишаяхъ и пр.

Относительно *предсказанія* должно замѣтить, что совершенное прекращеніе мочеотдѣленія есть весьма сумнительное состояніе, даже долговременно продолжающееся уменьшеніе онаго оказываетъ часто дурную послѣдствія, напаче, если причины онаго не известны, или не уклоняются. Впрочемъ произрожденіе его отъ судорожного состоянія почекъ и отъ умноженного отдѣленія въ другихъ частяхъ подаетъ болѣе надежды, нежели отъ

органическихъ и другихъ значительныхъ разстройствъ въ почкахъ.

§ 298.

Лъженіе требуетъ уклоненія причинныхъ моментовъ, куда относится преимущественно умъреніе болѣзниено умноженнаго отдѣленія, ограничивающаго мочеотдѣльный процессъ, уничтоженіе воспалительнаго напряженія въ почкахъ кровоиспражненіями и противураздраженіями, укрощеніе судорожнаго состоянія успокоивающими лѣкарствами и пр. По удаленіи такимъ образомъ всѣхъ препятствій должно стараться возвысить отдѣльную дѣятельность почекъ средствами, приличными общему и мѣстному настроенію жизненныхъ силъ. Въ семь отношеніи, смотря по разнымъ обстоятельствамъ, назначаются либо т. и. противувоспалительныя мочегонныя, какъ углекислота, винно-каменная, селитренная и лимонная кислоты, селитра (N 11, 34), углекислый амміакъ, очищенный винный камень (N 14, 19) въ малыхъ приемахъ, не производящихъ послабленія низомъ и пр. либо раздражающія мочегонныя, какъ бальзамы на пр. balsamum tolutanum, canadense, copaivæ (N 51), oleum æth. terebinthinæ, sabinæ, juniperi communis; æther nitricus alcoholisatus; rad. petroselini, levisticæ ligustici, caincæ, ononidis spinosæ, pareiræ bravæ, rad. scillæ mar., colchici autumnalis, semen phelandrii aquatici, petroselini, coriandri, danci carotæ, bac. juniperi, herb. equiseti hiem. ballotæ lanatae, digitalis (N 6), nicot. tabaci, diosmatis crenatae, lac-

tusæ virosæ, millipedes, cantharides etc. Во всякомъ случаѣ, при употреблениі мочегонительныхъ средствъ, весьма полезно принимать обильное количество питья не теплаго, но прохладженаго и кисловатаго, а кушать болѣе раздражающую пищу, изъ пряныхъ огородныхъ кореньевъ к. т. петрушки, пустарнаку, щавелю, луку, хрену и пр.

Для наружнаго употребленія предписываются жидкія и густыя мази, составляемыя напаще изъ бальзамовъ и эфирныхъ маслъ, либо изъ сѣрой ртутной мази съ примѣсью порошка scillæ maritimæ, какъ unguentum et linimentum diureticum ph. univ. и втираемыя на поясницѣ, брюхѣ и внутренней поверхности ляшекъ.

Задержаніе или запоръ мочи.
(*Retentio urinae*).

§ 299.

То состояніе, при которомъ отдѣленная моча либо совершенно задерживается въ своихъ протокахъ (*ishuria*) либо испражняется съ большими затрудненіемъ (*dysuria*) либо выходитъ только по каплямъ и съ мучительными жгучими болями (*stranguria*), называется вообще *задержаніемъ мочи*.

§ 300.

Явленія. Моча можетъ задерживаться 1) *въ самыхъ*

погкахъ, въ ихъ чашечкахъ и въ общемъ пріятелищѣ (*retentio renalis, ichuria vera*). Это задержаніе случается очень рѣдко и сопряжено болѣшею частію съ болями въ печечной сторонѣ и выхожденіемъ красной, либо гноебѣзной мочи. Въ некоторыхъ случаяхъ оказывается присемь столь значительное растяженіе почечной лоханки или общаго пріятелища, что брюхо сильно вздувается, ощущается зыбленіе въ ономъ и состояніе таковое совершенно уподобляется брюшной водянной болѣзни.

2.) *Въ мочеточникахъ* (*retentio ureterica*). Весьма рѣдко затворяются оба мочеточника и въ такомъ разѣ испражненіе мочи совершенно прекращается. Если же задержаніе мочи бываетъ только въ одномъ мочеточнику, то выходитъ иѣсколько болѣшею частію очень окрашенной мочи, больной жалуется на сильныя боли по теченію страждущаго мочеточника, который представляетъ часто опухоль въ формѣ наполненной кишкѣ. Если моча во все не истекаетъ изъ задерживаемаго мѣста, то она накапливается также въ лоханкѣ и чашечкахъ почечныхъ. Здѣсь легко можетъ послѣдовать разрывъ мочеточника и изліяніе мочи въ брюшную полость; въ другихъ случаяхъ удобно приключается воспаленіе и загноеніе мочевыхъ путей, а въ слѣдствіе онаго водянная болѣзнь, или изнуреніе.

3.) *Въ мочевомъ пузырѣ* (*retentio urinae vesicalis*) задержаніе мочи сопряжено бываетъ съ растяженіемъ онаго, ощущаемымъ надъ лобковыми костями въ видѣ яйцеобразной опухоли. При сѣмъ больной имѣть сильное побужденіе къ мочеиспусканию, тоску и мучительныя

боли, умножающіяся отъ прикосновенія къ подбрюшной сторонѣ. Дыханіе затрудняется, оказывается холодный потъ и обмороки. Если причина задержанія не состоитъ въ совершенномъ затвореніи мочеиспражнительныхъ путей, то растяженіе мочеваго пузыря остается часто на долгое время въ одной мѣрѣ, потому что притекающая къ оному моча испражняется по каплямъ обыкновеннымъ путемъ.

Болѣзнь сія *переходитъ въ здоровье* чрезъ испражненіе мочи обыкновеннымъ путемъ; причемъ однакожъ остается на долгое время наклонность къ новому задержанію. Иногда рождается воспаленіе и прободеніе пузыря, при коемъ моча пролагаетъ себѣ путь чрезъ кітчатую плеву къ поверхности тѣла или въ мопонку, либо въ брюшную полость. Въ первомъ случаѣ обнаруживаются мочевые свищи и изнуреніе тѣла, а въ послѣднемъ смертельный послѣдствія отъ антонова огня.

§ 301.

При *вскрытии труповъ*, умершихъ отъ задержанія мочи, находимы были почки измѣнившимися такъ, что они представляли, какъ бы второй мочевой пузырь, а мочеточники растянуты были до толщины ободошной кишкі (*Walter*) и слизистая оболочка, устилающая ихъ, представлялась воспаленною и покрытою гноеобразною жидкостію. Мочевой пузырь иногда растянутъ былъ въ большой мѣшокъ, распространяющійся выше пупка и выполняющій почти всю подбрюшную полость съ воспаленіемъ и загноеніемъ слизистой оболочки его.

§ 302.

Расположение къ сей болѣзни имѣютъ преимущественно тѣ, кои страждуть каменною болѣзнию, также тѣ, кои одержими возвышенною раздражительностію организма и наклонностію къ судоргамъ, по сему дѣти во время зубопрорѣзыванія, страждущіе первною горячкою, истерикою, гипохондріею и пр.

Къ случайнymъ причинамъ относятся: а) воспалительное состояніе мочевыхъ путей к. т. почекъ, мочеваго пузыря, а особливо мочеиспускательного канала при венерическомъ перелоѣ; б) механическія препятствія, приключающіяся отъ крови въ кровавомъ мочеиспусканіи, отъ расщуханія и растяженія сосудовъ въ мочепузырномъ геморроѣ, отъ камней мочевыхъ, скопившейся слизи или гноя, отъ давленія беременной матки, или опаденія и искривленія сей внутренности, отъ врожденного сращенія мочеиспускательного канала; с) органическія разстройства мочеваго пузыря и смежныхъ частей к. т. растяженіе венъ, язвы, отвѣрдѣнія, жирные нарости, грыжи мочеваго пузыря, нарости или скирры предстательной желѣзы, яичниковъ, матки, маточнаго рукава, проходной кишкі, съживанія мочеиспускательного канала; д) судорожное сокращеніе мочеваго пузыря и запирающихъ его мышцъ, случающееся при зубопрорѣзываніи, въ истерикѣ, первной горячкѣ, послѣ частыхъ перелоевъ, неумѣреннаго совокупленія, злоупотребленія шпанскихъ мушекъ и другихъ слишкомъ острыхъ мочегонительныхъ и пр. е) параличное состояніе и слабость мышечныхъ волоконъ мочеваго пузыря

и его шейки, остающееся часто отъ привычки слишкомъ долго удерживать мочу, также послѣ апоплектическаго удара, сотрясенія становой жилы, давленія и прижатія пузыря при трудныхъ родахъ и пр. f), *согувственныя пораженія и переносы* на м. пузырь напр. въ слѣдствіе хроническихъ сыпей, простуднаго страданія, раздраженія отъ глистъ и нечистотъ въ кишечномъ каналѣ; отступившей ломоты и пр.

§ 303.

Предсказание опредѣляется по мѣстопребыванію задержанія, по важности случайныхъ причинъ и возможности удаленія ихъ, а иногда и по продолженію болѣзни. Задержаніе въ почкахъ и мочеточникахъ бываетъ большою частію смертельное, а въ мочевомъ пузыре не столь опасное, наипаче если оно зависитъ отъ судорожнаго сжатія шейки и другихъ динамическихъ страданій. Напротивъ того весьма трудно уничтожается то задержаніе, которое происходитъ отъ органическихъ измѣнений въ шейкѣ пузыря и въ мочеиспускательномъ каналѣ, либо въ смежныхъ частяхъ. Если болѣзнь долго продолжается, то угрожаетъ большою опасностію, а если часто возвращается, то предвѣщаетъ неблагополучные исходы и упорность излеченія. У молодыхъ особъ она менѣе опасна, нежели у старыхъ.

§ 304.

Лечение задержанія мочи должно быть назначаемо и располагаемо по причинамъ, произведшимъ его:

1.) Если оно бываетъ слѣдствіемъ воспаленія почекъ, или мочеваго пузыря, то пользуется противовоспалительными средствами к. т. кровоиспражненіями посредствомъ пьявокъ, или кровососныхъ банокъ, а иногда и общаго кровопусканія, употребленіемъ внутрь эмульсій (N 5, 35), слизистыхъ разводящихъ напитковъ (N 72), а снаружи тепловатыхъ примочекъ, ваннъ и полуваннъ, припарокъ, масляныхъ втираний и смягчающихъ промывательныхъ (N 37.). Вложеніе катетера въ семъ случаѣ часто бываетъ не возможно, а потому и произведеніе масляныхъ впрыскиваний въ пузырь не всегда можетъ имѣть мѣсто.

2.) Задержаніе мочи отъ механическихъ препятствій требуетъ сперва вложенія катетера, а потомъ уничтоженія означенныхъ препятствій, сообразно ихъ индивидуальности. Сюда принадлежитъ лѣченіе мочепузырного геморроя и катарра, удаленіе свертковъ крови и скопившейся слизи изъ пузыря, разложеніе, выведеніе или извлеченіе мочевыхъ камней, песка и другихъ постороннихъ тѣлъ, приведеніе въ правильное положеніе матки и маточнаго рукава и пр.

3.) При задержаніи мочи отъ органическихъ разстройствъ назначается столь же различное лѣченіе. Отвердѣнія и скирры мочеваго пузыря, предстательной желѣзы, яичниковъ, матки, маточнаго рукава, прямой кишкѣ и пр. требуютъ, кромѣ дѣлаемаго по временамъ вложенія катетера, сильныхъ разрѣшающихъ лѣкарствъ, наипаче сурмянныхъ и ртутныхъ препаратовъ (N 26), пятнистаго болиголова, одурника (*Belladonna*), лаврововишиневой воды (N 5); снаружи втирания сѣрой ртутной мази съ свѣжевыжатымъ сокомъ наперстянки, *unguenti di-*

gitalis, hydroiodatis potassae, впрыскиваниі infusi belladonae (N 89), conii maculati, sol. laurocerasi etc. Врожденное заражение и съуживание мочеиспускательного канала уничтожаются хирургическимъ вспомоществованіемъ.

4.) *Судорожное* задержаніе уклоняется наилучше противусудорожными средствами, особенно комфорою, опіемъ (N 21), беленою (N 77), иногда мауномъ, дурнопахучникомъ, бобровою струею (N 8) и другими подобными лѣкарствами (N 54, 73). Снаружи здѣсь большую помощь доставляютъ теплые ванны и полуванны, наипаче съ прибавленіемъ къ нимъ настоя маковыхъ головокъ, белены и пр; теплые примочки и припарки на сторонѣ пузыря изъ наркотическихъ и смягчающихъ травъ (N 48), втираніе летучихъ мазей съ комфорою и опіемъ, промывательная изъ крѣпкаго настоя мауна съ растворомъ дурнопахучника и масломъ белены. При корчевомъ сжатіи шейки пузыря, отъ острыхъ мочегонительныхъ, весьма хорошо дѣйствуетъ камфора въ эмульсіяхъ.

5.) *Въ параличномъ* задержаніи мочи должно обращать вниманіе на то, произошло ли оно собственно отъ паралича, поразившаго мочевой пузырь, или отъ чрезмѣрнаго растяженія пузыря. *Въ первомъ случаѣ* предписываютъ эфирная и другія масла, возбуждающія мочевые органы напр. oleum terebinthinae, ol. petroleum, натуральные бальзамы (N 51), tinct cantharidum, фосфоръ, sol. rhois toxicodendri, крѣпкая наливка flor. arnicae montanae, decoctum cort. mezerei etc; снаружи втиранія эфирныхъ маслъ, камфоры, крѣпкихъ спиртовъ, эфировъ (N 98) на сторонѣ крестца и въ проходной промежности, приложеніе сухихъ насосныхъ банокъ, пары-

вныхъ пластырей и горчичниковъ, струистое обливаніе холодною водою (*douche*), электризованіе и пр. Во *второмъ* случаѣ потребны болѣе мѣстно дѣйствующія стягивающія лѣкарства к. т. отварь хины, ивой корки, завязнаго корня, растворъ квасцовъ, сѣрнокислого цинка, сѣрнокислой мѣди и пр. въ формѣ впрыскиваній, примочекъ и обмываній. Можно также съ пользою дѣлать впрыскиваніе и обливаніе мочепузырной стороны холода-ными спиртными жидкостями, холодною водою, смѣшанною съ уксусомъ, Шмукеровымъ примачиваніемъ (N 25), дѣлать общія и мѣстныя холодноватыя желѣзныя ванны ex globul. mortialibus etc.

b.) *Согутвственное* задержаніе мочи въ большой части случаетъ бываетъ судорожнаго свойства, рѣдко воспалительного, а потому и требуетъ лѣченія, сообразнаго та-ковымъ состояніямъ, разумѣется, съ надлежащимъ про-тивудѣйствіемъ главной болѣзни, отъ коей оно зависитъ. Тамъ, гдѣ всѣ внутреннія и наружныя средства не унич-тожаютъ задержанія, а вложеніе катетера по какимъ либо обстоятельствамъ не возможно, производится обыкновенно прободеніе мочеваго пузыря (*punctura s. paracenthesis ve-sicae urin.*), къ коему тѣмъ скорѣе надлежитъ приступать, чѣмъ большая угрожаетъ опасность воспаленія и раз-рыва мочеваго пузыря.

Болѣзненное воспѣщеніе мѣсячнаго очищенія.

(Amenorrhoea)

Syn. Retentio, defectus, remansio fluxus menstrui, menocryphia, menostasis.

§ 305.

Такъ называется либо необнаруживаніе мѣсячнаго теченія въ такихъ лѣтахъ, когда оно наступить должно (*menstruatio retardata*), либо прекращеніе его послѣ того, какъ оно оказывалось уже пѣсколько разъ (т. *emanens, emansio mensium*), безъ беременности, либо пріостановленіе онаго во время самаго теченія (т. *supressa*).

Сюда же можно пѣкоторымъ образомъ отнести и то болѣзненное состояніе, въ которомъ хотя испражняется кровь при мѣсячномъ очищеніи, но въ маломъ, недостаточномъ количествѣ (*menstr. parca*), равно какъ и то, въ которомъ выхожденіе крови, скудное впрочемъ, сопряжено съ тѣми же припадками, какіе обнаруживаются и при совершенномъ воспѣщеніи мѣсячнаго очищенія (т. *difficilis, dysmenorrhoea*).

§ 306.

Явленія. Иногда недостатокъ мѣсячнаго очищенія недолгое время остается безъ всякихъ болѣзненныхъ припадковъ; чаще же онъ сопровождается болѣе или менѣе значительными болѣзненными опущеніями и разстройствами, каковы суть: чувство тяжести въ нижнихъ конечностяхъ, давящая, или раздирающая боль въ крестцѣ,

боли^т въ животѣ, подобныя коликѣ, сосредоточивающіяся обыкновенно въ нижнѣй части онаго, ощущеніе напора къ дѣтороднымъ частямъ; сверхъ сего головокруженіе, краснота лица, стѣсненіе груди, сильное бѣеніе сердца, недостатокъ позыва на пищу, гастрическія нечистоты, рвота, а чаще всего кровотеченія, особенно кровохарканіе, кровавая рвота, кровотеченіе изъ носа, изъ геморроидальныхъ сосудовъ, даже изъ необыкновенныхъ мѣсть, напр. изъ язвъ, изъ кожи въ видѣ кроваваго пота, изъ глазъ, титекъ и пр. (*menses aberrantes; mensium insolitae viae*). Не рѣдко вместо крови вытекаетъ изъ дѣтородныхъ частей слизь урочными возвратами (*Blenorrhoea uteri viscarij*).

При долговременномъ необнаруживаніи мѣсячнаго очищенія развивается не рѣдко худосочное состояніе и женская блѣдность (*chlorosis*) есть обыкновенное явленіе въ такомъ случаѣ, хотя она чаще впрочемъ бываетъ причиной, нежели слѣдствиемъ пріостановленія мѣсячныхъ кровей. Отъ застоевъ крови въ брюшныхъ сосудахъ, дѣлающихся весьма легко при задержкѣ, мѣсячнаго очищенія, рождаются хроническія разстройства пищеваренія, страданіе печени и желтуха, гипохондрія, составоломъ, а иногда и водяная болѣзнь. Въ позднѣйшемъ времени часто также развивается легочная чахотка, хроническія накожныя сыпи, первныя болѣзни, разстройства душевныхъ отправленій и другія страданія.

§ 307.

Распознаваніе. Хотя означенныя здѣсь болѣзnenныя

измѣненія сопровождаются вообще всякое необнаруживаніе или простояніе мѣсячного очищенія, но часто очень трудно решить, зависятъ ли они отъ болѣзненнаго, или отъ нормального состоянія (напр. отъ беременности) и составляютъ ли слѣдствія, или самыя причины необнаруживанія кровей. Для достовѣрнаго узnanія настоящаго содержанія потребна иногда величайшая осмотрительность и бдительное обращеніе вниманія на всѣ отношенія индивидуальныхъ случаевъ.

§ 308.

Причинами сего болѣзненнаго состоянія могутъ быть а) ограниченное дѣйствіе репродуктивнаго процесса отъ порочнаго образа жизни, дурной пищи, недостатка въ движеніи, пребыванія въ нечистомъ воздухѣ, отъ предшествовавшихъ болѣзней, напичке кровотечений, слизотечений, золотушнаго страданія, отъ значительного издергашія образовательной дѣятельности при наступлении періода возмужалости; б) судорожное состояніе дѣйтородной системы, случающееся у изнѣженныхъ, очень раздражительныхъ особъ, напичке предающіхся всякаго рода психическимъ, или физическимъ раздраженіямъ дѣйтородныхъ органовъ и сильно дѣйствующимъ душевнымъ возмущеніямъ, страждущихъ вообще судорогами, глистами и пр. и подвергающихся простудѣ, либо другимъ вреднымъ вліяніямъ при существующихъ уже побужденіяхъ къ мѣсячному очищенію (*molimina ad menstruationem*); с) недѣятельность въ дѣйтородной сферѣ и загрублость матки, равно какъ и всего

тѣла, оказывающаяся какъ у вялыхъ, страждущихъ многослезиемъ и застоеми въ брюхѣ, такъ и у крѣпкихъ, здоровыхъ женщинъ, ведущихъ всегда дѣятельную жизнь на свободномъ воздухѣ, равно какъ и у тѣхъ, кои имѣютъ слишкомъ мужественное образованіе тѣла (*viragines*); d) *мѣстная слабость дѣтородной системы*, приключающаяся отъ долговременнаго продолженія болѣй, отъ опаиніи, чрезмѣрнаго распутства въ физической любви, или слишкомъ строгаго воздержанія при такомъ родѣ жизни, который отклоненъ отъ всѣхъ вліяній, возбуждающихъ родотворное стремленіе; e) *другія испражненія*, замѣняющія мѣсячное очищеніе, куда относятся: кровохарканіе, кровавая рвота, кровотеченіе изъ носу, даже изъ язвъ и необыкновенныхъ путей, слизотеченія, напище изъ дѣтородныхъ органовъ и пр. f) *органическая неправильность*, напр. перерожденіе клѣтчатаго состава матки, отвердѣнія и нарости въ оной, совершившее затвореніе маточнаго рукава дѣственною плевою и сращеніе маточнаго отверстія и рукава.

§ 309.

Предсказаніе зависитъ здѣсь отъ причинъ, степени и продолженія болѣзни, равно какъ и отъ особенного состоянія больной. Вообще болѣзнь сія очень важна, тѣмъ болѣе, что часто подаетъ поводъ къ сумнительнымъ и опаснымъ страданіямъ. Если она происходитъ отъ идиопатической склонности дѣтородныхъ частей, к. т. отъ судорогъ, бездѣйствія, слабости и загрубѣлости, то объщается лучшее предсказаніе, нежели отъ порочнаго со-

стоянія общей репродуктивной дѣятельности, отъ природы слишкомъ мужественного устроенія тѣла и пр. Замѣняющія ее кровотеченія имѣютъ разное значеніе, смотря по мѣсту, изъ коего они происходятъ. При органическихъ неправильностяхъ все зависитъ отъ легкости, или трудности уклоненія ихъ.

§ 310.

Лѣченіе основывается здѣсь на приличномъ противудѣйствіи разному свойству причинъ, отъ коихъ зависитъ болѣзнь, на уклоненіи опасныхъ или мучительныхъ припадковъ, а иногда и на непосредственномъ содѣйствіи къ возстановленію мѣсячныхъ кровей.

1.) Къ первому требованію относятся:

а) *Возвышение упавшей репродуктивной дѣятельности* возстановляющимъ и укрѣпляющимъ способомъ лѣченія и устраниеніемъ тѣхъ болѣзней, кои ограничиваютъ оную дѣятельность. Вообще для сего надлежитъ стараться исправить пищевареніе горькими и притомъ, смотря по обстоятельствамъ, разрѣшающе горькими (№ 96), ароматно—или стягивающе—горькими лѣкарствами, назначать большой легко варимую, очень питательную пищу, совѣтуя притомъ дѣятельную жизнь на свободномъ воздухѣ, частое движеніе тѣла, а особливо разсѣянность и пріятное препровожденіе времени и улучшать приготовленіе крови желѣзными составами (№ 58), преимущественно минеральными водами, содержащими въ себѣ желѣзо к. с. Спааскія, Эгерскія, Дрибургскія и Пирмонтскія; а при недостаткѣ сихъ наши Липецкіе, Сергіевскіе и Кавказскіе желѣзные источники.

б) *Противудѣйствіе судорожному состоянію*, причемъ должно отличать, зависить ли таковое состояніе отъ чисто перваго напряженія, или на него оказываетъ вліяніе и самое раздраженіе крови. Смотра по этому, успокаивающія средства назначаются либо не возбуждающія, какъ белена (N 1), синильная кислота (N 4), кодеинъ (N 2), уксусокислый морфій (N 77) и пр.; либо возбуждающія, особенно бобровая струя, дуриопахучникъ, маукъ (N 8); галбаникъ, наипаче *tinctura galbanii aetherea*, даже опій и наркотинъ (N 102) въ соединеніи съ противураздраженіями и кровоотвлеченіями, также съ употребленіемъ снаружки наркотическихъ припарокъ, впрыскиваний (N 89) и противусудорожныхъ втираній (N 49, 98).

с) *Уклоненіе недѣятельности и загрублости матки* производится специфически раздражающими средствами на пр. сабуромъ (N 45), донскимъ можевельникомъ (N 46), шафраномъ (N 44) въ соединеніи съ другими приличными средствами. Часто здѣсь большую пользу доставляютъ противувоспалительные соли (N 11, 14, 18), кровопусканія изъ ноги, пьявки, припускаемыя къ ляшкамъ, теплая смягчающія впрыскивания, припарки и пары, наипаче тамъ, гдѣ существуетъ перевѣсъ дѣятельности артеріальной системы.

д) *Слабость и заялость дѣгородныхъ органовъ* уничтожается обыкновенно съ возвышениемъ общей продуктивной дѣятельности.

е) *Прекращеніе замыкающихъ кровотечений* требуетъ отводящихъ и противураздражающихъ средствъ. Здѣсь нужно отводить всякаго рода раздраженіе отъ то-

го органа, который подвергается кровотечению и умножать приливъ соковъ къ дѣтгороднымъ частямъ посредствомъ нѣсколькихъ пьявокъ, или насосныхъ банокъ, раздражающихъ ножныхъ ваннъ, тренія нижнихъ конечностей и пр. а во время побужденій къ мѣсячному очищению (*molimina*) давать означенныя с) специфически раздражающія средства съ должною однакожъ осторожностью.

f) *Устраненіе органическихъ пороковъ* совершаются рукодѣятельнымъ вспомоществованіемъ.

§ 311.

2) Къ опаснымъ и мучительнымъ *припадкамъ* принадлежать преимущественно: а) *скопленія* къ благороднымъ какимъ либо органамъ, причиняющія головокруженіе, головные боли, апоплексіческій ударъ, кровохарканіе, конгестивный тускъ и пр. и б) *судорожныя страданія*.

При лѣченіи скопленій надобно въ точности отличать, происходятъ ли они отъ настоящаго полнокровія, или отъ возвышенной раздражительности сосудистой системы. Въ первомъ случаѣ могутъ быть предпринимаемы кровоисправженія, особенно кровопусканіе изъ ноги и пьявки на ляшкахъ, также внутреннія прохладжающія на пр. селитра, очищенный винный камень (N 11, 14) и растительныя кислоты; а въ послѣднемъ кровоисправженія назначаются только въ крайнихъ случаяхъ, болѣе же потребны отводящія и успокоивающія средства к. т. ножныя ванны, треніе нижнихъ конечностей, употребленіе внутрь *saturationis kali carbonici* (N 94, 95) ацета-

laurocerasi (N 5), *digitalis* (N 6, 54), *hyosciami* (N 1), иногда минеральныхъ кислотъ на пр. соляной (N 64) и сѣрной (N 57). Судорожный страданія пользуются по ихъ свойству. Вообще для укрощенія ихъ назначаются теплые ванны, употребленіе Доверова порошка (N 7), ипекакуапника въ малыхъ пріемахъ и пр.

§ 312.

3) Для непосредственнаго содѣйствія къ возстановленію мыслнаго очищенія предписываются обыкновенно привлекающія кровь къ дѣтороднымъ органамъ (*attrahentia*) и т. н. мѣсячегонныя средства (*pellentia s. menagoga*). Къ первымъ относятся: ножныя ванны, пары, припускаемые къ дѣтороднымъ частямъ, треніе внутренней поверхности ляшекъ, теплые припарки къ дѣтороднымъ частямъ, приложеніе пьявокъ, или насосныхъ банокъ къ ляшкамъ, кровопусканіе изъ ножныхъ венъ и всегдашнее содержаніе нижнихъ конечностей и брюха въ теплотѣ. Средства сіи при отступлениіи мѣсячныхъ кровей (*emansio mensium*) лучше всего употреблять за нѣсколько дней до того времени, въ которое обыкновенно обнаруживалось мѣсячное очищеніе, а тотчасъ по наступлениіи такового времени давать мѣсячегонныя лѣкарства и притомъ, смотря по обстоятельствамъ и индивидуальнымъ отношеніямъ, либо т. н. *pellentia frigida* к. с. бура (N 43), пашатырь въ большихъ пріемахъ, *bicarbonas sodæ cum acido tartarico* (N 94), углекислныя минеральныя воды, искусственная содовая вода, Билингскія и кисловодскія Кавказскія воды, либо *pellentia*

calida, между коими первое мѣсто занимаетъ допской можевельникъ (N 41, 103), также сабуръ (N 45), черный чемеричникъ N 103), смирна (N 44), галбаникъ, дурнопахучникъ, тисъ, росный ладонъ, сѣра, желѣзные составы (N 58), юдинъ (N 93) и спорыния (N 75.).

• КОСАЧЪ АДАМЪ

ІУ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЯ
РАЗДРАЖЕНИЯ.

§ 313.

Подъ именемъ воспалительныхъ раздраженій разумѣются такія болѣзни состоянія, кои обнаруживаются не вполнѣ развившимися воспалительными явленіями, преимущественно умноженнымъ раздраженіемъ и оказывающимся въ слѣдствіе его усиленнымъ скопленіемъ и отдѣленіемъ, или одною болью. Сюда принадлежать два главныхъ страданія: катарръ и ревматизмъ.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

КАТАРРАЛЬНЫЯ РАЗДРАЖЕНИЯ.

K a t a r r o s.

(*Catharrhus.*)

§ 314.

Катарромъ называется собственного рода страданіе (*morbis sui generis*), при коемъ слизистая оболочка дыхательныхъ путей находится въ раздраженномъ, болѣе или менѣе воспаленію подобномъ состояніи, частію съ умноженнымъ, или воспященнымъ, а частію съ измѣненнымъ специфически отдѣленіемъ слизи.

§ 315.

Явленія сей болѣзни различаются по различному ея мѣстопребыванію и въ семь отношеніи катарръ раздѣляется на три рода.

1. *Катарръ слизистой оболочки носа* (насморкъ, *coryza, catharrhus narium*) начинается обыкновенно щекотаніемъ и сухостію въ верхней части носа, также частымъ чиханіемъ, причемъ истекаетъ сперва совершенно прозрачная, острая влага, причиняющая на верхней губѣ красноту и жженіе (*coryza humida*) съ умноженнымъ отдѣленіемъ слезъ и нѣкоторою опухолью носа, а потомъ образуется почти безцвѣтная, бѣловатая вязкая слизь, затворяющая ноздри и сообщающая голосу

носовое произношение. Вместе съ симъ рождается всегда некоторое отягощение головы, краснота и падменіе лица; но рѣдко общее огневичное возбужденіе. Наконецъ начинаетъ высыпываться желтоватая, сгущенная, или все еще жидкая, на гной похожая слизь въ достаточномъ количествѣ и такимъ образомъ насморкъ оканчивается на 2 — 4 — 7 день. Рѣдко раздраженіе усиливается до воспалительного напряженія и въ такомъ случаѣ сухость въ носу остается на долго, отягощеніе головы бываетъ сильнѣе и огневичное возбужденіе присоединяется удобнѣе (gravedo, coryza sicca).

§ 315.

2. *Катарръ гортани и дыхательного горла* (осиплость, охрипание, ravcedo catarrhalis, branchus) рождается часто вдругъ. Больной иногда мгновенно дѣлается осиплымъ, ощущаетъ сухость и жесткость въ дыхательномъ горлѣ, также щекотаніе, возбуждающее кашель, съ коимъ извергается сперва серозная жидкость, потомъ белая вязкая слизь и наконецъ свернутая въ комки харкотина. Съ этимъ исчезаетъ осиплость, которая впрочемъ часто проходитъ и безъ таковыхъ испражнений, а иногда послѣ умноженного накожного испаренія. Продолженіе болѣзни часто бываетъ очень кратковременное, иногда же она длится весьма долго; впрочемъ это свойственно только хронической осиплости, зависящей отъ изъязвленія и случающейся въ гортаний чахоткѣ.

3 *Катарръ слизистой оболочки легкихъ* (tussis catarrhalis) имѣть слѣдующіе виды:

a.) *Острый легочный катарръ*, коему обыкновенно предшествуетъ насморкъ. По прошествіи нѣсколькихъ дней или даже часовъ, когда сухой насморкъ начинаетъ измѣняться, воспалительное раздраженіе распространяется на слизистую оболочку дыхательного горла. Переходъ его на гортань узнается изъ чувства жесткости и щекотанія, возбуждающаго кашель, также изъ осиплости. Если означенное раздраженіе поражаетъ слизистую оболочку легкихъ, то больной ощущаетъ легкую боль, также большую частію сухость и жесткость, имѣющія мѣстопребываніе свое за грудною костію. Въ высшей степени болѣзни чувствуетъ онъ гораздо сильнѣйшія, даже колющія, но проходящія боли во всѣхъ частяхъ груди, наипаче послѣ кашля.

Кашель въ началѣ бываетъ сухой, но въ скоромъ времени съ онѣмъ начинаетъ извергаться небольшое количество соленой, въ нити растягивающейся серозной жидкости, которая ничемъ почти неотличается отъ испражненій въ тоже время слюны. Въ послѣдствіи времени харкотина дѣлается гуще и въ онѣ можно отличать бѣловатыя полупрозрачныя частицы, къ коимъ примѣшиваются иногда и желтоватый цвѣтъ; наконецъ всѣ вещества, извергаemыя харкотиною, дѣлаются блѣдно желтыми или слабо зеленоватыми, непрозрачными, безвкусными либо нѣсколько соленоватыми, вязкими и смѣшанными съ воздушными пузырками. Иногда примѣщаются въ онѣхъ кровяные точки или полоски; въ сіе время кашель дѣлается мокротнымъ, причемъ хрипѣніе въ груди можно слышать простымъ ухомъ. Кашель и изверженіе харкотины оказываются приступами, наипаче поутру и послѣ купанья.

Ударение въ грудь (percussion) издаетъ при катаррѣ хорошій тонъ. Вслушивание (auscultation) показываетъ въ началѣ болѣзни низкотонное, чистое звукъ издающее (sonore) хрипѣніе, сходствующее часто съ воркованіемъ горлицы, и притомъ свистящее. Если мѣсто, въ которомъ хрипѣніе имѣетъ свое мѣстопребываніе, составляетъ бронхіальная вѣтвь, обрѣтающаяся близъ поверхности легкаго, то по приложеніи руки на грудь, чувствуется содроганіе, подобное производимому напряженною дрожащею струною. Тонъ хрипѣнія бываетъ тѣмъ ниже и чище, чѣмъ менѣе находится отдѣленій влаги и чѣмъ болѣе распухаетъ внутренняя оболочка большихъ бронхіальныхъ стволовъ. По мѣрѣ того, какъ болѣзнь въ теченіи своемъ подвигается впередъ и отдѣленіе слизи дѣлается обильнымъ; замѣчается такое скрипѣніе или клокотаніе слизи, которое большею частію занимаетъ одно какое либо мѣсто въ отдѣльности, а въ трудныхъ случаяхъ оно распространяется на всю грудь.

Означенныя здѣсь болѣзненныя явленія большею частію ограничиваются одною грудью; иногда катарральное страданіе переходитъ на слизистую оболочку кишечка и причиняетъ поносъ. Часто также оказывается при семъ горячка, состоящая либо въ легкихъ, скоропроходящихъ огневичныхъ движеніяхъ, появляющихся напаче вечеромъ, либо въ сильныхъ, продолжающихся не сколько недѣль.

§ 316.

b.) Хронический легочный катарръ остается чаще

23*

всего послѣ сильнаго острого катарра, когда горячка прекращается, или переходитъ въ изнурительную, а кашель и харкотина нисколько не уменьшаются. Извергаемыя здѣсь съ кашлемъ вещества иногда совершенно подобны тѣмъ, кои выхаркиваются въ остромъ катаррѣ, однакожъ они болѣею частію не столь вязки, менѣе прозрачны и почти гнообразны, обыкновенно не имѣютъ запаха, иногдаже бываютъ болѣе или менѣе зловонны и воспринимаютъ даже запахъ и всѣ прочіе признаки гноя со всѣми его разностями. Количество харкотины почти всегда значительнѣе, нежели въ остромъ катаррѣ и нерѣдко въ 24 часа извергается ея до двухъ фунтовъ. Она умножается всегда послѣ приключавшагося вновь насморка, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ, безъ явственной причины, дѣлается столь обильною и похожею на гной, что заставляетъ подозрѣвать вскрывшійся въ вѣтви дыхательнаго горла царыкъ (*vomica*). Сей случай, если къ оному присоединяется стѣсненіе въ груди и тоска, представляетъ родъ удушливаго катарра (*catarthus suffocatus*). Большой въ продолженіи сей болѣзни, не теряя аппетита, дѣлается однакожъ блѣднѣмъ и нѣсколько го худѣеть; дыханіе его затрудняется только при усиленномъ тѣлесномъ движеніи; лѣтомъ находится онъ въ гораздо лучшемъ состояніи, въ какое время катарръ болѣею частію превращается изъ мокраго въ сухой, а въ продолженіи зимы дѣлается опять мокрымъ и сопровождается огневицей, напаче если харкотина очень обильная. Послѣ таковыхъ неоднократныхъ озвратовъ, мокрый катарръ дѣлается наконецъ привычнымъ, въ каковомъ состояніи иногда, несмотря на

умѣренно частое жилобеніе и совершенно натуральную теплоту кожи, харкотина бываетъ столь сильная, что ослабляетъ и примѣтно изнуряетъ больныхъ. Въ нѣкоторыхъ, вирочемъ рѣдкихъ случаяхъ, рождается изнурительная лихорадка, при чёмъ истощеніе тѣла, бывшее до сего времени умѣреннымъ, весьма скоро усиливается и болѣзнь оканчивается смертію послѣ припадковъ, очень подобныхъ бугорковатой чахоткѣ. (*Bayle*).

Вслушивание недоставляетъ здѣсь другихъ признаковъ, кромѣ скрипѣнія слизи. Шумъ отъ дыханія рѣдко уничтожается совершенно, если небываетъ въ тоже время сухаго катарра. Иногда почти во всемъ пространствѣ легкаго оказывается дѣтское дыханіе и потому больные страждуть удушьемъ (*asthma humidum*).

§ 317.

с) *Сухой легочный катарръ* въ хроническомъ состояніи составляетъ весьма обыкновенное страданіе, а въ остромъ замѣчается онъ въ началѣ и подъ конецъ пасморка. Въ первомъ случаѣ онъ бываетъ болѣею частію идіопатическою болѣзнію и въ продолженіи многихъ лѣтъ существуетъ въ умѣренной степени и совершенно скрыто.

Поражаемые имъ субъекты замѣчаютъ только при восхожденіи на верхъ и бѣганіи слишкомъ ускоренное, короткое дыханіе; если же случающееся здѣсь распуханіе вѣтвей дыхательного горла умножается въ обѣятности, то часто и въ спокойномъ состояніи, наипаче послѣ обѣда, оказывается затруднительное дыханіе. Въ послѣд-

ствіи времени къ нему присоединяется еще стѣсненіе въ груди, столь сильное, что заслуживаетъ вполнѣ названія удушья (asthma) и продолжается обыкновенно нѣсколько дней. Подъ конецъ сего припадка появляется кашель и съ сего времени стѣсненіе въ груди уменьшается, а по прошествіи нѣсколькихъ дней, съ кашлемъ извергается перловоцвѣтная харкотина, нѣсколько смѣшанная съ слизью, либо стеклообразная (p. vitriformis). Часто впрочемъ количество ея бываетъ столь малое, что больные почти незамѣчаютъ оной. Въ семъ то катаррѣ бываетъ тотъ кашель, который практики называютъ сочувственнымъ, зависящимъ отъ страданія желудка, печени, почекъ, матки и пр. и известный подъ названіемъ *желудочнаго, печеночнаго, почечнаго, истерическаго* и пр.

При удареніи (percussion) рождается здѣсь чистый отголосокъ въ груди, а посредствомъ вслушиванія узнается почти совершенное отсутствіе дыхательного шума въ больныхъ мѣстахъ, кои часто смѣняются между собою, что происходитъ отъ переходящаго, неравномерно сильного распуханія слизистой оболочки бронхіальныхъ вѣтвей.

§ 318.

Причины. Преимущественное расположение къ катаррамъ имѣютъ люди, одаренные весьма нѣжною кожею и большою чувствительностью дыхательныхъ органовъ, также часто страдавшіе воспаленіями груди и наклонные къ чахоткѣ.

Изъ случаинихъ причинъ самая обыкновенная есть скорое смененіе температуры воздуха, вообще переходъ, какъ изъ теплой атмосферы въ холодную, слѣдственно простуда всякаго рода, такъ и изъ очень холоднаго воздуха въ слишкомъ натопленную комнату. Въ первомъ случаѣ катарръ образуется отъ воспіщенія накожной дѣятельности, а въ послѣднемъ отъ мгновеннаго раздраженія теплотою легочной слизистой оболочки. Кромѣ сего здѣсь дѣйствуютъ иногда и другія вліянія, раздражающія слизистую оболочку дыхательныхъ органовъ к. т. пыль въ воздухѣ, острый испаренія, вдыханіе холоднаго воздуха, сѣвернаго и восточнаго вѣтра, либо легочныхъ испареній больныхъ особъ и наконецъ прикосновеніе къ слизистой оболочки носа матеріи, отдѣляемой при насморкѣ, что можетъ произти, какъ чрезъ употребленіе носовыхъ платковъ, такъ и чрезъ поцѣлуи. Впрочемъ катаральныя эпидеміи зависятъ не отъ сей, но отъ собственнаго рода прилипчивости (*miasma catarrhale*), раждающейся въ слѣдствіе теллюрическихъ и космическихъ вліяній и переходяще въ Европу всегда изъ Азіи.

Хроническій мокротный катарръ случается весьма часто у стариковъ, напаче лимфатического сложенія, равно какъ и у молодыхъ особъ, страдавшихъ сильно коклюшемъ, либо ослабившихъ себя распутствомъ, сидячимъ родомъ жизни и пр. также послѣ скрывшихся накожныхъ сыпей и прекращенныхъ привычныхъ испражненій. Сухой катарръ поражаетъ преимущественно особъ, страждущихъ составоломомъ, ипохондрію, лишаеми, а иногда здоровыхъ и крѣпкихъ людей, обитающихъ по

приморскимъ берегамъ, въ холодныхъ странахъ, влажныхъ долинахъ и пр.

Что касается до ближайшей причины, то въ обыкновенныхъ случаяхъ острого катарра, она, по всему вѣроятію, состоить въ особенномъ воспалительномъ раздраженіи слизистой оболочки дыхательныхъ путей, при которомъ не существуетъ еще вполнѣ развившагося воспаленія, а находится только умноженное скопленіе и неправильное отдѣленіе и гдѣ кровь непревращается въ гной, или другую плотнѣйшую массу, какъ бываетъ въ настоящемъ флегмонозномъ воспаленіи, но разжижается въ известную форму, такъ какъ здѣсь, послѣ прекращенія накожного испаренія, рождается антагонистической болѣзнейный процессъ въ легкомъ и слизистая оболочка его служитъ, можетъ быть, замѣннымъ отдѣлительнымъ органомъ. Хронический катарръ зависитъ отъ простаго невоспалительного раздраженія, соединенного съ большими разслабленіемъ слизистой оболочки и умноженнымъ привычнымъ или замѣненнымъ скопленіемъ и отдѣленіемъ.

§ 319.

Предсказание. Катарръ, хотя есть вообще безопасная и большою частію сама собою уничтожающаяся болѣзнь, однаждѣ она, при большомъ небреженіи, можетъ сдѣлаться упорною и переходить въ воспаленіе носа (*rhinitis*), горла (*angina inflammatoria*) и легкихъ (*pneumonitis*), а при чахотномъ расположеніи подавать поводъ къ развитію легочной и гортанной чахотки.

§ 320.

Лъженіе, а) *По пригіннимъ показаніямъ* — должно содержать тѣло, наипаче грудь и ноги въ надлежащей теплотѣ, надѣвая теплый шлафрокъ и шерстяные чулки, также избѣгать всего, что раздражаетъ легкія на пр. слишкомъ холоднато или спиртнаго питья, вдыханія острого воздуха, куренія трубки и т. п. а при насморкѣ перемѣнять почаще носовые платки и не класть ихъ въ пыльномъ мѣстѣ.

б) *По существеннымъ показаніямъ* — надлежитъ сообразоваться съ періодомъ и главнымъ свойствомъ катарра. Въ легкомъ остромъ катаррѣ часто сама натура въ состояніи преодолѣть болѣзнь и потому лѣкарства не всегда потребны здѣсь. Для укрощенія возвышенной чувствительности легкихъ и способствованія удобиѣйшему отдѣленію харкотинъ достаточны одни легкія оболакивающія и смягчающія средства. к. т. леденецъ, mucilago sem. cydoniorum, gummi mimosae cum suturo altheae, миндалевое масло съ сыропомъ, свѣжее коровье масло съ сахаромъ, теплое питье изъ отвара просвирничного, локричнаго, пырейнаго корня, набора грудныхъ травъ (N 120) и пр.

Въ насморкѣ можно употреблять таковыя смягчающія и успокоивающія вещества снаружи, втягивая ихъ въ носъ, либо помазывая въ ономъ свѣжимъ масломъ или жиромъ, а въ простудной осиплости и въ катаррѣ дыхательного горла вдыхая теплые пары изъ горячаго настоя бузинныхъ цвѣтовъ посредствомъ Mudge —вой машины, или опрокинутой ворошки.

При сильномъ и упорномъ катаррѣ, выражающемся значительнымъ воспалительнымъ раздраженіемъ, кромѣ приведенныхъ здѣсь средствъ, употребляются еще другія, сильнѣе дѣйствующія и притомъ такія, кои разрѣшаютъ скопленія въ слизистой оболочки, способствуя отдѣленію слизи, либо возбуждая антагонистически кожную дѣятельность и успокаивая чувствительность. Къ первымъ принадлежать нашатырь (N 110) и рвотный камень въ малыхъ пріемахъ (N 114), а ко вторымъ уксусокислый амміакъ (N 108), чай изъ бузинныхъ, помѣрцовыхъ и липовыхъ цвѣтовъ; настой и перегнанная вода изъ малиновыхъ ягодъ, повторительное употребленіе рвотныхъ, особенно изъ рвотнаго виннаго камня (N 104), благотворно дѣйствующаго здѣсь во многихъ отношеніяхъ. Къ успокаивающимъ средствамъ принадлежать: extractum hyosciam, lactucarium (N 5), лавровишневая вода (N 5), ипекакуаникъ въ малыхъ пріемахъ (N 53), уксусокислый морфій, а при слабомъ раздраженіи и самый опій, особенно въ соединеніи съ ипекакуаникомъ (N 7). Слабительныя здѣсь неприличны, но накожныя раздраженія, даже нарывные пластыри, весьма полезны. Кровоисправленія потребны только въ рѣдкихъ случаяхъ, при сильномъ воспалительномъ напряженіи и укрѣпкихъ полнокровныхъ особъ.

По прошествіи воспалительнаго периода, если существуетъ общая слабость и вязкая мокрота надлежащимъ образомъ не разрѣшается, приличны болѣе возбуждающія средства, способствующія отдѣленію слизи. Сюда относятся: златоцвѣтная сорьма (N 121), минеральный кermесъ, сѣра съ локричнымъ или фіалковымъ корнемъ, pulvis

Wedelii et Sellii Ph. Bat; rad squillæ, polyg. senegæ, flor. arnicæ (N 29), acidum benzoicum (N 28) gum. ammoniacum, myrrha etc.

§ 321.

Въ хроническомъ мокротномъ катаррѣ одобряются весьма много рвотныхъ, часто повторяемыхъ (*Laennec*), также бальзамическая и спиртная средства, наипаче пуншъ. Для уменьшения слишкомъ обильного отдѣленія слизи употребляются горкія и крѣпительные лѣкарства, какъ *marrubium album*, *herba tussilaginis*, *polygalæ*, въ особенности *cetraria Islandica*, даже каскариль и хина. При этомъ очень полезно для больнаго принимать обильное количество питья, умножающаго непримѣтное испареніе легкаго, какъ Зельтерская вода, сыворотка и пр. вмѣстѣ съ возбуждающею и крѣпительной діэтою.

Въ сухомъ катаррѣ, для облегченія выхаркиванія перовоцвѣтной мокроты и разжиженія вязкаго качества соковъ *Laennec* употребляетъ слѣдующія средства: а) миндалевое мыло въ формѣ пилюль, вмѣстѣ съ питательными средствами, ежедневно отъ половины до цѣлой драхмы. Если же сухой катарръ сопряженъ съ корчью въ бронхиальныхъ вѣтвяхъ, то къ означеннымъ пилюлямъ прибавляется еще 8—24 грана аммоніаковой камеди для ежедневнаго употребленія; б) теплый въ 27—30 градусовъ морскія ванны, или искусственная щелочная ванны, приготовляемыя съ 4 унцами углекислого поташа, либо натра, также натуральный или искусственный сѣрный ванны; с) углекислые щелочи (*carbonas potassæ, sodae*

vel ammoniæ) 12—56 грань въ день, солянья и сѣрныя минеральныя воды, употребляемыя внутрь не сколько мѣсяцевъ.

§ 322.

По припадочнымъ показаніямъ. Чрезмѣро сильный кашель, въ обыкновенныхъ случаяхъ, при означенномъ способѣ лѣченія, умѣряется беленою, лавровищевою водою и опіемъ, но въ астеническомъ состояніи для сего намѣренія, равно какъ и противъ припадковъ удушья, могутъ служить возбуждающія противусудорожныя средства к. т. liquor ammonii anisatus, liquor cornu cervi succinatus, tra opii camphorata vel ammoniaica, elexir papaveris Ph. Sv. etc. Противъ осиплости дѣйствуютъ хорошо слизистыя средства, леденецъ, нашатырь и пр.

§ 323.

По окончаніи катарра должно пріучать себя постепенно къ вліянію сырого воздуха. Хотя при наклонности къ катаррамъ и рекомендуютъ укрѣплять тѣло холодными обливаніями, морскими и желѣзными ваннами, однакожъ средства сіи не всегда переносятся и потому, для отвращенія частаго приключенія сей болѣзни, гораздо вѣрнѣе и полезнѣе избѣгать всѣхъ случайныхъ причинъ катарра, напаче промоканія, не слишкомъ тепло одѣваться, но всячески беречь грудь отъ сквознаго вѣтра.