

ПРИВАДЕНИЕ

КЪ ХАРЬКОВСКИМЪ ГУБЕРНСКИМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ.

N. 22.

I. ИЗВѢСТИЯ.

Описание спорыни, или хлѣбныхъ роликовъ, и болѣзни, извѣстной подъ названіемъ злой кори, и прог.

(Продолженіе.)

Для уничтоженія вреднаго дѣйствія болѣзнистой причины на организмъ, необходимы прополосудорожная и укрѣпляющія средство, между коими преимущественно полезны: валеріана, ангелика (дягиль), ирный корень, аритика, хина съ прибавленіемъ Миндерерова спирта изъ янтарного оленяго рога (*Liquoris cornu cervi succinati*), Гофмановыхъ капель, селишро-сѣрнаго спирта, *spiritus nitri dulcis*, камфоры, ассаженіды, для выборъ изъ числа сихъ средствъ сообразно сложенію болѣнаго, свойству и формѣ болѣзни. Кровопусканіе пользы не оказываетъ; но если спѣсненіе въ груди сильно, и приливъ и скопление крови въ головѣ явственны, то не безполезно приспавлять піявицы къ вискамъ и за ушами.

Для наружнаго употребленія можно совѣ-

шовать пренія камфорнымъ спиртомъ, или уксусомъ, шеплыть масломъ съ камфорою, или жидкимъ скипидаромъ. Употребленіе теплыхъ ваннъ съ сѣнною шрухою, ароматными травами, золою, или попашемъ, и обыкновенными бани не безполезны, особенно для уничтоженія судорогъ и онѣмѣнія въ членахъ. На открывающіяся язвы на рукахъ и ногахъ прикладываются масло съ воскомъ, или Арцеевъ бальзамъ. Крипичская чесотка излечивается сѣрнымъ цвѣтомъ и сурмачами—препаратаами, данными внутрь, и наружнымъ употребленіемъ мази изъ бѣло-осадочнай ртуши, при помощи ваннъ, или бани.

Питье должно быть кисловатое, напримѣръ не слишкомъ слабый квасъ съ мятою, приготовленный изъ муки хорошаго качества, клюковый, или брусничный съ водою, и обыкновенная вода съ малымъ количествомъ уксуса.

Но всѣ сіи средства останутся пѣщины, если худой хлѣбъ не будешь замѣненъ хорошимъ, и больнымъ не будешь давать здравая пища: изъ говядины, разныхъ крупъ, картофеля и другихъ огородныхъ плодовъ и кореньевъ. Хорошее пиво и настоющее, не

подмѣшанное виноградное вино, также могутъ быть полезны.

*Средства, предотвращающія появление рожковъ на колосномъ хлѣбѣ **.

1. Если земля подъ озимь хорошо обработана, и во время цвета ржи спошитъ ясная и теплая погода, то рожковъ, или спорыны (*secale cornutum*) во ржи не бываетъ. Рожки оказываются въ пѣ годы, когда во время цвета ржи, какъ только появляется на тычинкахъ (*stamen*) плодошпорная пыль (*pollen*), наспашанѣе пасмурная погода, а по ночамъ и утрамъ температура достигаетъ до $+30$ Р. Послѣ того, дни чрезъ два, множество тычинокъ, безъ сомнѣнія убитыхъ холодомъ, сваливаются съ колосьевъ на землю; на некоторыхъ же изъ тычинокъ, оставшихся на колосьяхъ, плодошпорная пыль принимаетъ буроватый цветъ, вмѣсто свѣтолопалеваго, сохранившагося на прочихъ здоровыхъ тычинкахъ. Въ слѣдь за пѣмъ, когда рожь начнетъ наливаться, колосья, съ которыхъ опѣхолода свалились тычинки, оказываются наощупь и для глаза пустыми и просвѣчивающими: такие колосья извѣстны хлѣбопашцамъ подъ именемъ бѣлыхъ; колосья, сохранившие тычинки здоровыми, даютъ обычновенное хорошее зерно; наконецъ колосья, на тычинкахъ которыхъ цветъ плодошпорной пыли сдѣлался буроватымъ, выгоняютъ рож-

ки, изъ пѣхъ именно чашечекъ (*calyx*), где находились тычинки съ бурою плодошпорною пылью. Прочія чашечки сихъ послѣднихъ колосьевъ бываютъ или вовсе пустыя, или съ зернами, негодными для посѣва; потому что онѣ производятъ рожь, котора пропадаетъ при малѣйше неблагопріятныхъ обстоятельствахъ, очень сносныхъ для ржи, при условіи посѣва совершенно здоровыми зернами.

2. При хорошей обработкѣ земли и посѣвѣ не годовалыми, но свѣжими, совершенно спѣлыми, изъ спеловъ выпрясненными, а не вымолоченными зернами, извѣстными хлѣбопашцамъ подъ названіемъ гела, или голушки, рожковъ во ржи не бываетъ, хотя бы холода и ненастіе захватили рожь во время цвета. Рожь опѣхъ посѣва свѣжими зернами воспріимчивѣе къ болѣзни другаго рода: медянной росѣ (*Mellago*), послѣ которой хотя очевидна потеря въ урожаѣ, но досель не замѣчены зерна вредными для здоровья.

Прилаганіе. Если ржаная сѣмяна, самаго лучшаго качества, продержать сушки въ теплѣ, между двухъ дернинъ, или въ смоченномъ войлокѣ, попомъ эпіи, возбужденныя къ развицію, сѣмяна, не допускнѣ до ростковъ, высушить и посѣять; то онѣ не выносятъ холода при температурѣ, не только $+30$ Р., но $+50$ Р. во время цвета, и даютъ бѣлые колосья и рожки. Для поученія воспитанниковъ въ Удельномъ Землемѣрскомъ Училищѣ, при года сряду, приготовленіи вышеописаннымъ способомъ по чеп-

* Директора Удельного Землемѣрческаго училища Байкова.

верику зеренъ, которыя высѣваются на особыхъ полоскахъ. Эти зерна 1835 года не произвели рожковъ, пошому ч то во время цвета ржи погода была благопріятная; но 1836 года, при температурѣ $+ 5^{\circ}$ Р. и 1837 года при $+ 5^{\circ}$ Р., цветъ поспрадаль и оказались рожки, которыхъ во ржи, родившейся опять съмянъ надлежащаго доспописанія, вовсе не было. Они съ пользою употребляются на училищной фермѣ, при трудномъ шеленіи коровъ.

3. Весной, когда на поля рожь начнешь сѣять въ ростѣ и цветѣши, съмяна, сохраняемая въ суссекахъ магазина, замѣнило оказываетъ расположение къ развитию, или, какъ говорятъ крестьяне, отходить. Если этому расположению не воспрепятствовашъ и пакими съмянами засѣять озимь, то она непремѣнно будетъ изобиловать рожками и бѣлыми колосьями, когда во время цвета случится пасмурная и холодная погода. Воспрепятствовать расположению къ развитию **сохраняемыхъ съмянъ** очень легко: спопить только весной въ то время, когда рожь въ поля начинаетъ рости и цветѣть, пересыпать съмяна изъ суссека въ суссекъ; или въ началѣ весны, въ ясный день, развалить съмяна на полога, и въ шеченіе часовъ 6 сущить на солнцѣ. Первый способъ лучше употреблять въ большомъ, а послѣдній—удобо исполнимѣе въ маломъ количествѣ зеренъ.

4. Описанное въ предыдущемъ пункте измѣненіе съмянъ ржи весной менѣе замѣчено,

когда сохраняются они не въ суссекахъ, но въ плошныхъ кульяхъ, или суровыхъ мышкахъ; при сохраненіи же въ пашенныхъ ямахъ, или выжженыхъ кадушкахъ, обмазанныхъ извѣстью, съмяна ржи, въ шеченіе многихъ лѣтъ, вовсе не измѣняются и не даютъ рожковъ.

5. Рожковъ во ржи шѣмъ бываєтъ меньше, чѣмъ болѣе поле подвержено вымочкамъ, и вообще, при одинаковыхъ прочихъ обстоятельствахъ, чѣмъ хуже обработана земля.

Изъ сего слѣдуетъ, ч то хотя причина, производящая бѣлые колосья и рожки во ржи, есть сырая и холодная погода во время цвета ржи; но воспріимчивость ржи къ производству бѣлыхъ колосьевъ и рожковъ, при хорошей обработкѣ земли, зависитъ преимущественно отъ измѣненія, или почные сказашь, разслабленія съмянъ въ продолженіе сохраненія ихъ до посѣва.

Средства къ оправданію этого суждѣнія:

- Выборъ самыхъ лучшихъ зеренъ, или зерна, для посѣва.
- Сохраненіе съмянныхъ зеренъ въ пашенныхъ ямахъ, или въ выжженыхъ кадушкахъ, обмазанныхъ извѣстью и засыпанныхъ на 2 вершка золою съ извѣстью.
- Если съмяна ржи сохраняются въ суссекахъ; то, не дожидаясь пока начнешь охво-

дить въ первые ясные дни весною, пересыпать ихъ изъ сусека въ сусекъ, и то же повторишь, когда рожь начнетъ зацвѣтать въ полѣ. Сѣмяна, сохраняемыя небольшимъ количествомъ, достаточно однажды, въ началѣ весны, развалить на полагахъ и просушить на солнѣцѣ. При этомъ отнюдь не должно пропускать времени, здѣсь опредѣленного. Пересыпка, или пересушка сѣмянъ, сделанная прежде, или послѣ сего времени, не доспавшія успѣха.

Эти средства—не допускшия появленія рожковъ во рожи, удобоисполнимыя въ крестьянскомъ и помѣщичьемъ хозяйствахъ, имѣютъ всегда лучшій успѣхъ, нежели очищеніе ржаныхъ зернь опять родившихся вмѣстѣ съ ними рожковъ. Въ семъ послѣднемъ случаѣ крестьянинъ охопитъ вѣршины, чѣмъ рожки составляющія вознагражденіе недорода зернь въ бѣлыхъ колосьяхъ, неразлучныхъ съ рожками, а не ядъ, котораго должно избавиться; потому онъ не легко рѣшается на спасѣніе рожковъ, очевидно уменьшающее количество и безъ того скучнаго урожая.

Рожки можно опѣльшия опять зернь рожи:
а) Вѣнцемъ хлѣба обыкновеннымъ способомъ, помошью лопаты. Въ этомъ случаѣ рожки падають впередъ самаго крупнаго зерна, или чela; послѣ чего осипаешь только не собирашь вхъ вмѣстѣ съ зернами. б) Подсѣваніемъ хлѣба на грохощахъ и даже на обыкновенныхъ рѣшетахъ, имѣющихъ дырочки шакой величины, чтобы онъ пропускалъ

зерна и задерживали рожки. с) Посредствомъ машины, которой описание смотр. въ 12 N. 1838 г. Жур. Мин. Внутр. Дѣлъ, на стр. 506, вмѣстѣ съ чертежомъ.

(Окончаніе въ слѣдующемъ N.)

Объ истребленіи дворовыхъ и полевыхъ мышей.

Для истребленія этихъ докучливыхъ гостей держать въ домахъ кошекъ, которыхъ впрочемъ надоѣдо кормить не слишкомъ много, равно какъ и не ласкать ихъ безпрестанно. Кроме кошекъ спавать для нихъ различные ловушки.

Выдумано также множество приманокъ и отравъ больше или менѣе дѣйствия льныхъ.

Расскажемъ сперва нѣсколько изъ средствъ для истребленія мышей дворовыхъ. Если кто спроситъ новый домъ, то чтобы мышей избавиться и чтобы онъ никогда не завелась, надоѣдо поспушить слѣдующимъ образомъ: какъ во всѣхъ спроеніяхъ дѣлаются обыкновенно два пола, то неровныя мѣста нижняго пола, происходящія опять невыশесанныхъ бревенъ, для него употребляемыхъ, замазавъ глиною, насыпать на него на полвершка толщиною кожевенныхъ спружекъ, которыя осипаються опять выѣдываемыхъ кожъ и

бросаються на кожевенныхъ заводахъ безъ употребленія.

Поверхъ спружекъ насыпается уже земля и набивается ее сплюшь, сколько между половъ обыкновенно вѣааетъ. И тогда эта земля не допускишь проходить духу опь кожевенныхъ спружекъ въ комашу, а спружки не позволяютъ мышамъ зависнуть, и чи то всего лучше, не на время, а навсегда, пока дамъ сплюстить будеатъ; ибо кожевенные спружки изгниютъ, сославшись изъ себя землю, мышамъ крайне пропишную, въ которой онъ не заведутся.

Весьма хорошо подполье набивать сухими вѣньями крыжовника, шиповника, можевельника и другихъ колючихъ ресеній, которые препятствующъ свободно мышамъ лазить.

Или: По вынутой хлѣба изъ печи, положить въ нее на доскѣ большую пригоршнъ травы цикория (*Cicuta virosa*, Linn. Дв. 26) и оставивъ па цѣлыя сунки, хорошенко закрывши печь заслонкою. Когда трава высохнешь, то сполось ее въ порошокъ; на шесть полныхъ ложекъ этого порошка, положишь около одного золотника чилибухи и шесть полныхъ же ложекъ полченаго бузылочнаго спекла. Замѣсишь всѣ эти вещества въ пѣсто на парномъ молокѣ и накидать его кусочками по мысиламъ, гдѣ водятся мыши. Онъ съ жадносію будущъ єсть ихъ и попи-часъ попомъ околѣюшь.

Или: Взять осьмую часть четырехъ мелкаго солода, фунть чихательнаго корня (*Achillea ptarmica*, Linn), и четыре унца мелко изрѣзанной винной травы (*Delphinium staphylium Sagria*, Linn); все это смѣшавъ вмѣстѣ, просыпти сквозь сплю и на молокѣ съ медомъ замѣсишь въ пѣсто. Когда это пѣсто высохнешь, должно поспашинь его въ черепкѣ шуда, гдѣ водятся мыши, которыя опь этого немедленно изчезнутъ. Мелкий солодъ, смѣшанный съ пережженнымъ самымъ мелкимъ гипсовымъ порошкомъ, также испреблентъ ихъ.

Или: Попиадцать крупныхъ кусковъ чилибухи (*pix vomica*) сперешь па шеркѣ въ самой мелкой порошокъ. Если ихъ сплють, то нельзя ожидать опь нихъ пользы, потому чи то они должны обращены быти въ самую мелкую муку. Попомъ взять вѣсомъ самой лучшей крупнчалой муки впroe болѣе пропишу чилибухи, смѣшать ихъ вмѣстѣ; распустивши фунть свинаго сала на огнѣ, чищше сливъ, а въ слиное, пока оно еще жидкое и горячо, всыпать смѣшанную съ чилибухою муку и мышанъ деревянною лопаточкою, пока сало спашенъ смынуши, чи чтобы оно съ мукою хорошо соединилось. Всыпавъ муку въ сало, не должно уже спашинь его на огонь. Когда это пѣсто засыхнешь, должно положить его иѣсколько кусочковъ, въ орѣхъ величиною, въ шѣ мысилъ, куда мыши ходятъ. Чилибуха смертельна всякому живошнному, которое родится съ нынѣ; человѣку же, кроме рвоты, не дѣлаетъ вреда.

Опь дворовыхъ обращаемся въ мышахъ полевымъ.

Полевая мышь отличается опь дворовой своимъ корошенькимъ хвостомъ и пищающей преимущественно хлѣбныи и зернами, кои посыпаются подбираются на пашни, и даже умѣетъ шакашь изъ колосьевъ, а иногда шакаешь и самыя колосья. Она не живеши въ одной норѣ, но безпрѣстанно починъ дѣлаешь себѣ новыи и пошому не собираешь запасу, а каждый день выходишь искать пищи, и часто очень далеко; но всегда возвращаешься въ свою нору.

Для испребеленія ихъ есть также нѣсколько средствъ. Во первыхъ вырываешь по межамъ хлѣбныхъ полей ямы, спавляешь въ нихъ муравленые глиняные горшки, налиши до двухъ прешей водою, и обсыпаешь ихъ землею шакъ, чтобы мыши удобно могли къ нимъ подходить. На всякой горшокъ кладутъ деревянной валикъ, имѣющій придачанія въ срединѣ крескообразно двѣ дощечки, на подобіе крыльевъ у вѣнчальныхъ мельницъ. Валикъ кладешся на горшокъ шакъ, чтобы оба его конца лежали на краяхъ его и чтобы онъ могъ легко оборачиваться, а не зацеплять крыльями за край сосуда. Крылья валика намазываешь всякой вечеръ жаренымъ спаренымъ свинымъ саломъ; но можно привязывать и куски сала къ крыльямъ валика. Когда мыши услышашь запахъ споль пріятной для нихъ приманки, то сбѣгутся во множествѣ къ горшкамъ и наступая на крылья

валиковъ, переворотишь ихъ и пошопунь въ водѣ. Такимъ образомъ случается испребелить мышей по двѣстѣ въ одну ночь.

Это же самое средство можно употребить въ садахъ, домаахъ, около скирдовъ хлѣбныхъ, въ анбараахъ хлѣбныхъ и проч. Можно шакіе горшки съ водою и просою зарывашь до самыхъ верхнихъ краевъ, не употребляя валиковъ, но конечно съ приманкою лучше.

Другое средство.

При кладкѣ хлѣба въ скирды надобно сперва наслать на то мѣсто, гдѣ спояши скирду, полыни *Artemisia absinthium*, Linn. (дѣ. 197), а такжѣ можно эту шправу сверхъ того класпъ и въ самомъ скирдѣ между спонами. Въ иныхъ мѣстахъ вмѣсто полыни употребляютъ Англійскую мяту (*Mentha piperitis*, Linn. дѣ. 192), дикую мяту (*Mentha sylvestris*, Linn.), коихъ сильной запахъ пропитиенъ мышамъ; а гдѣ росшепть чемерица, то корень ея, особенно черной чемерицы (*Verastrum nigrum*, Linn.), употребляется такимъ же образомъ для сохраненія хлѣба.

Третье средство.

Надобно развесить сажи въ довольною количествѣ воды и положивъ шуда полыни вскипятивши хорошенько, попомъ налиши этого ошвара во всѣ норы, коиорыя найдены будущъ на полѣ. Это должно дѣлать въ мокрую погоду, ибо тогда вкусъ и запахъ мо-

жепгъ продолжашся до тѣхъ поръ, пока жидкость проникнешъ въ самое сокровенное убѣжище мышей, въ какомъ случаѣ онѣ не въ сословіи уже прошившиесь дѣйствію сажи.

Если нужно эту оправу сдѣлать еще дѣйствительнѣе, то сперва бросишь въ каждую пору по нѣсколько маленькихъ камышковъ негашеной извести, а потомъ уже наливашь шуда этого составу. Когда норы не слишкомъ глубоки, мыши тощасъ выбѣгающи и если разбросашь еще по полу пѣсча; сдѣланного изъ осинки ячменной муки, фунта чесничнаго корня, четырехъ унціовъ вишній правы (*Staphysagria*), полфунта меду и молока, что пѣ изъ нихъ, кооторыя не перемруши въ норахъ, выбѣгающи оттуда, не могутъ избѣжашь смерти, наѣвшись пѣсчи, коорое раздѣляющи на маленькие кусочки, величиною въ ржаное зерно.

Четвертое средство.

На $\frac{3}{8}$ фунта муки взяши полфунта свинаго сала и одну луковицу. Перемѣшавши все это между собою, поджариши на сковородѣ, держа ее надъ легкимъ огнемъ, и прибавивши къ смѣси $\frac{5}{8}$ фунта негашеной извести, $\frac{1}{4}$ фунта порошку корня чернаго алебора (*Helichorus niger*, Linn. Дв. 94), два лотка сахару, 4 лотка стекляннаго порошку, 1 лотокъ чилибухи и столько сала, чтобы, смѣшивши все вмѣстѣ, можно было дѣлать ихъ смѣси плюти, величиною не больше гороховыхъ семянъ. Надѣлавши шакихъ плюти или шарни-

ковъ, разбросашь ихъ въ сухую погоду по нивамъ или около ихъ. Мыши, наѣвшись ихъ, умирають.

Пятое средство.

Нарѣзавъ свѣжихъ сочныхъ побѣговъ бузины, обмочишь половину ихъ въ деготь и какъ обмоченные въ деготь, шакъ и свѣжіе вошкнуши въ гряды не только шамъ, где видны сдѣланнныя эими живописными скважинами, но и шамъ, где нѣтъ ихъ. Это средство шакъ дѣйствительно, чио ни одна мышь не останется даже въ огородѣ, где оно употреблено.

ЧАСТНЫЯ ИЗВѢЩЕНІЯ.

1.) Желаютъ напечь управляющаго имѣніемъ, который бы зналъ совершенно свое дѣло. Таковый, съ одобрительными апостолами, можетъ явиться для условій на дачу Елизаветполь, близъ г. Харькова.— Тамъ же имѣютъ надобность въ конюшникѣ, знающемъ сечеводство.—2.

Вѣдомость о привезенной и проданной шерстии и другихъ предметахъ, во время Харьковской Троицкой ярмарки 1839 года.

КАКИЕ ИМЕННО ТОВАРЫ И ПРОДУКТЫ.

	На какую сумму привезено было.	На сколько во время ярмарки про дано.
	Рубли.	Рубли.
Шерстии испанской § перегонной 70,979 пудовъ	2,839,160.	2,799,160.
§ грязной 49,907 пудовъ	1,247,675.	1,222,675.
Лошадей разныхъ породъ 339 штукъ	58,500.	28,350.
Рогатаго скота 189 штукъ	13,230.	11,200.
Барановъ и овцы мериносовыхъ испанскихъ 142 штуки	42,600.	24,600.
Канареекъ 150 штукъ	1,350.	990.
 Итого : :	4,202,515.	4,086,975.

Къ 22 N. Приб. къ Хар. Губ. Вѣд.

Такса, учиненная для города Харькова на Июнь месяца 1839 года, по коей надлежитъ производить продажу съѣстныхъ припасовъ, вѣрнымъ вѣсомъ и мѣрою.

З В А И Е П Р О Д У К Т О ВЪ:		Чет- верти	Руб.	Коп.
Ржи	-	1	7	-
Ржаной муки	-	1	7	30
Муки пшеничной:	озимой яровой	1	13	-
Муки гречневой	-	1	11	50
Ячменю	-	1	6	-
Солоду ячнаго крупнаго	-	1	14	-
Сѣмя коноплянаго	-	1	9	50
Овса	-	1	3	50
Крупъ	гречневыхъ пшеничныхъ	1	8	-
		1	17	-
<i>Мяса</i>		<i>Пуды:</i>		
1-го сорта: гори, духи и шпундры	-	1	5	20
2-го сорта: секъ и костирецъ	-	1	4	40
3-го сорта: заднія стегна и переднія лопатки	-	1	3	20
Баранины свѣжей	необрѣзной обрѣзной	1	2	-
Свинины	необрѣзной обрѣзной	Не		
Солонины говяжей	необрѣзной обрѣзной	Симѣ	зпс	и
Баранины соленой:	необрѣзной обрѣзной	3		
Полная спудень	-	—	—	80
Ливерь	-	—	—	40
Языкъ	-	—	—	40
Почки	-	—	—	35
Голова	-	—	—	35
Мозги	-	1	12	-
Ветчинны	-	1	2	60
Солоду ржанаго мелкаго	-	1	2	-
Соли крымской	-	1	10	-
Сала свинаго	1-го сорща 2-го сорща	1	8	-
Свѣчей сѣльныхъ	-	1	14	-
Сала говяжьяго	1-го сорща 2-го сорща	1	12	10
	шопленаго	1	7	70
Масла коровьяго	шопленаго нешопленаго коноплянаго	1	20	80
	конооплянаго	1	18	-
		1	8	-

Сына	-	-	-	-	-	-	1	-	45
Соломы	-	-	-	-	-	-	1	-	18
Рыбы соленой		судака	-	-	-	-	Не	имъе	псл.
		леща	-	-	-	-			
							Футии:		
Хлѣба печенаго	круничаго	-	-	-	-	-	1	-	20
	пшеничнаго	1-го сорта	-	-	-	-	1	-	15
		2-го сорта	-	-	-	-	1	-	12
	ржанаго	-	-	-	-	-	1	-	4
Рыбы соленей: карасей, короповъ, судака, лещей, окуней, плотвы, щукъ и сомовъ							1	-	15
Прочей мелкой рыбы	-	-	-	-	-	-	1	-	11

Цены на мясо и печеный хлѣбъ пос掌ованы на монету, а прочие въ припасы приведены на ассигнацii.