

22.2.1. Sordaria
Sordes - споры

100 1.

Sordaria lappae A. Pot. - Syll. XXII ¹¹⁹

Периоциеи спорангии, эллипсоидные, $450 \pm 200 \mu$. Мелкие
циррии $120-150 \pm 16 \mu$; споры темные, эллипсоидные, $24 \pm 14-15 \mu$, частые
пазы.

На мшистых камнях Lappa major

35.3.

Купен. у. Копенгага 19.. (А.А.)

22. 3. 4. *Leptospora*
λεπτός - μικρός, λεπτός

101

2.

Kr. Brand. VII ²⁰⁷

Leptospora ovina (Pers.) Tux. - Rabh. II ²¹³ / Syn.: *dasysphaeria ovina* Ces. et de Not.

На овечьем шерсте.

Харх. у. Карачева IX 1867 (Nympha)

Taap

Colero

467

Heinrich v. Knappe 1882 (Munich)
Heinrich v. Knappe

22.3.14. *Rosellini*

Rosellini - амбарный вран и ершовой вран.

109

6.

Rosellinia aquila (Fries) de Notaris - Rabh. II ²²⁴, Kr. Brand. VII ²¹²

На сырое бревно *Corylus avellana*

12.1.

Лавров, Дамновна 24/IV 1834 (Земель)

Rosellinia pulveracea (Ehrhardt) Fries. - Rabh. II ²²⁸, Kr. Brand. VII ²¹⁵

Размер 250-300 м, ширина 70-80-7 м, длина 10-11-5-6 м.

На мучке грибового зерна.

Лавр. у. Девури IV. 1873 (Neuro).

22.3.2 Coleroa.
^{οδυσσειαν} κόλος - ^{ημερον} ημερον, ^{κολλος} ημερον = ^{κολλος} κολλος, ημερον.

103 2.

Coleroa chaetomium (Kunze) Ralb. - Ralb. II ¹⁹⁸, Kr. Brand. IV ²²² Syn. i
 Ventura Kunzei Jacc.
 Cepdapsu: Fungi Rosiae ²³⁹

Ha ^{rubus} Rubus caesus

21.7.

Kypen. r. C. Lukas Nomina 14/VIII 1911 (Ludwig)

22.3.6. *Lariosphaeria*
λάριος - косматый, шершавый, βύσσις - шипы.

104 4.

Lariosphaeria hirsuta (Fries) Ces. et de Not. - Rabh. II ²¹⁰, Kr. Wand. VII ²³³

Споры конусообразно изогнуты в виде буквы концы, шарика односторонне, глянцевые, заразит многоклеточные, буроватые, 50-60 μ 5-6 μ .

На петлявнике опухать.

Курск, г. Путеевск. у. Софроньева пудовки 12/IX 1836 (Зернелов).

22.3.8. Chaetospheria.

105 5-

Хейт - думное барокко, кудри, бисер-матр.

Chaetospheria fusca Tuxel - Rabh. II ²¹⁹, Kr. Brand. VII ²³⁶

Многочисленные нити нережемы в зыемой боинке нр репо-сфоре нрре,
300-350 м. Цилиндр 85-100 ± 14-16 м, норе нундфуре нн - дуннеонд нннн
25-30 ± 7 м.

Chaetospheria fusca

(Corylus)

"" Acer

12.1.

23.6.

Хейт IV 1834 (Corylus).

22.5.5. Otthia
Justas Otth - немецкий миколог.

к сѣп 57

106 7.

Плодовая гниль ~~бѣла~~ слабо развитой строится, черная, съ бородавчатой или конусовидной гребенчатой. Споры широко-эллипсоидальные или яйцевидные, бурые, густо мучные.

По Фуккеру к бугамъ этого рода (*O. piri* Tuck., *O. pruni* Tuck., *O. rosae* Tuck. и др.) относятся пикнидиальные массы *Diplodia pseudodiplodia* (Sphaeropsis malorum) ^(Phytopathology), *D. pruni*, *D. rosae* и др. Но, ^{L. Kester'y указавъ доказавъ, что} ~~сначала~~ исследованъ *L. Kester'a Sphaeropsis malorum* взошелъ ввиду паразитизма *Physalospora cydoniae* Arnaud. Поэтому предположенъ Фуккеромъ *complanatella*.

22.5.6. Gibberidea
gibber-ropoz

107 8.

Gibberidea vixei Fuen. - Kalk. II ²⁴⁸, Kr. Maand. VII ²⁹³.

По функции сюда относятся *Microdiplodia vixei* и *Sphaeropsis vixei*

Rangi Rossia 33

18.4. Cucurb. Gerberidis

1

22.5.7. Cucurbitaria

108 9.

Cucurbita - miska, krobocovnaia danka.

Tenella, Kascemula, Pleomassarina.

Cucurbitaria ribis Nicol - Rabh. II ³²⁸

Cn. $\frac{15-22}{6-8}$

Cyma $\frac{100-135}{8-15}$

Ha cytax bombes Rites rubrum

21.2.

Kypex ²/V 1912 (Medegha)

C. Channi (Neer) Fr. - Jaar

Cucurbitaria acervata Fries var. *triseptata* Spegb.

in Amb.

Ha. bombycis *Pirus malus*

21.4

Kypex. 2. 23/XI 1913 (Cnsd.)

Cucurbitaria caraganae Karst. — Rabh. II ³²⁰, Kr. Brand. VII, Syn.:

C. laburni (Pers.) Ces. et de Not.

St. pyen.: *Camarosporium caraganae*, Thoma sp.

Zepdapiu: Funzi Rossiae ³²

Ha. bombycis *Caragana arborescens*

21.5

Kypexobi IV, X 1903 (Ath.), Kypexobi 21/VII 1903 (Ath.)

Kypex. 2. Pamerp. y. 16/IV 1903 (Ath.)

Cucurbitaria elongata (Fries) Greville — Rabh. II ³²², Kr. Brand. VII ²⁰⁷.

St. pyen.: Hendersonia pseudocaciae u. Camarosporium pseudocaciae

Ha. omnepus *bombycis* *Robinia neo-mexicana*

21.5

Kypex. 2. Pamerp. y. 5/V 1904 (Ath.)

D.A.	31	57	-49	25	
A.P.	27	47	-53	24	120/6 20
E.J.	58	78	-22	11	
B.N	98	118	+18	9	8
H.H	189	209	+109	54	50
A.A	93	113	+13	6	5

Cucurbitaria caraganae Kunt. - Kolt. II, 1892, K. Kunt. III, 1893.
C. caraganae (Kunt.) Kolt. II, 1892.
St. Yerm.: *Canavalia caraganae*, Kunt. v.
Cyprip. : *Canavalia caraganae* 2.

The *Canavalia caraganae* order.
Kunt. II, 1892 (Kunt. v. 1892, 1893).
Kunt. v. 1892 (Kunt. v. 1892, 1893).
Cucurbitaria caraganae (Kunt.) Kolt. II, 1892, K. Kunt. III, 1893.
St. Yerm.: *Canavalia caraganae* v. *Canavalia caraganae* Kunt. v.

The *Canavalia caraganae* order.
Kunt. v. 1892 (Kunt. v. 1892, 1893).

Stigmataea mespiti Torauer — ?

St. con.: Entomospodium maculatum

1.D

1.C

var. hirsuta
var. nuda

var. hirsuta

Na mespiti Petrus communis

21.2.

(St. con.: Lapeyrola, odu. sp. 8/VIII 1913 (Lapeyrola)

Kyren. v. g. Kyren. 30/VII 1903 (Lapeyrola)

~~Mye. populi + Sept. populi~~ 9.1

Mye. salicicola { Sept. salicis
Ram. rosea

9.1

(cin. deseguba
+ Sept. sal. cin.)

~~M. na Hellaria Ann. p. 9/1/1916~~ 17.6

~~Mye. morifolia + Ph. mori = Sept. mori~~ 13.2



22.9.5. *Mycosphaerella*

111

12.

^{мук} ~~*M. ext. alis*~~ ^{6. f. a. p. - m. a. p.} *Septoria glauca* *H. italica*
Mycosphaerella punctiformis (Pers.) Schr. - Rabh. II ³⁸²

На непереносимых *Quercus*

12.2.

Кавк. у. VII 1873, Сесс. энот. (Несс).

Кавк. у. Памес. у. V 1908 (Ан.)

Mycosphaerella maculiformis (Pers.) Schr. - Rabh. II ³⁸³

St. cor. *Phl. guercicola*, *Ranulbura* (Wuf.)

Sp. Septoria
dub. guercicola

На непереносимых *Quercus*

Quercus

12.2

Титра

25.2.

Кавк. у. Памес. у. IV 1908, (Ан.) 27/V 1915 на *Quercus* (Ном.)

Mycosphaerella ulmi Kleb.

St. pyen. *Septoria ulmi* 36.8.11. *Phl. ulmi*

Сепар. : *Jaap* ³⁷⁶

На непереносимых *Ulmus campestris*, *U. montana*.

13.1.

Mycosphaerella oxyacanthae Jaap.

St. pyen.: *Septoria oxyacanthae* (Jaap); St. microspyr.: *P. phloerata* sp. (Pot.)

Upt. apic.: Jaap 188

Mycosphaerella crataegi

St. pyen.: *Septoria crataegi*

Mycosphaerella crataegicola Bond. et Transsch. - Myc. Fon. pag. 1913

St. pyen.: *Septoria crataegicola* Bond. et Transsch.

Sp. c. ph. oxyacanthae

Uromyces Crataegus sanguinea

Bojonebr, nonon. par. (15/VIII 1912?) (Bond. et Transsch.)

Mycosphaerella grossulariae (Fries) - Syll. - Rabh. II ³⁸⁷.

St. pyen.: Septoria zibis (Zarp)

Зарп.: Зарп ¹⁵⁴

Зарп. 102-148

Зарп. 29,7-54
8,1-11,8

Зарп. 2,6-32,4
2,02-3,77

На пересмобавунах мекхак Rhus rubrum

Харов. (Зарп.) 6/V 1915 (Kjzsa)

Купен. 14/IV 1911 (Medschka), Зарп. 19/IV 1908 (Bond.)

Возможны случаи заражения плодов, около 10 мм. в диаметре. Купен. 14/IV 1911 (Medschka) - Zarp. 19/IV 1908 (Bond.)
Смешанная с купен. 14/IV 1911 (Medschka), Зарп. 19/IV 1908 (Bond.)

21.2.

Mycosphaerella bellona (Sacc.)

St. pyen.: ? Phyllosticta pirina (Sacc.)

На мекхак Rhus communis

Харов. 08.08. 8/VII 1913, Зарп. 19/IV 1908 (Bond.) ? Zarp. 17/III 1903 (Bond.)

Mycosphaerella sentina (Fr.)..... - Rabh. II ³⁸⁹.

St. pyen.: Septoria piricola Desm. 36.8.1.1.

Зарп.: Зарп ⁵⁵, Bucholtz ²⁴⁷ (conid.)

21.4.

На пересмобавунах мекхак Rhus communis

Купен. 2. Рамеф. 9/IV 1913 (Stk.)

(Зарп. 20/IV 1912 (Medschka)) St. pyen.

21.4.

Mycosphaerella mali A. Pot. n. sp.

Cu. ff. ital. ⁵⁹² = Sph. porri Pers.

Цифры 60-70 = 13-15, споры 18-20 x 5-6 μ

На перепрививаемых мутовках *Prunus malus*

21.4.

Харьков 23 /IV/ 1909 (АН.).

Мунд *Myc. bellona*. Сличивание на эвенте туго *Mycosphaerella* ^{предположительно} *ibidensis* Bara-
gornae, так как на ней не известно ни одного вида *Septoria*.

Mycosphaerella cerasella Atterhald -

St. con.: no Atterhald'у - *Cercospora cerasella*.

На мутовках *Prunus cerarus*

21.4.

(Харьков. Огров. у. эк. Поселение 12/VII/1912 (Медведев) / St. con.

М. на *Prunus domestica* (+ *Gloeosporium polygrammum*)

18/V/1914 (Ном)

Sphaerella maculans Jacq. et Rom. — Fungi Rorace ⁸⁴
" *Spiraea Ulmaria*
autumnus 1854. Jacq.

Spt. Lepogrypha = *Spt. Isclorpora* (Traverso, N 134)
Spt. sp. = *Spt. varbi-aucopariae* (Oederke K. Brand)

114 15.
Myc. lighea? }
Myc. rubina? } Septoria rubi, Rhabd. rubi. An Mycelium N 486-487

Mycosphaerella fragariae (Tul.) ... - Rabh. II ³⁷⁰

F. zhen. 2018.

St. con.: ? Ramularia Tulasnei, ? Acrechyta fragariae Larch.

Уездан: ? Bond. Ued. sp. d. ^{60a} (Ramularia)

На перемовавунах мучбелл Fragaria sp.

21. 4.

(St. con.: Купер 25/VII 1903 (Bond.)

Купер. у. Зрагек. усен. 4/VII 1912 (недегел.)

Воронев, Коммунар. парсадн. 12/VII 1912 (Bond. нед.)

Mycosphaerella Jaczewskii A. Pot. - Syll. XXII

St. pyen.: Septoria caraganae Hann. 26.8.1.1.

Уездан: Cepidus unicolor ²⁷¹.

На перемовавунах мучбелл Caragana arborescens

21. 5.

Купер. у. Рамеш. у. 15/V 1909. (Ak.)

Mycosphaerella lathyrus A. Pot. - Syll. XXII

St. pyen.: Septoria ...

На перемовавунах мучбелл Lathyrus piriiformis

21. 5.

Купер. у. Рамеш. у. V 1908 (Ak.)

Mycospha. orob. Kara Kulon - N 268

Mycospha. robiniae - Sept. robiniae

Myioph. carinellus ? *Ramulosa h. totii* Jaap 374

25.1 *Myioph. villegana* ? *Cerospiza* Jaap 377

Myi. nautiformis var *lypocanthus* = *Sept. geseu* (Jaap 23.6

23.8

Myioph. hircacii ? *Ramulosa hircacii* - Jaap 263

30.1 *Myioph. lycinachae* ? *Ramulosa lycinachae* - Jaap 275

Rab. Targ. cur. 1947.

Mycosphaerella pinodes (Berk. et Bosa) - Rab. II³⁷²

St. pyen.: Ascochyta pisi.

Didymella pinodes.

21.5

Mycosphaerella violae A. Pot. - Syll. XXII

? Sept. violae

Ha nepes umobabunxx mycexx Viola hirta

26.4

Kypen. 2. Pamph. y. beua 1909 (Ath.).

em. Flora italica 598

Mycosphaerella aegopodi: A. Pot. - Syll. XXII. Syn.: Phyllactora podagrariae

in Ber. ur Fl. italica

St. pyen.: Septoria podagrariae Lank, Phyllosticta aegopodii All.

St. sclerotielis: Phyllactora podagrariae

Ha nepes umobabunxx mycexx Aegopodium podagraria

28.2.

Kypen. 2. Pamph. y. IV 1908 (Ath.).

M. na Leonurus Carduaceae - Kun. pome 9/1916 (Kyd) 32.6

Mycosphaerella populi

Mycosphaerella

- Munster:
- 1) *Septorigene* *Emmelya* *Septoria*
Ascochyta *genae*
 - 2) *Didymellopsis* - *Ascochyta*
 - 3) *Ramularigena* ? - *Ramularia*
 - 4) *Gph. opuntiae* - *Gloeospor. lunatum* - *Ann. Myc. 8 1912 124*
 - 5) *Cercosporigena* - *Myospha. ceratella*

Ephaerella melonis Ferraris — Ann. Mycol. X²⁸⁶ 1912
Tab. IX 1.1-4.

(= ? *Dodgynella melonis*)

M. maubertiformis var. *hippocastani* Jaap
? chum or *Septoria aceruli* (Lil.)
— Jaap. 425

Mycoasph. Tularni (Janetz) = ?? *Cladosporium herbarum*

22.10.7. Didymella.

118 21.

Насекомы от *Silvius* - двонот, на глянцевом споре

Didymella melonis Pass. - Syll. IX ⁶⁶². Syn.: ? *Mycosphaerella strullina* (C.O. Smith)

Grossenbacher - Syll. XII ¹²⁴ - ^{Tung. italici 596}, *Sphaerella melonis* Ferraris

St. pyen.: *Ascochyta* (*strullina* C.O. Smith) *melonis* d. pot.

Виды:

Периодически равномерно распределенные по пораженному ^(новое-попытки) участку, шаровидные, ^{или 2-3, реже 4-5} мемно-бурое, со слабоголубоватым ободочком, 175-200 μ в диаметре, со кривыми углублениями

10-15 μ ширины. Сумма ⁷⁸⁻⁸⁵ 80-100 $\approx$ 10-12 μ , споры в огуле реды, 17-19 $\approx$ 8-9 μ , бесцветные,

носы, со перепородной и слабенькой перепородной перегородкой; испустил клубочек

немного (на 1 μ) уже вертней. Паразиты немнотомементы, неубавившие, с перепородной

перегородкой, несколько гуще сумки.

На *Cucumis melo* и *Cucumis melo*

Купе. с. фант. 4. 26/II 1909.

Gron.

Mycosphaerella strullina имеет сумки 45-58 $\approx$ 7-10, споры 10-12 $\approx$ 3.5-4.5 μ , паразиты ⁵⁹⁶ (по Traverso, Fl. Italica crypt. - 50-70 $\approx$ 8-12 (по Traverso - 14-20 $\approx$ 4-6) паразиты ⁵⁹⁶).

Аналог -

Как и *Mycosphaerella pinodes*, споры отмирают от микробов

Mycosphaerella сумками, не собранными в нити и соробанам не всевозможны, а

~~нормальны~~ ^{нормальны}, одновременно со сумками. Сумки цилиндрические, а не бугровидные, со

однородно расположенными спорами.

Sphaerella melonis Ferraris - Ann. Mycol. X, 1912 ²⁸⁶. Tab. 1. 14. 1. 1. 4

На *Cucumis melo* и *Cucumis melo* 17. VII 1908, Savojs.

Сумки без паразитов. Споры 14-17 $\approx$ 4.5-6 μ .

Иногда, паразиты споры и по времени соробанам (норм), всевозможны по-разному *Didymella melonis*, но тоже отмирают от микробов паразитов. Форма

бесцветная сумки не указана, но, судя по рисунку от бугровидных.

Pseudomycesella
Didymella pinodes.

Rab. Jungi cury 1942.

Rab. II 372

St. pyren. & *Ascochyta pisi*

Did. leonuri

na Leonurus cardiaca

Num. porsa 9/2 1916 (Kozol).

22.6.

19/IV 1915 na psonchabunice. Emopyu znyy 6 kacepax sobax *Ornithoglossum* (num.
 Nym. 240 μ diam 58-82-14 μ , c.

¹ G. Armand, L'Anthracnose des pois, La Revue de Phytopath. T.I 1913⁶⁵

J. E. Melhus, *Septoria pisi* in relation to pea blight, Phytopathology v. III 1913⁵⁷

R. S. Stone, The life history of *Ascochyta* on some leguminous plants. Ann. Mycol. 1912. X⁵⁸⁴

R. E. Vaughan, *Myco-sphaerella pinodes* the acrigerous stage of *Ascochyta pisi*, Phytopathology v. III 1913⁷¹



22.10.8, *Didymosphaeria*
Нашелъ на сѣбѣ - двои и бѣдѣ - на сѣ.

120 23.

Didymosphaeria populina Vuill.

H. con. ?

Cp. сѣ *Venturia chlorogera*.

Didymosphaeria elaeagni A. Pot. — ~~Myth. 1891~~, *Spod. cumis. 1912* ²²

H. con. : *Coryneum elaeagni* Jacc.

На сѣбѣ *Elaeagnus angustifolia*

24.2.

Нашелъ II 1912 (Умбери)

Didymosphaeria ^{lyeri} *marrarioides* Sacc. var. *major*. — ^{coll. ...} *Syll. XXII* ¹⁷² _{18 722}

Syn. : *Didym.*

H. con. : *Sporodesmium lyeri* var. *major*.

На сѣбѣ *Lycium barbarum*

32.6.

Нашелъ 11/III 1906 (Ан.).

22.10.10. *Dislophra*

121 24

Νεότερον οὗτο λόφος - λαοποιον, ἔδω, δι' ἄλλοις - (καὶ ἄλλοι) τοῦ ὅλως παρεβυδαίου πρὸς ἀπὸ

Dislophra graminis (Fuek.) Sacc. - Rabh. II ⁵³³

St. pyen. : *Dislophospora graminum* Germ. 26.8.3.2.

Ma Phleum Boehmeri

Microspora dom. cf. *Dislophospora*
Zag. y. un. Outmanen 6/VII 1912

22.10.14. *Leptosphaeria*
λεπτός - тонкий, λεπτός; σφαίρα - шар.

192

Leptosphaeria graminis (Faux.) Sacc. - Kall. II ⁴⁵⁷

Σερδάρου: *Cereopsis kikotsi* ¹²¹

На союммунах Phragmites communis

5.1

Κυρ. 2. Βρομοποιρ IX 1908 (*Cereopsis kikotsi*)

Leptosphaeria culmifraga (Fr.) Ces. et de Not. - Kall. II ⁴⁵⁶. Syn.: *Pleospora culmifraga* Faux.

На амблесс Bromus sp.

5.1.

Βορ. 2. Βαζονα. 4. αν. Ορβμανα 5/VIII 1912 (Βονδ. κ. Λεδ.)

Leptosphaeria tritici (Gen) Pan. - ? Sacc. Ep. II ⁶²

на Triticum repens

5.1

2. Βορ. 2. 18/VIII 1912 (Βονδ. κ. Λεδ.)

Leptorphaera

на мислене Рънз Малъ
Аури Купен Рус. Копор. у

Стор. из Византии. 19-21 в 5 р
Ахм 50 = 10 р

Hydrogynae 218
3 Dec 1932.

Leptosphaeria herpotrichoides de Not. — Rabh. II ⁴⁵⁸

На мучкосебелуадиумуаа *Secale cereale*

5.1.

Купенс 23/V 1911 (Медсепеа)

Leptosphaeria salicinarum Sacc — ?

На мучкосебелуадиумуаа *Salix* sp.

Мбегенс. м. Уакоа 24/IX 1911 (Медсепеа)

Leptosphaeria conferta Nienl. — Rabh. II ⁴⁶⁶

Лепдари: Лепдариумс 20

На сукате амедукта *Herberoa incana*

Купенс. в. Трауропоа 25/V 1908 (Лепдариумс)

518
- Jaar
(Tun) Sa -
Leptorhynch. coniothyrium
re Kikus idaeus

Leptosphaeria ritzi Karst. — Syll. X²²⁹, XI²²²

На ^{субстрате} ~~мел~~ ex *Ribes rubrum*

2. Борок, номос. парк. 20/VII 1912 (Бонд. и Мед.)

Leptosphaeria acerina A. Bondarzew n. sp.

На ~~мел~~ ex *Acer platanoides*

286.

Борок, г. Мамежман. Мем. 13/VIII 1912 (Бонд.)

Leptosphaeria modesta (Desmaz.) Auerw. — Rabh. II⁴⁷¹

Урбани: Седжменск ⁷⁰

На ~~сук~~ *Bombus* *Dupleurum falcatum*

287

Кырк. 2. Меденко 16/VIII 1909 (Седжменск).

Leptosphaeria periclymeni Aud. var. *tatarica* Apôt. — Syll. XXII ²²³

На губеке нодворак Сонісера татаріка
 Лапхоті 12/II 1906 (АН.).

34.2.