

К-909

6.4. на 1890г.

П46478


ХАРЬКОВСКИЙ СБОРНИК

Литературно-научное приложение к
«Харьковскому календарю» на 1890 г.

Выпуск 4

Харьков
Типография Губернского правления
1890


V.N. Karazin Kharkiv National University
00199676



6

908(477.59)....1917"(03)

Y. 909



7.909а № 36


✓

Ігу

Ізмін

✓







113
13

ХАРЬКОВСКІЙ

СБОРНИКЪ.



Литературно-научное приложение къ „Харьковскому Календарю“
на 1890 годъ.

1 гру
випускъ

ВЫПУСКЪ 4-й.

ИЗДАНИЕ ХАРЬКОВСКАГО ГУБЕРНСКАГО СТАТИСТИЧЕСКАГО КОМИТЕТА

ПОДЪ РЕДАКЦІЕЙ ЧЛЕНА-СЕКРЕТАРЯ КОМИТЕТА

В. И. Касперова.




38

ХАРЬКОВЪ.

Типографія Губернскаго Правленія.

1890.



ХАРЬКОВСКИЙ

СЕОЗОННЫЙ

СЦЕНІЧНИЙ ЧИНОВНИКІХ, ДЛЯ ІНДІЙСЬКОЇ ФОРУМ-ОНДУЛІСТВИ.

Печатано по постановленю Харківського Губернського Статистическаго
Комитета 28 лютого 1890 р.

АДМІНІСТРАТИВНА І ОСВІДЧИЧНА ОБЛАСТЬ ХАРЬКОВСЬКОГО ГУБЕРНАЦІІ

АДМІНІСТРАТИВНА І ОСВІДЧИЧНА ОБЛАСТЬ ХАРЬКОВСЬКОГО ГУБЕРНАЦІІ

І АДМІНІСТРАТИВНА І ОСВІДЧИЧНА ОБЛАСТЬ ХАРЬКОВСЬКОГО ГУБЕРНАЦІІ

Центральна наукова бібліотека
ХНУ імені В. Н. Каразіна
2013р.

08

СОДЕРЖАНИЕ.

Отдѣлъ I. Статистико-Экономический.

	<i>Cтр.</i>
Экономический очеркъ Харьковской губерніи	1
Очерки растительности Харьковской губ. и сосѣднихъ съ нею мѣстностей. <i>Л. О. Павловича</i> (продолженіе)	25
О вредныхъ въ садоводствѣ насѣкомыхъ въ Харьковской губер- нії. <i>Ив. Шевырева</i>	59
Заслуживаетъ ли пчеловодство вниманія крупныхъ землевладѣль- цевъ. <i>Юрія Мосолова</i>	78
Итоги земской статистики въ Харьковской губерніи за прошлое десятилѣtie. <i>А. Руcова</i>	82
Харьковскій университетскій садъ и его новыя задачи. <i>А. Краснова</i> . 104	

Отдѣлъ II. Литературно-Научный.

Народные рассказы о кладахъ (Материалы для характеристики міросозерцанія крестьянского населенія Купянского у.). <i>П. И.</i>	1
Одежда крестьянъ сл. Араповки, Купянского уѣзда, примѣты и повѣрья, относящіяся къ ней и къ матеріаламъ, изъ кото- рыхъ она сдѣлана. <i>Моисея Снубанъ</i>	49
Степанъ Лукичъ Геевскій. <i>Н. Ф. Сумцова</i>	57
Общий очеркъ древностей Харьковской губерніи <i>Д. И. Багаллья</i> . 76	
Памяти ректора Харьковского университета Петра Петровича Гу- лякъ-Артемовскаго. <i>Н. Лашеннова</i>	93
Иванъ Николаевичъ Рейпольский (набросокъ). <i>М. П. Савинова</i> .	99
Нѣсколько словъ о художнике Яблочковѣ. <i>М. Халанскаго</i> . .	105
Указатель книгъ и брошюръ, напечатанныхъ въ Харьковѣ съ 1805 по 1879 годъ. <i>Г. С. Чиринова</i>	108

СОДЕРЖАНИЕ

Библиография I (литература)

1. Книги и документы, изданые в 1900—1901 гг.
2. Статьи в периодических изданиях.
3. Труды научных учреждений.
4. Труды научных обществ.
5. Труды научных институтов.
6. Труды научных ассоциаций.
7. Труды научных комитетов.
8. Труды научных конференций.
9. Труды научных выставок.
10. Труды научных выставок союза и ядро национального племенности.

Библиография II (литература)

1. Книги и документы, изданые в 1900—1901 гг.
2. Статьи в периодических изданиях.
3. Труды научных учреждений.
4. Труды научных обществ.
5. Труды научных институтов.
6. Труды научных ассоциаций.
7. Труды научных конференций.
8. Труды научных комитетов.
9. Труды научных выставок.
10. Труды научных выставок союза и ядро национального племенности.

ОТДѢЛЪ I.

СТАТИСТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКІЙ.

САД СПАРТО

НІКОЗЕРНМОНОВ-ОНТСЛТАТ

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОЧЕРКЪ ХАРЬКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ

ЗА 1888 ГОДЪ.

а) Земледѣліе. Атмосферические условия зимы и весны 1887/8 года были на столько благопріятны, что подавали большія надежды на урожай. Озимые посѣвы, покрытые выпавшимъ въ изобиліи снѣгомъ, сохранились превосходно. Весною непромерзшая земля впитала всю эту массу снѣга, что въ свою очередь способствовало какъ произрастанію озимовыхъ хлѣбовъ, такъ и посѣву яровыхъ. Въ апрѣлѣ и маѣ стояла не менѣе благопріятная, теплая, влажная погода. Но наступившее затѣмъ чрѣзмѣрно дождливое лѣто съ бурями и градомъ оказалось вредное вліяніе на растительность. Дожди съ юго-восточными вѣтрами, совпавшіе съ временемъ цвѣтенія и налива ржи и пшеницы, покрутили ї по-ложили на землю рослый и густой озимый хлѣбъ, вслѣдствіе чего онъ не могъ во-время созрѣть и зерно вышло легковѣснымъ. Особенно гибельнымъ оказался для растительности сильный порывистый вѣтеръ, начавшійся 27 іюня и перешедшій затѣмъ въ страшную бурю, которая продолжалась цѣлые сутки, мѣстами сопровождаясь ливнемъ и градомъ. Отъ града наиболѣе пострадали волости Хотинская и Ястребенская, Сумскаго уѣзда, въ которой уничтожено 375 десятинъ озимаго хлѣба и 325—ярового, всего на сумму 21,875 руб.; Попельнянская и Шебелинская волости, Зміевскаго уѣзда, потерявшия отъ той-же причины 887 дес. разнаго рода хлѣба на сумму 32,270 руб.; особенно же большиіе убытки причинило градобитіе нѣкоторымъ волостямъ Изюмскаго уѣзда, гдѣ выбито до 3,000 дес. разнаго хлѣба. Непрерывные дожди не предохранили совершенно хлѣбовъ и отъ вредныхъ насѣкомыхъ, нападшихъ мѣстами значительный убытокъ населенію. Въ Изюмскомъ уѣздѣ, несмотря на избиеніе въ 1888 году 214,000 овражковъ, они принесли много вреда южнымъ и юго-восточнымъ волостямъ; хлѣбный жукъ уничтожилъ въ теченіе іюня и іюля хлѣба на 4,500 руб. въ Рѣчанской и на 1,200 руб. въ Хотѣнской волостяхъ Сумскаго уѣзда; приблизительно на такія-же суммы—въ волостяхъ Степановской, Терешковской, Нижне-Сыроватской и нѣкоторыхъ другихъ. Въ Зміевскомъ уѣздѣ появились на ячменѣ насѣкомыя, называемыя народомъ „блохами“, причемъ ихъ нападенію подверглись лишь поздніе посѣвы, между тѣмъ какъ рядомъ стоящіе, ранніе—оставались нетронутыми. Ячмень,

пострадавший отъ этихъ насѣкомыхъ, остановился въ ростѣ, пожелтѣлъ, сталъ рѣдокъ и, выкошенный въ концѣ юля, возвратилъ лишь сѣмена. Еще болѣе значительные убытки тому-же уѣзду причинилъ хлѣбный жукъ, уничтожившій въ степныхъ волостяхъ приблизительно на каждыя 100 десятинъ посѣва не менѣе пяти. Указанныя бѣдствія, предившія растительности, преимущественно же атмосферическія условія лѣта, дали въ результатѣ урожай только выше средняго, не оправдавъ вполнѣ возлагавшихся на него первоначально надеждъ.

Какъ наиболѣе характерное явленіе 1888-го года, слѣдуетъ отмѣтить различіе въ положеніи двухъ главныхъ факторовъ земледѣлія—труда и капитала.

Земледѣльческій трудъ при тѣхъ условіяхъ, въ которыхъ находилось сельское хозяйство въ названномъ году, не только не проигралъ, но скорѣе выигралъ. Эти условія сложились для него въ высшей степени благопріятно. Дождями и бурями лѣта, какъ было замѣчено выше, озимые хлѣба покрутились и полегли, что съ одной стороны значительно затруднило уборку, съ другой—помѣщало имъ во-время созрѣть, вслѣдствіе чего сборъ озимыхъ и яровыхъ хлѣбовъ производился почти одновременно. То и другое вызвало громадный спросъ на рабочія руки и сильно подняло заработную плату, доходившую временами до 3 руб. 50 коп. и болѣе за день. Но и помимо этихъ немногихъ въ году дней страдной поры земледѣльческій трудъ оплачивался сравнительно высоко, независимо отъ страшнаго паденія цѣнъ на хлѣбъ, даже скорѣе выигрывалъ отъ этого паденія. Нижеслѣдующая сравнительная таблица, представляющая цѣны на рабочія силы въ 1883 и 1888 годахъ, показываетъ, на сколько эти цѣны могутъ возвышаться несмотря на кризисъ, переживаемый нынѣ земледѣліемъ:

ПЛАТИЛОСЬ.	Рабочему съ лошадью.		Рабочему пѣшему.	
	НА СВОИХЪ ХАРЧАХЪ.			
	1883 г.	1888 г.	1883 г.	1888 г.
Въ періодъ производствавесеннихъ посѣвовъ	90 к.	1 р. 35 к.	35 к.	50 к.
Бо время сѣнкоса	1 р. 5 к.	1 р. 25 к.	65 к.	80 к.
Бо время уборки хлѣба. . . .	1 р. 50 к.	1 р. 85 к.	85 к.	1 р. 35 к.

Итакъ, въ 1883 году, когда цѣны на хлѣбъ были еще сравнительно высоки, рабочія силы оплачивались несравненно хуже, чѣмъ въ 88-мъ при невозможной дешевизнѣ хлѣба, особенно ржи, доставляющей главный предметъ питанія рабочему населенію. Вотъ сравнительная таблица хлѣбныхъ цѣнъ за тѣ-же годы:

	1883 г.	1888 г.
	Ч Е Т В Е Р Т Б.	
Рожь	6 р. 80 к.	3 р. 44 к.
Пшеница	9 р. 35 к.	7 р. 32 к.
Гречиха	5 р. 80 к.	4 р. 69 к.
Просо	7 р. — к.	4 р. 34 к.

Такимъ образомъ земледѣльческій трудъ, оплачиваемый самъ по себѣ высоко сравнительно съ прошлыми годами, представится еще болѣе дорогимъ, если принять во вниманіе значительное удешевленіе продовольствія. Ко всему этому можно прибавить, что еще выше оплачивались сельскія работы въ сосѣдніхъ съ Харьковской губерніей областяхъ Донской и Кубанской, куда потянулись и многіе Харьковскіе крестьяне, вернувшись затѣмъ съ хорошимъ заработкомъ, въ 80—100 руб. на человѣка.

Въ совершенно обратномъ положеніи находился въ 88-мъ году земледѣльческий капиталъ. Обработка земли и уборка обошлись, какъ уже сказано, крайне дорого, между тѣмъ цѣны на хлѣбъ не только не соответствовали стоимости рабочихъ силъ, но даже еще понизились. Изъ нижеслѣдующей таблицы хлѣбныхъ цѣнъ за два послѣднихъ года видно, что кромѣ пшеницы и овса, всѣ остальные виды хлѣбовъ болѣе или менѣе подешевѣли. Пшеница осталась приблизительно въ той-же цѣнѣ какъ въ 1887 году, а овесъ нѣсколько вздорожжалъ:

	1887 г.	1888 г.
	Ч Е Т В Е Р Т Ъ.	
Рожь	4 р. 10 к.	3 р. 44 к.
Пшеница	7 р. 31 к.	7 р. 32 к.
Овесъ	2 р. 56 к.	2 р. 75 к.
Ячмень	3 р. 64 к.	3 р. 40 к.
Гречиха	4 р. 94 к.	4 р. 69 к.
Просо	5 р. 40 к.	4 р. 34 к.

Приведенные цифровые данные указываютъ, правда, лишь на обезцѣненіе зерновыхъ продуктовъ сельского хозяйства, цѣны которыхъ устанавливаются не мѣстнымъ, а міровымъ рынкомъ, но именно зерновые продукты, въ особенности рожь и пшеница, и составляютъ главный предметъ сбыта земледѣльческой Харьковской губерніи. Ни скотоводства, ни лѣсного промысла, какъ самостоятельныхъ отраслей сельского хозяйства, здѣсь не существуетъ. Пахотныя земли составляютъ подавляющую часть пространства губерніи: по даннымъ Центрального Статистического Комитета, поверхность ея равна 4.768,458 десятинамъ; изъ нихъ владѣльческой и крестьянской надѣльной пахоти—почти 3 мил. десят. (2.970 т.), болѣе трети которыхъ (1.130 т.) засѣвается рожью и пшеницею и почти двѣ трети (1.800 т.) вообще зерновыми хлѣбами.

При такомъ преобладаніи въ губерніи пахотныхъ земель, а между по-
слѣдними—земель, засѣваемыхъ зерновыми хлѣбами, цѣны на хлѣба,
а въ частности—на рожь и пшеницу, могутъ служить вѣрнымъ пока-
зателемъ доходности земледѣльческаго капитала.

Указаннымъ положеніемъ въ 1888 мѣсяце земледѣльческаго труда и
капитала вполнѣ опредѣляется и относительная степень благосостоянія
двухъ главныхъ группъ земледѣльческихъ хозяйствъ—крестьянскихъ и
владѣльческихъ.

Хозяйства крестьянскія, оставаясь неизмѣнно со всѣми своими не-
достатками въ технической организаціи и пріемахъ культуры, находи-
лись все-же въ сравнительно лучшемъ состояніи. Урожай предыдущаго
года далъ крестьянамъ возможность увеличить площадь посѣвовъ, снаб-
дивъ ихъ достаточнымъ количествомъ сѣмянъ, а вполнѣ удовлетвори-
тельный урожай и высокая плата за сельско-хозяйственные работы 88-го
года—обеспечили ихъ продовольствиемъ и дали лучшій, сравнительно
со всѣми предыдущими годами, доходъ.

Напротивъ, на владѣльческія хозяйства неблагопріятныя условія го-
да обрушились всею своею тяжестью и способствовали только больше-
му ихъ упадку. Землевладѣльцы, нуждаясь въ деньгахъ, большую частью
принуждены были продавать свой хлѣбъ себѣ въ убытокъ,—отсюда об-
щее въ средѣ ихъ безденежье. При такихъ условіяхъ землевладѣльче-
скія хозяйства продолжали, съ одной стороны, все болѣе обременяться
долгами, съ другой—переходятъ въ иные руки. Такъ, въ Харьковскомъ
отдѣленіи Государственного Дворянскаго банка въ теченіе года были раз-
смотрѣны слѣдующія дѣла по выдачѣ ссудъ:

УѢЗДЫ.	Число вы- дан. ссудъ въ 1888 г.	Количество принятой въ залогъ земли.		Выдано по ссудамъ. Рублей.
		Десятинъ.	Сажень.	
Старобѣльскій.	3	27,308	1,565	479,200
Сумскій . . .	4	2,975	2,083	303,100
Богодуховскій .	6	5,593	1,321	254,100
Лебединскій . .	6	3,395	1,650	237,400
Валковскій . .	2	3,363	431	180,600
Изюмскій . . .	13	6,575	1,489	166,600
Харьковскій . .	4	1,132	444	93,800
Зміевскій . .	4	2,409	1,345	84,600
Волчанскій . .	2	1,261	130	30,500
Купянскій . .	4	1,325	235	26,200
Итого . .	48	55,340	1,093	1.856,100

Всего-же къ 1 января 1889 г. въ залогѣ въ Харьковскомъ отдѣле-
ніи банка состояло 215,940 дес. 1,093 с. на сумму 8.407,100 руб.
Кромѣ того оставались неоконченными 27 дѣлъ въ количествѣ 25,417
дес. 134 саж. на сумму 2.149,150 руб.

Изъ числа проданной въ 1888 г. землевладѣльцами, при содѣйствіи Крестьянского банка, земли большая часть (а именно 3,200 дес. 939 саж.) находилась въ залогѣ и только 715 дес. 1,575 саж. были свободны отъ залога. Земли эти принадлежали:

Дворянамъ и чиновникамъ	3,688	д.	771	с.
Купцамъ	135	д.	410	с.
Мѣщанамъ	87	д.	294	с.
Нѣмцамъ колонистамъ	5	д.	100	с.
Всего	3,915	д.	1,575	с.

Общее число купленныхъ крестьянами при помощи Крестьянского банка земель было въ 88-мъ году несравненно меньше предшествующихъ лѣтъ, что также вполнѣ объясняется особенной невыгодностью землевладѣнія именно въ этомъ году. Въ теченіе его съ помощью банка совершиены купчія крѣпости по 25 сдѣлкамъ, при чёмъ число до-мохозяевъ и количество приобрѣтеною ими земли распредѣляются по уѣздаамъ слѣдующимъ образомъ:

Название уѣз- довъ.	ДОМО- ХОЗЯСТИ.		Колич. земли.		Разрѣш. крестьян- скому бан. ссу- да.	Доплата крестьянъ.	ИТОГО.	
	Число палитн.	число налитн. мужеск. пола душъ.	Дес.	Сажен.			Рубли.	К.
Ахтырскій .	62	216	277	553	28,135	7,615	—	35,750
Богодухов.	141	408	157	2,140	12,500	3,052	50	15,552 50
Волчансій .	15	55	116	—	6,240	2,860	—	9,100
Изюмскій .	72	198	711	1,915	34,650	4,212	—	38,862
Купянскій .	61	231	329	36 ^{2/3}	14,260	3,077	50	17,337 50
Лебединскій.	21	89	67	—	6,860	6,540	—	13,400
Старобѣл.	197	687	2,000	—	69,300	4,000	—	73,300
Харьковск.	52	173	256	1,731	25,070	3,124	68	28,194 68
Итого .	621	2,057	3,915	1,575 ^{2/3}	197,015	34,481	68	231,496 68

Въ среднемъ выводъ на каждого домохозяина приходится 6,3 дес., на каждую наличную душу муж. п.—1,9 дес., а стоимость каждой купленной десятины выразится въ 59 руб. 12 коп. Всего значительное произошло передвиженіе землевладѣнія въ руки крестьянъ въ Старобѣльскомъ, а затѣмъ Изюмскомъ уѣздахъ, гдѣ оно достигало и въ предыдущихъ годахъ большей интенсивности. Вовсе не было продано крестьянамъ земли въ уѣздахъ Сумскомъ, Валковскомъ и Зміевскомъ. Изъ крестьянъ, купившихъ земли въ Изюмскомъ уѣздѣ, только 21 до-мохозяинъ съ семействами, состоящими изъ 49 душъ муж. п., принадлежали мѣстному населенію, остальные-же 51 дом. при 149 пал. муж. п. д.—были переселенцы:

изъ Таврической губерніи	2	дом.	2	души
“ Курской ”	5	”	11	”

изъ Черниговской	"	4	дом.	12	душ.
" Полтавской	"	13	"	33	"
" Купянского уѣзда	"	26	"	90	"
" Зміевскаго	"	1	"	1	"

Въ Волчанскомъ уѣздѣ земли пріобрѣтены исключительно переселенцами—выходцами изъ Орловской губерніи. Крестьяне, пріобрѣтшіе земли при помощи банка, распредѣляются по размѣрамъ своего землевладѣнія до покупки слѣдующимъ образомъ: 56 домохозяевъ (156 наличн. м. п. д.) были вовсе безземельны; 128 дом. (424 нал. м. п. д.) имѣли не болѣе $1\frac{1}{2}$ дес. на душу; 330 дом. (1,105 нал. м. п. д.)—отъ $1\frac{1}{2}$ до 3 дес. на душу и, наконецъ, 107 домохозяевъ (372 наличн. м. п. д.)—отъ 3 до 6 дес. на душу.

Дешевизна и обиліе хлѣбныхъ продуктовъ и хорошие заработки населения Харьковской губерніи послужили благопріятными условіями для развитія мѣстнаго винокуренія, которое выразилось какъ на числѣ винокуренныхъ заводовъ, такъ и въ особенности на количествѣ выкуренного вина. Число заводовъ, дѣйствовавшихъ въ 88-мъ и предыдущемъ годахъ, было:

	въ 1887 г.	въ 1888 г.
винокуренныхъ	42	44
пиво-медоваренныхъ	20	18
собственно-медоваренныхъ	1	1
водочныхъ	7	7

Отсюда видно, что винокуренные заводы, удовлетворяющіе потребностямъ преимущественно народныхъ массъ, увеличились въ 88-мъ году на два, тогда какъ заводы, изготавливающіе пиво и медъ, потребляемые главнымъ образомъ городскимъ населеніемъ, уменьшились на такое-же число.

Соответствіенно увеличенію числа винокуренныхъ заводовъ увеличилось и количество выкуренного вина: выкурано въ 1887 году 134.702,915 $\frac{3}{4}^{\text{0}}$, а въ 1888 г. 154.366,673 $\frac{3}{4}^{\text{0}}$, т. е. въ 88-мъ году болѣе на 19.663,758 0 . Изъ другихъ губерній было привезено: въ 1887 г. 9.859,820 $\frac{1}{2}^{\text{0}}$, а въ 1888 г. 7.353,777 0 , т. е. въ 88-мъ менѣе на 2.506,043 $\frac{1}{2}^{\text{0}}$. Изъ общаго числа градусовъ вина и спирта: 63.418.7981 $\frac{1}{2}^{\text{0}}$ было вывезено въ другія губерніи (болѣе предыдущаго г. на 12.589.709 $\frac{3}{4}^{\text{0}}$); 33.346,678 0 отправлено за границу (менѣе 87 года на 7.535,368 $\frac{3}{4}^{\text{0}}$); 264,730 0 отпущенено на выдѣлку лака, политуры, духовъ и пр., менѣе 87 года на 56,841 $\frac{1}{2}^{\text{0}}$.

Усиленный вывозъ вина и спирта въ сосѣднія губерніи былъ вызванъ относительно хорошимъ экономическимъ состояніемъ ихъ въ 1888 году, а уменьшеніе отпуска за границу объясняется возвышениемъ курса кредитнаго рубля.

Что касается потребленія вина въ предѣлахъ Харьковской губерніи, то за два послѣднихъ года, по свѣдѣніямъ Акцизного Управления, оно представляется въ такомъ видѣ: въ 1887 году 58.285,789 $\frac{1}{2}^{\text{0}}$, а въ 1888 году 62.533,633 $\frac{1}{2}^{\text{0}}$, но при этомъ число градусовъ, потреблен-

ныхъ въ 1888 году, показано, за исключениемъ усышки, которой оказалось на бывшее въ приходѣ вино 4.936,116⁰, между тѣмъ въ цифровыхъ данныхъ 1887 года усышка включена и равнялась по приблизительному разсчету 4.400,000⁰; слѣдовательно, исключивъ эту усышку, получимъ болѣе точное число потребленныхъ въ 1887 г. градусовъ, т. е. 53.885 789^{1/2}, а разница между 88-мъ и предыдущими годами выразится въ 8.647,844⁰.

Губерніи и области, служившія въ этомъ году рынкамиъ сбыта для харьковского вина и спирта, слѣдуютъ по количеству вывезенныхъ, сравнительно съ предыдущимъ годомъ, градусовъ въ такомъ порядке:

Сравнительно съ 1887 годомъ

вывезено въ Херсонскую губернію на	4.593,036 ^{1/4} ⁰	болѣе
" " Екатериносл.	3.002,670 ⁰	"
" " Таврическую	2.101,577 ^{1/2} ⁰	"
" " Полтавскую	1.025,507 ⁰	"
" " Киевскую	805,926 ⁰	"
" " Курскую	621,471 ⁰	"
" " Закаспійскую Область	46,845 ⁰	"

Но обиліе и дешевизна хлѣбныхъ продуктовъ въ 88-мъ и предыдущемъ годахъ имѣли своимъ послѣдствиемъ не одно только усиленіе выкурки вина и болѣе потребление его; тѣ-же причины отразились и на количествѣ употребленныхъ за 1887/8 г. на винокуреніе хлѣбныхъ припасовъ сравнительно съ картофелемъ и особенно свеклосахарной патокой.

Употреблено на винокуреніе.	въ 1886/7 г.	въ 1887/8 г.
Хлѣбныхъ разнаго рода припасовъ Зеленаго солоду.	1.355,723 ^{1/2} п.	1.824,173 п.
	267,402 ^{1/2} "	322,079 ^{1/4} "
Картофеля	1.656,760 "	1.739,079 ^{1/2} "
Свѣклосахарной патоки . . .	1.300,737 "	1.352,089 "
Всего . . .	4.580,623 п.	5.237,420 ^{3/4} п.

Изъ этой сравнительной таблицы видно, что патоки употреблено за 1887—1888 г. болѣе нежели за 1886—1887 г. приблизительно на 51 т. пудовъ; картофеля около 88 т. п. болѣе, зеленаго солода около 55 т. п. болѣе, тогда какъ хлѣбныхъ припасовъ болѣе на 468 т. п. Это громадное увеличеніе именно хлѣбныхъ припасовъ получить еще большее значеніе, если принять во вниманіе, что въ послѣднее время хлѣбные припасы годъ отъ году все болѣе замѣнялись въ винокуреніи картофелемъ и патокой; такъ:

У П О Т Р Е Б Л Е Н О.					Въ какомъ году.
Картофели.	Патоки.	Хлѣбн. припасовъ.			
627,656 п.	1.104,207 п.	2 705,890 п.			188 ³ / ₄
2.443,905 "	1.038,907 "	2.053,609 "			188 ⁴ / ₅
1.662,751 ¹ / ₂ "	1.173,361 "	1.646,804 "			188 ⁵ / ₆
1.656,760 "	1.300,737 "	1.355,723 ¹ / ₂ "			188 ⁶ / ₇
1.739,079 ¹ / ₂ "	1.352,089 "	1.824,173 "			188 ⁷ / ₈

Отсюда видно, что периодъ винокуренія 188⁷/₈ года значительно ослабилъ обнаружившуюся въ послѣднее время съ большимъ постоянствомъ тенденцію къ переходу винокуренія отъ чисто-хлѣбнаго къ хлѣбо-картофельному и паточному.

Благодаря возрастающему значенію, пріобрѣтаемому картофелемъ и частію свекловицей (патока) въ винокуренномъ производствѣ посѣвы этихъ не хлѣбныхъ растеній постоянно увеличиваются. Такъ, въ 1883 году картофеля было засѣяно въ Харьковской губерніи всего около 145 т. четвертей, въ 1884 и 1885 гг. около 153 т., а въ 88-мъ и въ предыдущемъ годахъ уже около 197 т. четвертей.

Что касается свекловицы, то сѣется она преимущественно для свеклосахарныхъ заводовъ, по мѣсту нахожденія послѣднихъ, въ районѣ сѣверо-западныхъ уѣздовъ губерній. Всего свекловицей было въ 88-мъ году засѣяно 29,081 дес., т. е. нѣсколько менѣе (на 334 дес.) предшествующаго года, но при этомъ значительное уменьшеніе занятыхъ свекловицей десятинъ произошло только на заводской, экономической землѣ, именно—съ 24,642¹/₂ на 22,863¹/₂ дес.; между тѣмъ, на землѣ плантаторской посѣвъ ея даже значительно расширился—съ 4,772¹/₂ на 6,217¹/₂ дес., при чемъ уменьшеніе общаго числа засѣянныхъ свекловицей десятинъ не отразилось на ея сборѣ, который составилъ въ 88-мъ году 4.424.757,2 берковцевъ, т. е. болѣе предыдущаго года на 238.916,8 берк., или на десятину 148 берк.

Табачныя плантаціи находились въ 88-мъ году въ 5 городахъ и 447 селеніяхъ Харьковской губерніи, занимая въ общей сложности пространство въ 513 дес. 897 кв. с., т. е. на 143 дес. менѣе предшествующаго года. Но уменьшеніе занятой табачными посѣвами земли не отразилось на числѣ плантацій, которое, напротивъ, значительно увеличилось; ограничились только ихъ размѣры. Такъ, въ 1887 г. въ Харьковской губерніи насчитывалось 2,775 плантацій и 2,577 мелкихъ посѣвовъ, въ 88-мъ же году—7,788 плантацій и 12,169 мелкихъ посѣвовъ. Съ меньшаго противъ предшествующаго года количества десятинъ собрало и меньшее число пудовъ табаку, при чемъ уменьшеніе коснулось, главнымъ образомъ, высшихъ сортовъ:

Собрано табаку:	1887 г.	1888 г.
Изъ турецкихъ сѣяній . . .	7,067 п.	5,127 п. 34 ф.
" американск.	85 "	5 "
" махорки и бакуну . . .	38,316 " 20 ф.	37,937 " 14 ¹ / ₂ ф.
Всего	45,468 п. 20 ф.	43,070 п. 8 ¹ / ₂ ф.

Попытка развести табачную плантацию въ Старобѣльскомъ уѣздѣ была сдѣлана въ 1887 г. мѣстнымъ землевладѣльцемъ Лыковымъ, посыпавшимъ сортъ турецкаго табака подъ именемъ „Персиканъ“, но несмотря на удовлетворительный урожай, онъ остался непроданнымъ вслѣдствіе чрезмѣрно низкой цѣны, предложенной харьковскими фабрикантами.

Дождливое лѣто 88-го года дало урожай сѣна ниже средняго и большою частью дурнаго качества. Во многихъ мѣстахъ рѣки и рѣчки, выступивъ изъ береговъ, затопили луга, вслѣдствіе чего луговое сѣно, бывшее въ покосахъ или конвахъ, совершенно пропало, а мѣстами осталось вовсе неубраннымъ. Постоянными проливными дождями испорчена и масса спелнаго сѣна. Только немногие хозяева успѣли окончить сѣнокосъ до наступленія дождей. Если къ этому прибавить, что яровая солома вслѣдствіе тѣхъ-же причинъ получилась ржавая, то положеніе рабочаго скота въ 88-мъ году представится не вполнѣ обеспеченнымъ относительно корма. Вообще-же скотоводство, благодаря урожаюмъ двухъ годовъ, а особенно отсутствію эпизоотій, нѣсколько улучшилось, чemu способствовали и удовлетворительныя цѣны на скотъ.

Тонкорунное овцеводство находится въ рукахъ исключительно крупныхъ землевладѣльцевъ и арендаторовъ казенныхъ оброчныхъ статей. Сравнительно сильнѣе развито овцеводство въ Старобѣльскомъ уѣздѣ, гдѣ въ 88-мъ году имѣлось 46 заводовъ овцеводства, въ которыхъ числилось: матокъ 32,158, ярокъ 18,157, валаховъ 28,387 и барановъ 3,663, а всего 82,365. Шерсти съ нихъ получено 14,684 пуда. Старые валахи и матки, по снятіи шерсти, сбываются прасоламъ и арендаторамъ оброчныхъ статей, которые нагуливаютъ ихъ на нанимаемыхъ земляхъ для убоя.

Коневодство находится въ рукахъ правительства и нѣкоторыхъ землевладѣльцевъ. Число частныхъ конскихъ заводовъ съ каждымъ годомъ все болѣе сокращается, такъ какъ коневодство составляетъ предпріятіе, не доставляющее ни выгоды, ни пользы для хозяйства, а есть скорѣе дѣло любительское. Въ Сумскомъ уѣздѣ существовало въ 88-мъ году 5 конскихъ заводовъ и въ Старобѣльскомъ—5 (158 головъ). Въ прочихъ уѣздахъ коневодство развито еще менѣе и вообще будущности не имѣеть, ибо по своей дороговизнѣ и невыгодности совершенно не по средствамъ большинству даже крупныхъ землевладѣльцевъ при ихъ настоящемъ стѣсненномъ экономическомъ положеніи. Тѣмъ большее значеніе получаютъ правительственные конские заводы, снабжающіе жеребцами случные пункты, устраиваемые земствами. Такіе случные пункты имѣются уже въ нѣсколькихъ уѣздахъ и оказываютъ замѣтное влияніе на улучшеніе мѣстной породы лошадей, по крайней мѣрѣ близь лежащихъ селеній. Весной 88-го года былъ открытъ случный пунктъ съ 5 жеребцами въ г. Ахтыркѣ и, согласно постановленію послѣдняго очередного уѣзднаго земскаго собранія, будетъ увеличенъ приводомъ еще 8 жеребцовъ изъ Харьковской заводской копюши.

Свиневодство въ настоящее время вообще существуетъ въ самыхъ ограниченныхъ размѣрахъ, ведется землевладѣльцами и крестьянами лишь для удовлетворенія домашней потребности. Нѣкогда значительно

развитое въ мѣстахъ существованія винокуренныхъ заводовъ, оно совершенно пало вслѣдъ за сокращеніемъ числа этихъ заводовъ.

Разведеніе въ губерніи пеньки, льна и маслобойныхъ сѣяній производится лишь въ совершенно ничтожныхъ размѣрахъ.

Садоводство и огородничество, существуя повсемѣстно въ губерніи, никогда не достигаетъ сколько-нибудь значительныхъ размѣровъ. Садоводствомъ мѣстное крестьянское населеніе почти не занимается. Болѣе или менѣе обширные фруктовые сады остались лишь въ тѣхъ владѣльческихъ имѣніяхъ, гдѣ они были разведены въ старое время, но и тѣ большую частью эксплоатируются не мѣстнымъ населеніемъ, а сдаются въ аренду еще на цвѣту выходцамъ изъ Курской, Орловской и другихъ смежныхъ великорусскихъ губерній. Нѣсколько больше развито садоводство въ Тарановской, Зароженской и Замостянской волостяхъ, Зміевскаго уѣзда, откуда фрукты сбываются въ Харьковъ, и мѣстами въ Балковскомъ уѣздѣ, гдѣ садовые плоды покупаются пріѣзжими скупщиками, а также вывозятся въ сухомъ видѣ за предѣлы губерніи, преимущественно въ мѣстности степная—для продажи или обмѣна на хлѣбъ въ зернѣ.

Бахчеводствомъ, существующимъ въ губерніи также въ ограниченныхъ размѣрахъ, занимаются преимущественно пріѣзжіе бахчевники,—какъ, напр., въ уѣздахъ Старобѣльскомъ, гдѣ выходцы Павловскаго уѣзда, Воронежской губерніи, снимаютъ съ этою цѣлью у землевладѣльцевъ земли, уплачивая за однолѣтнюю аренду отъ 10 до 25 руб. за десятину.

Подводя итогъ вышеизложенному, получимъ такую характеристику 1888-го года въ сельско-хозяйственномъ отношеніи: въ этомъ году можно указать два наиболѣе замѣтныхъ экономическихъ факта—высокая заработка плата и продолжающееся обезщѣненіе хлѣба. Взаимодѣйstвіе этихъ двухъ фактovъ повело къ цѣлому ряду послѣдствій. Во-1-хъ, оно подняло выгодность земледѣльческаго труда и благосостояніе представителя его—крестьянина, но вмѣстѣ съ тѣмъ понизило доходность земледѣльческаго капитала и способствовало большему разоренію землевладѣльца. Во-2-хъ, поднятое благосостояніе крестьянского населенія повлияло на развитіе винокуренного производства, увеличивъ потребленіе вина, размѣры винокуренія, самое число винокуренныхъ заводовъ, а дешевизна хлѣбныхъ продуктовъ отразилась на большемъ употребленіи ихъ какъ материала для винокуренія, сравнительно съ картофелемъ и патокой. Въ-3-хъ, разореніе землевладѣльцевъ усилило ихъ задолженность и способствовало дальнѣйшему передвиженію землевладѣнія въ руки крестьянского населенія.

б) Обезпеченіе народнаго продовольствія. Хорошіе урожаи 1888 и предшествующаго ему годовъ, поднявъ общій уровень благосостоянія сельского населенія, устранили необходимость въ принятіи въ 1888 году какихъ либо особыхъ мѣръ по обезпеченію народнаго продовольствія. На сколько мало нуждалось населеніе въ посторонней помощи, видно изъ того, что въ теченіе всего года не было ни одно-

го ходатайства о ссудѣ изъ губернского продовольственного капитала. Ходатайства о ссудахъ изъ хлѣбозапасныхъ магазиновъ поступали въ самому незначительномъ количествѣ, и то только отъ погорѣльцевъ, неимущихъ вдовъ, сиротъ и калѣкъ, призрѣваемыхъ сельскими обществами. Губернскимъ земствомъ были выданы ссуды изъ общественныхъ запасовъ только по двумъ уѣздамъ и при томъ въ незначительномъ размѣрѣ: по Богодуховскому—ярового хлѣба 30 четвертей и по Старобѣльскому—озимаго 61 четверть и ярового 66 четвертей. Уѣздными земствами ссуды были выданы только въ четырехъ уѣздахъ и также въ небольшемъ размѣрѣ: въ Старобѣльскомъ—2,396 четвертей, въ Харьковскомъ 1,758 четв., въ Изюмскомъ 47 четвертей и въ Сумскомъ 41 четверть.

Продовольственное дѣло въ большей части губерніи находится въ удовлетворительномъ положеніи. Особенно хорошо стоитъ оно въ уѣздахъ, имѣющихъ фабричную и заводскую промышленность, каковы: Харьковскій, Ахтырскій и Сумскій. Здѣсь количество хлѣба въ запасныхъ магазинахъ почти повсемѣстно достигаетъ указанной закономъ нормы, нерѣдко даже и превосходитъ ее. Въ худшемъ положеніи находится уѣзды исключительно земледѣльческіе. Здѣсь неурожай прежнихъ лѣтъ и отсутствіе постороннихъ заработковъ заставили населеніе усиленно прибѣгать къ займамъ изъ общественныхъ запасовъ, послѣдствиемъ чего явилось почти полное истощеніе хлѣбозапасныхъ магазиновъ. Хорошіе урожаи послѣднихъ двухъ лѣтъ оказали и здѣсь свое влияніе на пополненіе запасныхъ магазиновъ, тѣмъ не менѣе еще не вездѣ они въ настоящее время приведены вполнѣ въ удовлетворительное состояніе.

Вопросъ обѣ общественныхъ запашкахъ, какъ наиболѣе дѣйствительномъ способѣ обеспеченія народнаго продовольствія, не глохнетъ въ сознаніи мѣстного населенія. Этотъ вопросъ возбуждался, между прочимъ, въ земскихъ собраніяхъ Харьковскаго и Изюмскаго уѣзовъ, хотя, къ сожалѣнію, эти собранія не пришли къ какимъ-либо опредѣленнымъ заключеніямъ по этому предмету, оставилъ вопросъ, въ виду сложности его и разнорѣчности высказанныхъ мнѣній, открытымъ. Между тѣмъ, опытъ тѣхъ уѣзовъ, въ которыхъ общественные запашки введены, достаточно убѣдительно доказываетъ, насколько онѣ полезны и необходимы. Такъ, въ Купянскомъ уѣздѣ пополненіе мѣрскихъ запасовъ хлѣба въ отчетномъ году произведено крестьянами почти исключительно изъ общественныхъ запашекъ. Изъ 13,992 четв., взнесенныхъ въ запасные магазины, только 1,500 четв. возвращено въ уплату ссудъ, а остальная поступила изъ общественныхъ запашекъ. Въ Зміевскомъ уѣздѣ запасные магазины пополняются также главнымъ образомъ изъ общественныхъ запашекъ. Въ 88-мъ году взыскано здѣсь съ крестьянъ хлѣба, ссуднаго и недоимочнаго, 1,949 четв., а изъ общественныхъ запашекъ поступило 9,679 четвертей. Наибольшее развитіе общественные запашки получили въ Изюмскомъ уѣздѣ, где въ 88-мъ году было посѣяно озимаго хлѣба 2,777 десят. ярового 2,017 дес., всего 4,794 десятины. Сравнительно съ предшество-

вавшимъ годомъ площадь общественныхъ запасовъ увеличилась здесь на 454 десятины.

Продовольственные средства Харьковской губерніи въ 1888 году заключались въ слѣдующемъ.

I. ГУВЕРНСКОГО ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО КАПИТАЛА КЪ 1 ЯНВАРЯ 1889 ГОДА СОСТОЯЛО:

0/0 бумагами	78,929 р. — к.
наличными деньгами	28,124 " 4 ¹ / ₄ "
въ ссудахъ на продовольствие.	564,483 " 93 ¹ / ₄ "
Итого	671,536 " 97 ¹ / ₄ "

II. ОБЩЕСТВЕННЫХЪ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХЪ КАПИТАЛОВЪ КЪ 1 ЯНВАРЯ 1889 ГОДА СОСТОЯЛО:

a) на лицо	393,275 р. 1 ¹ / ₂ к.
б) въ долгахъ и недоимкахъ	16,086 " 47 "
Итого	409,361 " 48 ¹ / ₂ "

III. НАТУРАЛЬНЫХЪ ЗАПАСОВЪ ВЪ ХЛѢБНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ КЪ 1 ЯНВАРЯ 1889 ГОДА СОСТОЯЛО:

a) на лицо:	
озимаго	367,839 ч. 5 ч. 21 ¹ / ₂ г.
яроваго	166,724 " 4 " 4 "
б) состояло въ ссудахъ и недоимкахъ:	
озимаго	420,043 " 2 " 7 ¹ / ₂ "
яроваго	259,682 " 3 " 6 ¹ / ₂ "
Итого: озимаго	787,883 " — " 2 "
яроваго	426,407 " 7 " 2 ¹ / ₂ "

в) Промыслы сельского и городского населения. Въ состояніи промысловъ населения губерніи въ теченіе 1888 года особенно существенныхъ измѣненій не произошло.

Почти повсемѣстный урожай въ южныхъ губерніяхъ Россіи (въ томъ числѣ и въ Харьковской) вызвалъ усиленный отходъ крестьянского населения для уборки хлѣба, а также значительный спросъ на рабочія руки въ предѣлахъ губерній, далеко превысившій существовавшее во время страдной поры предложеніе труда. Явление это выразилось тѣмъ болѣе рѣзко, что созрѣваніе хлѣбовъ запоздало и наступило одновременно: рабочія руки требовались для уборки разнородныхъ хлѣбовъ, масса населения была увлечена высокими цѣнами, предлагавшимися на югѣ, и въ то-же самое время приходилось приготовлять пахоту для посѣва озимой и обмолачивать едва убранный хлѣбъ для сѣянія. Совокупность такихъ явлений, породившая недостатокъ въ рабочихъ и вздорожаніе заработной платы за уборку хлѣба, отразилась самымъ различнымъ образомъ на землевладѣльцахъ и крестьянахъ: тогда какъ первые понесли во многихъ мѣстахъ значительные убытки,

крестьяне, какъ ушедши въ *далъній отходъ*, такъ и оставшиеся въ рабочую пору на мѣстахъ, получили большиe заработки. Для характеристики этого явленія достаточно указать, что въ нѣкоторыхъ пунктахъ губерніи (напр. въ Змievскомъ уѣздѣ) поденная плата рабочему доходила до 3—4 руб. Сроковые и поденные рабочіе, возвратившиеся изъ отхода въ южныя губерніи (Новороссія, Донская и Кубанская области), приносили чистаго заработка отъ 40 до 80 руб. на чело-вѣка. Слѣдуетъ отмѣтить еще одно явленіе, бывшее слѣдствіемъ урожая и спроса на рабочія руки: въ 88-мъ году приобрѣтено весьма большое количество сельско-хозяйственныхъ машинъ, въ особенности же жатвенокъ и косилокъ, и не только землевладѣльцами, но и болѣе зажиточными крестьянами. Чтобы судить о размѣрахъ крестьянского отхода въ 88-мъ году, не лише привести цифры отлучившихся по паспортамъ хотя бы въ двухъ уѣздахъ губерніи: изъ Купянского уѣзда, гдѣ отходъ составляетъ явленіе преобладающее, по паспортамъ въ теченіе года ушло 20,797 человѣкъ, въ Харьковскомъ, гдѣ населеніе, естественно, тяготѣеть къ г. Харькову и дальнимъ отходомъ занимается мало, все-же было выдано въ 1888 году 3,500 паспортовъ.

Истекшій (1888) годъ былъ благопріятенъ для *пчеловодства*, вообще замѣтно падающаго годъ отъ году. Продукты пчеловодства (медъ и воскъ) скучаются мѣстными торговцами и продаются въ Ростовѣ-на-Дону и въ Харьковѣ. Наибольшій доходъ отъ пчелы получилъ въ уѣздахъ Изюмскомъ, Змievскомъ и Купянскомъ. Въ Изюмскомъ уѣздѣ было продано до 20,000 пуд. меду и до 2,000 воску.

Одно изъ земствъ Харьковской губерніи (Старобѣльское) занялось въ теченіе 1888 г. изученіемъ *кустарной промышленности* своего уѣзда. На первый разъ было изслѣдованныхъ 6-ть волостей изъ 48, находящихся въ уѣздѣ. Въ изслѣдованно 6-ти волостяхъ развиты въ значительной степени слѣдующіе промыслы: издѣлія плуговъ, яремъ и осей (по рѣкамъ Айдару и Сѣв. Донцу), гончарные, каменоломные и производство жернововъ, а также шерстяная издѣлія (пояса и половики), сбывааемыя преимущественно въ сосѣднія мѣстности Области Войска Донскаго. Занятія эти, по исчисленію земства, даютъ населенію чистаго дохода до 200,000 р. въ годъ (1888 г.).

г) Промышленность заводская и фабричная. Благопріятные результаты земледѣлія, а частью и скотоводства, продукты которыхъ преимущественно и служать материаломъ для переработки мѣстной фабричной и заводской промышленности, содѣствовали нѣсколько большему развитію послѣдней въ 1888 году. Число фабрикъ и заводовъ возрасло лишь незначительно, увеличившись по губерніи вообще до 690, но сумма ихъ производительности возрасла до 35.573,562 руб., т. е., сравнительно съ предыдущимъ годомъ увеличилась на $3\frac{1}{2}$ мил. Соответственно этому увеличилось и число рабочихъ съ 19,500 до 25,845, или на 32%. Усиленный спросъ на рабочія силы, существовавшій въ 88-мъ году въ сельскомъ хозяйствѣ, могъ лишь незначительно отозваться на обрабатывающей промышленности, наиболѣе важные отрасли которой тре-

буютъ полнаго комплекта рабочихъ не круглый годъ, но лишь съ осени, послѣ уборки хлѣбовъ до зимнихъ или весеннихъ мѣсяцевъ. Такъ, свеклосахарные заводы, требовавшіе въ этомъ году 16,128 (или 62% всѣхъ заводскихъ) рабочихъ, приступаютъ къ работѣ съ конца августа, начала или даже середины сентября и продолжаютъ ее обыкновенно до декабря, января и не далѣе февраля мѣсяцевъ слѣдующаго года. Одинъ вновь устроенный сахарный заводъ началь работу только съ октября. Заводы винокуренные, на которыхъ общее число рабочихъ равнялось 1472, также преимущественно работаютъ въ теченіе зимнихъ мѣсяцевъ, захватывая осень и весну, рѣже іюнь, а тѣмъ болѣе іюль мѣсяцы. Круглый годъ работаетъ лишь одинъ винокуренный заводъ.

Гораздо чувствительнѣе высокихъ цѣнъ на рабочія силы было для заводовъ и фабрикъ губерніи значительное вздорожаніе и даже недостатокъ топлива, особенно каменнаго угля, подвозъ котораго вслѣдствіе многихъ и очень разнообразныхъ причинъ сокращался, а временами и совершенно простоянливался. Между тѣмъ именно крупнѣйшия отрасли мѣстной заводской промышленности, каковы сахарованіе, винокуреніе, солевареніе нуждаются въ громадномъ количествѣ топлива и недостатокъ въ немъ можетъ остановить самое производство, чemu и бывали примѣры въ 88-мъ году, особенно зимою, когда происходилъ дѣятельнѣйшая работа на большинствѣ фабрикъ и заводовъ. Приблизительное понятіе о количествѣ топлива, потребляемаго ими, могутъ дать слѣдующія свѣдѣнія за 1888 г. Свеклосахарными заводами было употреблено за годъ дровъ разнаго сорта 17,993 куб. саж., торфа 6,664 куб. саж., каменнаго угля 7,128,110 пудовъ; винокуренными и водочными заводами—дровъ 36,020 куб. саж., торфа 1,414 куб. саж., соломы 10,560 возовъ и угля 695,343 пуд.; солеваренными—угля 1.293,000 пуд.; шерстомойнями угля 191,800 пуд.

Не смотря однако на чувствовавшіяся временами недостатокъ въ топливѣ, производительность заводовъ и фабрикъ, или по крайней мѣрѣ большинства ихъ расширилась. Таковы сахароваренные-песочные заводы, число которыхъ съ предшествующаго года возрасло до 23, а сумма производительности достигла 13,073,175 р. (на 1.521,709 р. болѣе предшествующаго года) и рафинадные—3 завода съ производительностью въ 9,556,924 р. (на 1.293,714 р. болѣе). Въ теченіе года этими заводами было выработано 3.406,405 п. и 28½ ф. сахарнаго песку и 14,426 п. 36 ф. рафинада. Существуя въ Харьковской губерніи съ первой половины текущаго столѣтія, свеклосахарное производство достигло здѣсь значенія едва-ли не важнѣйшей отрасли заводской промышленности. Основаніе нѣкоторыхъ существующихъ сахарныхъ заводовъ восходитъ къ пятидесятыхъ годаамъ, одинъ основанъ въ 1846 г., равнымъ образомъ по одному-же—въ 39, 35 и 34 годахъ. Всѣ свеклосахарные заводы губерніи помѣщаются въ каменныхъ зданіяхъ, крытыхъ желѣзомъ, и въ пожарномъ отношеніи представляются слѣдовательно болѣе или менѣе безопасными; въ нѣкоторыхъ имѣются при этомъ пожарные обозы. Въ большинствѣ сахароваренныхъ заводовъ сдѣ-

лано многое и для ограждения здоровья рабочих; всюду устроены больницы, иногда довольно поместительные (до 40 кроватей), с запасомъ бѣлья, медикаментовъ и съ постояннымъ фельдшеромъ. Врачи, если не имѣются при самыхъ больницахъ, то наѣзжаютъ одинъ—два раза въ недѣлю, а въ случаѣ надобности и чаще. Рабочие не во всѣхъ заводахъ помѣщаются въ заводскихъ казармахъ; часть обыкновенно приходитъ на работу изъ ближайшихъ селеній, гдѣ имѣютъ свои квартиры или, если они мѣстные жители (какъ въ Пархомовскомъ заводѣ, Богословского у.)—свои дома. Размѣръ заработной платы весьма разнообразенъ: въ рафинадномъ заводѣ Сумскаго уѣзда, гдѣ промышленность наиболѣе развита и цѣны на рабочія силы вообще выше другихъ мѣстъ губерніи, рабочимъ платится 13 р. 25 к. въ мѣсяцѣ; въ Изюмскомъ уѣздѣ—8 р., а въ Купянскомъ—отъ 7 до 10 р. на заводскомъ продовольствіи. Еще разнообразиѣ заработная плата на песочныхъ заводахъ, гдѣ она колеблется между 7 и 15 рублями. Малолѣтніе (ниже 15 лѣтъ) на сахароваренныхъ заводахъ почти не нанимаются, но тамъ, гдѣ работаютъ подростки, устроены и школы, какъ это имѣетъ мѣсто на рафинадномъ заводѣ при с. Лукѣ, гдѣ 60 мальчиковъ—подростковъ посѣщають устроенную для нихъ воскресную школу грамотности. Уровень техническаго образованія администраціи свеклосахарныхъ заводовъ очень различенъ: на ряду съ получившими домашнее образование встрѣчаются управляющіе заводами съ образованіемъ среднихъ учебныхъ заведеній и высшимъ техническимъ.

Винокуренныхъ заводовъ дѣйствовало въ 88-мъ году 44, въ томъ числѣ одинъ вновь устроенный; сумма ихъ производительности равнялась 2.110.157 р., а производительность 7 водочныхъ заводовъ достигла 700.725 р.

Число паровыхъ мукомольныхъ мельницъ увеличилось на 4 (24), но сумма ихъ производительности нѣсколько сократилась: съ 853,980 на 825,410 р.; уменьшилось въ нихъ и число рабочихъ до 286. При большемъ также числѣ крупорушекъ (8), производительность ихъ стала меньше, сократившись съ 37,160 р. до 28,450 р., или почти на 25%.

Табачныхъ фабрикъ осталось прежнее число—13, но производительность ихъ уменьшилась до 1.131.280 р., т. е. сократилась на 160.221 р.

Междуд заводами, занятymi переработкой продуктовъ, доставляемыхъ скотоводствомъ, первое мѣсто по суммѣ производительности занимаетъ шерстомойное производство. Въ 88-мъ году въ г. Харьковѣ было 4 шерстомойни, изготавлившія 39,000 пудовъ испанской шерсти и 150 тысячъ пудовъ русской,—всего на сумму 1.008,090 р.; въ Харьковскомъ уѣздѣ 1 шерстомойня вымыла 70,000 пудовъ шерсти на 200,000 рублей. Кроме того, получилось изъ моечныхъ отбросовъ 3,000 пуд. сала на 3,000 р. и 4,000 пуд. поташу на 5,000 р. Въ шерстомойняхъ довольно видное мѣсто занимаетъ женскій трудъ. Изъ числа 1,000 работницъ въ 88-мъ году—737 были женщины. Работа оплачивалась поденно, при чёмъ мужчины получали отъ 45 до 70 коп., а женщины—отъ 25 до 50 коп. Хотя шерстомойни и находятся въ городѣ, или вблизи его (при селѣ Григоровѣ), тѣмъ не менѣе въ большин-

ствъ ихъ устроены лѣчебницы съ годовымъ врачемъ. Въ санитарномъ отношеніи состояніе самыхъ моечныхъ заведеній можетъ быть признано удовлетворительнымъ, хотя, къ сожалѣнію, нельзя того же сказать о ближайшихъ окрестностяхъ нѣкоторыхъ моеекъ, гдѣ вслѣдствіе недостаточного совершенства въ устройствѣ приспособленій для обезвреживанія остатковъ производства, воздухъ заражается отъ разложенія послѣднихъ.

Сравнительно съ предыдущимъ годомъ нѣсколько увеличилась производительность, но сократилось число кожевенныхъ заводовъ, которыхъ было 70 (на 14 менѣе предыдущаго года) съ производительностью въ 117,812 р. (на 23,220 р. болѣе). Увеличеніе числа мыловаренныхъ заводовъ до 10 расширило и производительность ихъ до 189,310 р. (на 8,691 р.). Значительно возрасло число маслобойныхъ заводовъ (съ 77 на 85), изготавлившихъ въ 88-мъ году масла на 24,191 р. (на 9,814 руб. болѣе). Напротивъ, салотопенные заводы сократились и въ числѣ (съ 34 на 33) и по суммѣ производительности. (съ 143,120 на 81,075 руб.).

Положеніе солеваренія почти не измѣнилось въ 88-мъ году. Производительность солеваренъ возрасла незначительно, достигнувъ 357,610 р. Въ теченіе года было всего выварено соли (не считая остатка отъ прошлаго года): сырой 1.623,200 пуд. и сушеної 690,000 пуд.; продано и вывезено: сырой 1.665,000 пуд., сушеної 1.031,400 пуд. Къ 1 января 1888 года оставалось невывезенной соли: сырой 690,000 пуд., сушеної—630,000 пуд., и къ 1 января 1889 года осталось: сырой 648,200 пуд. и сушеної 428,000 пудовъ.

д) Торговля. Условія, отъ которыхъ зависитъ успѣхъ или неуспѣхъ торговли, сложились въ 1888-мъ году неблагопріятно для сбыта продуктовъ, отправляемыхъ за границу и, наоборотъ, вполнѣ благопріятствовали мѣстной и вообще внутренней торговлѣ. Сбытъ заграницу затруднялся возвышениемъ курса кредитнаго рубля, благодаря чѣму такими товарами, какъ хлѣбъ и частью шерсть, торговали вил. Въ торговлѣ хлѣбомъ не мало причинили убытку и недостатки въ приспособленіяхъ для храненія его на станціяхъ желѣзныхъ дорогъ, гдѣ, вслѣдствіе урожая двухъ послѣднихъ годовъ и недостаточной провозоспособности дорогъ, онъ скапливался большими массами, не могъ быть доставленъ на мѣсто къ опредѣленному сроку, портился и, слѣдовательно, терялъ еще болѣе въ своей, и безъ того низкой, цѣнѣ.

Торговля шерстью и особенно сбытъ ея за границушли вообще неудовлетворительно. За исключеніемъ первой въ году Крещенской ярмарки въ Харьковѣ, прошедшей по отношенію къ этому товару довольно хорошо вслѣдствіе крайне ограниченаго предложенія (всего 22,800 пуд.), на всѣхъ прочихъ ярмаркахъ именно шерстью торговали хуже, чѣмъ можно было ожидать. Такъ, на Троицкой ярмаркѣ, шерстяной по преимуществу, не смотря на очень небольшой остатокъ шерсти (2,500 пуд.) отъ предыдущей ярмарки и повсемѣстные виды на блестящій урожай, этотъ товаръ, достигнувъ сначала довольно высокой цѣны (11—11 р. 50 к.), затѣмъ подешевѣлъ на 5% и болѣе, при

чемъ покупателями, какъ и на Крещенской ярмаркѣ, явились только русские изъ Москвы, Клинцовъ, Бѣлостока, агенты же заграничныхъ фирмъ покупокъ не сдѣлали вовсе. Но особенно сильно отразились неблагопріятныя для торговли шерстью условия 88-го года на двухъ другихъ ярмаркахъ г. Харькова—Успенской и Покровской. Повышение курса рубля, уменьшивъ сбытъ шерсти за границу, въ то-же время успѣло открыть болѣе легкій доступъ наплыву заграничной шерсти на фабрики нашего западнаго края, а въ сентябрѣ Австралійская шерсть появилась даже въ Москвѣ. Соответственно этому цѣны шерсти упали—на Успенской ярмаркѣ на 20%, а на Покровской еще нѣсколько ниже, такъ что спекулянты, закупившіе на Троицу партии шерсти на надеждѣ продать ее съ барышомъ, потерпѣли убытокъ. Покупатели и на этотъ разъ были только изъ Москвы, Клинцовъ и Бѣлостока. Всего шерсти за годъ продано 350,250 пуд., менѣе предшествующаго года почти на 58 т. п.

По отношенію къ прочимъ товарамъ, сбыть коихъ главнымъ образомъ ограничивается югомъ Россіи, для котораго Харьковъ съ своими пятью ярмарками служитъ главнымъ торговымъ центромъ,—88-й годъ былъ въ общемъ благопріятенъ. Снежная зима, хороший санный путь, повсемѣстный урожай на югѣ, въ связи съ урожаемъ предыдущаго года, высокая заработка плата, поднявшая благосостояніе народныхъ массъ—всѣ эти условія содѣйствовали оживленію прежде всего ярмарочной торговли г. Харькова, давшей за годъ слѣдующіе результаты:

Овчинами торговали вообще хорошо, за исключеніемъ Покровской ярмарки. На Крещенской ярмаркѣ проданъ весь товаръ—240,000 шт. на 480 т. р. при цѣнахъ на 15% вышихъ противъ прошлогодней Покровской ярмарки. На Троицкой—изъ 36,000 шт. привезенной овчины продано 33,000 шт., также по цѣнѣ, превышавшей на 20% прошлогоднюю. На Успенской—продана вся овчина, хотя уже по болѣе низкимъ цѣнамъ—всего на 45,500 р. На Покровской ярмаркѣ цѣны стояли еще ниже, по овчины продано 132,000 шт. на 238,000 р. Покупателями были: Московскіе и Тульскіе сафьянники, отчасти Серпуховскіе и Клинцовскіе фабриканты, а также польскіе фабриканты. Сырыя кожи на Крещенской ярмаркѣ шли хорошо, особенно средніе сорта: бычьихъ и коровьихъ продано изъ 54,800 штукъ,—52,200 на сумму 482 т. р.; прочіе сорта (20,300 шт.)—проданы всѣ безъ остатка. На Покровской ярмаркѣ торговля кожами шла тоже вполнѣ удовлетворительно и только подъ конецъ цѣны на крупныхъ кожахъ упали отъ 50 до 75 коп. Привезено было на 216,400 р., продано-же на 193,100 р. покупателямъ изъ Москвы, Кимръ, Курска, Болхова, Кременчуга, Вятки, Ельца и Царства Польскаго.—Прасольскимъ товаромъ торговали удовлетворительно на Крещенской ярмаркѣ, на которой было продано этого товара на 618 т. р. и хорошо—на Покровской (привезено на 18,200 р., продано на 13,200, но по высшей цѣнѣ). Покупатели были изъ Бѣлостока, Москвы, Чернигова и изъ-за границы.—Очень хорошо шло дѣло съ чернѣмъ товаромъ на Крещенской ярмаркѣ, на которой онъ проданъ безъ остатка на 466,600 р., а на По-

кровскую было привезено на 125,200 р., продано-же на 96,500, т. е. около 75%, но зато вообще по высшимъ цѣнамъ. Покупателями были мѣстные жители и изъ южныхъ губерній.—Сало продано все и притомъ по хорошимъ цѣнамъ, особенно на Крещенской ярмаркѣ (на 70 т. р.), на Успенской (на 88 т. р.) и на Покровской (на 201,500 р.), на Троицкой-же—несколько дешевле (на 52,800 р.). Этотъ товаръ сбываются главнымъ образомъ мѣстнымъ потребителямъ, но также и, въ Москву и Польшу. Проданное на ярмаркахъ въ теченіе года мыло—было исключительно мѣстного производства, но потребителями его, кромѣ мѣстныхъ жителей, являются также южныя губерніи. На двухъ ярмаркахъ, Крещенской и Троицкой—продано было мыла на 122,000 рублей.—Продажа сахара-рафинада на Харьковскихъ ярмаркахъ, по замѣчанію мѣстныхъ сахарозаводчиковъ, значительно слабѣтъ, что объясняется открытиемъ новыхъ заводовъ въ Екатеринославской губерніи и Одесскѣ, которые конкурируютъ съ Харьковскими на югѣ. На трехъ ярмаркахъ—Крещенской, Троицкой и Успенской, продано всего на 565 т. р. сахара. Для торговли спиртомъ Харьковскія ярмарки не имѣютъ значенія и продажа его въ неярмарочные мѣсяцы бываетъ иногда значительне, чѣмъ во время ярмарокъ. Кромѣ мѣстныхъ покупателей, были также требованія съ сѣвера и изъ-за границы при чемъ спиртомъ торговали вообще лучше прошлаго года.—Торговля посудой и стекломъ производится въ большихъ размѣрахъ только на Крещенской ярмаркѣ. Въ 88-мъ году было привезено посуды всего на 275 т. р., продано-же только на 116 т., т. е. около трети—Болѣе усиленно, сравнительно съ предыдущимъ годомъ, торговали бакалейнымъ товаромъ, причемъ выручка превысила прошлогоднюю приблизительно на 10%, хотя платежи поступали не особенно исправно и многие должники не оправдали своихъ сроковъ. Продано товару на 487 т. р.

Таковы товары, играющіе наиболѣе видную роль на харьковскихъ ярмаркахъ и составляющіе всецѣло, или частью продукты мѣстного производства. Но кромѣ перечисленныхъ, на тѣхъ-же ярмаркахъ фигурируетъ еще цѣлый рядъ товаровъ исключительно привозныхъ, для которыхъ Харьковъ съ губерніей служитъ раionомъ сбыта, а харьковскія ярмарки—посредницами для распространенія ихъ на югѣ Россіи,—таковы:

Мануфактурными товарами, привозимыми на четыре главныхъ ярмарки въ болѣе или менѣе значительномъ количествѣ, торговали вообще хорошо. На Крещенской ярмаркѣ было всего мануфактурныхъ издѣлій на 11 мил. р., изъ которыхъ около 5 мил. оставалось къ началу ярмарки и около 6 мил. привезено вновь; продано-же на 6,500 тысячъ руб., т. е., сбыть превысила Покровскую ярмарку предыдущаго года на $2\frac{1}{2}$ мил., при этомъ и платежи были въ общемъ лучше, чѣмъ въ прошлогоднюю Крещенскую ярмарку, за исключеніемъ Таврической губерніи, которая, переживъ только что неурожайный годъ, платила лишь 25—50% старого долга. Зато на Успенской ярмаркѣ та-же губернія, покупающая всегда на харьковскихъ ярмаркахъ много ману-

фактурныхъ издѣлій, послѣ превосходнаго урожая 88-го года значительно способствовала оживленію торговли. Продано изъ бывшаго товара (на 12.200 т. р.)—болѣе двухъ третей, т. е. на 8.200 т. р. Незначителенъ былъ оборотъ для мануфактурныхъ издѣлій Троицкой ярмарки (1.900 т. р.). Хуже чѣмъ на Успенской, но все-же удовлетворительно, торговали мануфактурные склады на Покровской ярмаркѣ, благодаря тому, что покупатели избѣгали дѣлать запасы, разсчитывая на понижение цѣнъ вслѣдствіе ожидавшагося удешевленія хлопка.— Металловъ и металлическихъ издѣлій продано на 4 ярмаркахъ на 2.076 т. р. покупателямъ изъ Харьковской, Полтавской, Екатеринославской, Таврической, Херсонской и Курской губерній.—Мѣха шли болѣе или менѣе хорошо. На Крещенской ярмаркѣ продано ихъ на 150 т. р., а на Покровской, особенно важной для этого рода товара, на 250 т. р. Кроме того продано на харьковскихъ ярмаркахъ: выдѣланныхъ кожъ изъ Курска, Москвы, Вятки, Болхова, Ельца, Липецка на 814 т. р. (привезено было на 945 т.); винъ—на 410 т. р., изъ которыхъ заграничныхъ всего на 60 т.; обуви привозной изъ Москвы, Кимры, Бѣлгорода и Курска—на 108 т. (привезено на 120 т.); галоши резиновыхъ изъ Петербурга—на 150 т. р. (привезено на 175 т. р.).

Такова ярмарочная торговля Харькова. По своимъ размѣрамъ и значенію она далеко переходитъ за предѣлы губерніи, служить средствомъ сбыта на югъ продуктовъ промышленной дѣятельности сѣвера Россіи и обратно. Несомнѣнно, благопріятная по своимъ результатамъ въ отчетномъ году, она указываетъ на улучшенное экономическое состояніе всѣхъ вообще южныхъ губерній и можетъ служить только отчасти доказательствомъ поднятія благосостоянія мѣстнаго края. Послѣднее гораздо замѣтнѣе отразилось на нѣкоторыхъ видахъ чисто мѣстной торговли, какова напр. торговля питейная, расширение которой прежде всего доказывается значительнымъ увеличеніемъ въ 88-мъ году количества потребленныхъ градусовъ спирта. То-же подтверждается сравненіе числа питейныхъ заведеній за 1888 годъ и предыдущій:

1887 г. 1888 г.

Оптовыхъ складовъ вина и спирта	104	99
" " пива и меду	15	10
Ведерныхъ лавокъ	18	23
Ренсовыхъ погребовъ русскихъ и иностранныхъ винъ	635	615
Погребовъ русскихъ виноградныхъ винъ	32	21
Трактирныхъ заведеній и постоянныхъ дворовъ	958	931
Пивныхъ лавокъ	150	116
Винныхъ лавокъ	1191	1244
Буфетовъ	67	71
Временныхъ выставокъ	147	146

Отсюда видно, что въ 1888-мъ году увеличилось особенно замѣтно число винныхъ лавокъ, а, напротивъ, уменьшилось число ренсовыхъ погребовъ, погребовъ русскихъ винъ и пивныхъ лавокъ. Значитъ, расширилась главнымъ образомъ торговля виномъ, потребляемымъ преиму-

щественно крестьянскимъ населенiemъ, что вполнѣ объясняется хорошими заработкаами его въ этомъ году. Изъ той-же таблицы оказывается, что за годъ сократилось число: 1) оптовыхъ складовъ вина и спирта и 2) складовъ пива и вина. Если послѣднее легко объяснимо уменьшениемъ числа пивныхъ заводовъ и, слѣдовательно, не даетъ мѣста предположеніямъ о какихъ-либо перемѣнахъ въ характерѣ торговли этими напитками, то уменьшеніе складовъ вина, при усилившемся за годъ винокуреніи и увеличеніи потребленія его,—служить, повидимому, указаніемъ на нѣкоторую наклонность къ монополизаціи торговли виномъ, находящейся почти всецѣло въ рукахъ мѣстныхъ евреевъ. Что касается другихъ видовъ мѣстной торговли, кромѣ питейной, то понятіе о ихъ состояніи могутъ дать слѣдующія свѣдѣнія о числѣ выбранныхъ торговыхъ документовъ сравнительно съ двумя предшествующими годами—неурожайнымъ 1886 и урожайнымъ 1887.

В М Б Р А Н О.	1886 г.	1887 г.	1888 г.
Свидѣтельствъ 1-й и 2-й гильдій . . .	2,425	2,348	2,335
Свидѣтельствъ на мелочный, развозный и разносный торгъ, прикасчильни и промысловыхъ	11,491	14,266	12,018

Отсюда, повидимому, можно сдѣлать тотъ выводъ, что торговля крупная клонится къ упадку, независимо отъ урожайности года, между тѣмъ какъ мелочная — значительно улучшилась за 88-й и особенно прошлый годъ сравнительно съ 1886. Въ частности торговля табачными издѣліями нѣсколько сократилась; число выбранныхъ патентовъ, достигшее въ предыдущемъ году 6159, уменьшилось до 6095.

Наконецъ, въ торговлѣ, удовлетворяющей непосредственно потребности деревни, важную роль играютъ ярмарки сель и частью уѣздныхъ и заштатныхъ городовъ, на которыхъ окружное населеніе сбываетъ свои сельско-хозяйственные продукты, а также предметы кустарного производства, где таковое развито, и въ свою очередь приобрѣтаетъ все необходимое для домашнаго обихода: одежду, обувь, мануфактурные товары и т. д. Обороты всѣхъ такихъ ярмарокъ туберніи не поддаются исчисленію, но при ихъ множествѣ (784), достигаютъ, безъ сомнѣнія, нѣсколькихъ миллионовъ рублей.

Изъ-за границы привезено въ 88-мъ году, по свѣдѣніямъ Харьковской таможни, на 2.075,692 р. товаровъ; въ томъ числѣ:

изъ Германіи	964,923 р.
" Великобританіи	572,539 "
" Франціи	122,266 "
" Италіи	88,480 "

изъ Соединенныхъ Штатовъ	45,236	р.
" Китая	36,827	"
" прочихъ государствъ	50,964	"

Кромѣ того, въ Харьковскую таможню привезено товаровъ, досмотрѣнныхъ въ другихъ таможняхъ, на 71,542 р., да оставалось на складѣ къ 1888 году на сумму 148,579 р.—всего на 1,295,813 р. Изъ этого количества выпущено на внутреннее потребленіе на сумму 2,111,382 р., т. е. болѣе предыдущаго года на 355,341 р.

Е) **Движеніе населенія.** Улучшенное сравнительно съ предшествующими годами экономическое состояніе отразилось не только на торговлѣ, но и на движеніи мѣстного населенія. Особенно подтверждается это данными общей за 88-й годъ брачности, служащей вѣрнымъ показателемъ трудности борьбы за существованіе. Въ тяжелые годы она всегда уменьшалась въ Харьковской губ. и обратно, какъ показываетъ слѣдующая таблица:

Въ какомъ году.	Цѣны на хлѣбъ.	Урожай.	Цѣны на рабочія силы.	Число браковъ.	Общая брачность
1883	высокія	средній	среднія	22,190	1%
1884	понизились	выше средн.	выше средн.	20,588	0,9%
1885	еще понизил.	плохой	среднія	18,105	0,8%
1886	низкія	плохой	среднія	18,482	0,8%
1887	понизились	хорошій	выше средн.	22,171	0,9%
1888	понизились	выше средн.	высокія	25,171	1%

Такимъ образомъ, со времени застоя въ нашей торговлѣ хлѣбомъ и ухудшенія въ положеніи производителей его, общая брачность еще ни разу не достигла такого высокаго процента, какъ въ 88-мъ году. Всего ниже за послѣднія 6 лѣтъ была она въ 1885 и 1886 гг., когда при низкихъ цѣнахъ на хлѣбъ и на рабочія силы урожай далъ дурные результаты; первое паденіе этихъ цѣнъ заставило ее понизиться сразу на 0,1% въ 1884 году, не смотря на удовлетворительный урожай и заработную плату, стоявшую выше обыкновенного уровня; настолько-же поднялась она потомъ въ 1887 г., благодаря хорошему урожаю и довольно высокой заработной платѣ. Наконецъ въ 88-мъ году исключительно высокая заработка плата улучшила настолько благосостояніе народа, что дала ему возможность заключать большее число браковъ и тѣмъ подняла общую брачность до 1%.

Но высокая заработка плата, урожай и цѣны на хлѣбъ должны были вліять преимущественно на положеніе сельскаго населенія, не касаясь, или мало касаясь, городскаго. Подтверждаютъ ли однако статистическія данные соответственное увеличеніе или уменьшеніе общей брачности именно среди жителей уѣздовъ? Вполнѣ подтверждаютъ, какъ это можно видѣть изъ нижеслѣдующей таблицы:

Въ какомъ году.	Число браковъ въ городахъ.	Общая брачность въ городахъ.	Противъ предыдущаго года болѣе или менѣе.	Число браковъ въ уѣздахъ.	Общая брачность въ уѣздахъ.	Противъ предыдущаго го-да.
1883	2,589	0,79%		19,601	1,07%	
1884	2,444	0,73%	-0,06%	18,144	0,97%	-0,1%
1885	2,447	0,72%	-0,01%	16,658	0,88%	-0,09%
1886	2,395	0,69%	-0,03%	16,087	0,88%	
1887	2,398	0,67%	-0,02%	19,773	1%	+0,12%
1888	2,569	0,69%	+0,02%	22,151	1,1%	+0,1%

Оказывается такимъ образомъ, что общая брачность въ городахъ за послѣднія шесть лѣтъ испытала лишь незначительныя измѣненія, при чёмъ измѣненіе въ 1887 году не соответствуетъ хорошему урожаю этого года, а 1888 годъ нисколько не отличается отъ 1886; въ уѣздахъ, напротивъ, различіе этихъ, столь неодинаковыхъ по урожайности и высотѣ заработной платы, годовъ отразилось на общей брачности очень замѣтно.

Другія статистическія данныя, относящіяся къ движению населенія, отнюдь не опровергаютъ этого вывода. Цифры рождаемости вполнѣ соответствуютъ выше приведеннымъ цифрамъ общей брачности, съ тою только особенностью, что неблагопріятныя или, напротивъ, благопріятныя условія извѣстнаго года оказывали свое влияніе на количество рожденій не въ тотъ же годъ, а ближайшій, за нимъ слѣдуюшій. По п'ятой губерніи общая рождаемость за послѣднія пять лѣтъ представится въ такомъ видѣ:

Въ какомъ году. Общая рождаемость.

1884	5,1%
1885	5,1%
1886	4,6%
1887	4,6%
1888	5,2%

Здѣсь наибольшее пониженіе процента рождаемости падаетъ на 1886 и 1887 года, слѣдовавшіе за тяжелыми 1885 и 1886 годами. Но даныя общей рождаемости, вычисленныя отдельно для городовъ и уѣздовъ, притомъ съ точностью сотыхъ, еще яснѣе отражаютъ всѣ оттѣнки въ экономическомъ состояніи сельскаго населенія губерніи:

Въ какомъ году.	Общая рождаемость.	
	въ городахъ.	въ уѣздахъ.
1884	3,77%	5,34%
1885	3,71%	5,25%
1886	3,70%	4,78%
1887	3,63%	4,78%
1888	3,66%	5,50%

Итакъ, плодовитость въ городахъ Харьковской губерніи, повидимому, почти не измѣнялась въ послѣднія пять лѣтъ и представляла цифру довольно постоянную съ небольшими колебаніями въ сотыхъ доляхъ, тогда какъ плодовитость въ уѣздахъ представляетъ крупныя колебанія, въ полномъ соотвѣтствіи съ высотой урожая и другими экономическими фактами, вліающими на благосостояніе сельскаго жителя.

Что касается смертности населенія, то, находясь частью въ зависимости отъ распространенія и степени напряженія эпидемій, она не всегда можетъ служить указаниемъ измѣненій къ лучшему или худшему, произошедшихъ въ экономическомъ состояніи губерніи за тотъ или другой годъ. Поэтому въ статистическихъ данныхъ о смертности въ пятилѣтии 1884—1888 годовъ нельзя констатировать столь-же полного соотвѣтствія между этимъ явленіемъ и степенью благосостоянія сельскаго населенія, хотя въ общемъ соотвѣтствіе не нарушается, особенно городовъ, въ которыхъ заразныя болѣзни, при несравненно лучшей организаціи медицинской помощи, производятъ меныше опустошеній:

Въ какомъ году.	С м е р т н о с т ь .		
	Въ губерніи.	Въ городахъ.	Въ уѣздахъ.
1884	2,8%/ ^o	2,34%/ ^o	2,91%/ ^o
1885	3,3%/ ^o	2,74%/ ^o	3,32%/ ^o
1886	3,4%/ ^o	2,86%/ ^o	3,46%/ ^o
1887	3,7%/ ^o	2,60%/ ^o	3,85%/ ^o
1888	3,2%/ ^o	2,46%/ ^o	3,39%/ ^o

Естественный приростъ населенія, преимущественно въ уѣздахъ, былъ въ 88-мъ году несравненно больше предшествующихъ лѣтъ и, приближался къ приросту 1884 года, рѣзко отличается отъ прироста 1887 года, когда распространеніе въ нѣкоторыхъ уѣздахъ эпидемій увеличило коэффиціентъ смертности, а рождаемость, послѣ многихъ, пережитыхъ населеніемъ тяжелыхъ годовъ, не могла еще подняться:

Въ какомъ году.	Естественный приростъ.		
	Въ губерніи.	Въ городахъ.	Въ уѣздахъ.
1884	2,3%/ ^o	1,43%/ ^o	2,43%/ ^o
1885	1,8%/ ^o	0,97%/ ^o	1,93%/ ^o
1886	1,2%/ ^o	0,84%/ ^o	1,32%/ ^o
1887	0,9%/ ^o	1,03%/ ^o	0,93%/ ^o
1888	2%/ ^o	1,20%/ ^o	2,11%/ ^o

Вообще естественный приростъ, находясь въ прямой зависимости отъ рождаемости, такъ-же какъ и эта послѣдняя, увеличивается или уменьшается въ каждомъ году соотвѣтственно экономическому состоянію населенія за предшествующій годъ, что подтверждается и выше-приведенная таблица.

Дѣйствительный приростъ населенія Харьковской губерніи не можетъ быть вычисленъ вполнѣ точно за неимѣніемъ данныхъ объ иммиграціи и эмиграціи населенія; по свѣдѣніямъ полиціи, общее число жителей губерніи достигло въ 1888-мъ году 2,366,587.

ОЧЕРКИ РАСТИТЕЛЬНОСТИ

ХАРЬКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ И СОСЕДНИХЪ СЪ НЕЮ МѢСТНОСТЕЙ.

Л. О. Павловича.

(Продолжение *)

Семейство 6-е Крестоцвѣтныя, Cruciferae.

Всѣ наши крестоцвѣтныя—растенія травянистыя, съ очередными листьями цѣльными, надрѣзанными или сложными, безъ прилистниковъ. Какъ стебли, такъ и листья ихъ б. ч. бывають покрыты звѣздчатыми волосками, рѣдко—голые. Цвѣтки небольшіе, б. ч. желтые или бѣлые, рѣже—лиловые. По строенію цвѣтка к. такъ сходны между собою, что ихъ съ первого взгляда легко отличить отъ растеній другихъ семействъ; за то опредѣленіе нѣкоторыхъ родовъ и видовъ бываетъ весьма затруднительно. Цвѣтокъ состоять изъ 4 чашелистиковъ, 4 лепестковъ, расположенныхъ на кресть (откуда и название семейства), 6 тычинокъ и одного пестика съ короткимъ столбикомъ и рыльцемъ. Лепестки состоять изъ верхней разширенной части—*отгиба* и нижней суженной—*нонотка*. Соцвѣтие грозовидное, безъ *прицвѣтникovъ*; но въ началѣ цвѣтенія цвѣтки б. ч. скученные образуютъ щитокъ, который по мѣрѣ созрѣванія плодовъ удлиняется въ гроздь. Плоды, различные по формѣ, представляются въ видѣ стручковъ, стручечковъ, орѣшковъ и членистыхъ стручковъ, доставляютъ наглядные признаки для распредѣленія растеній этого семейства на группы (см. ниже). Сѣмена малыя, круглые или овальные не имѣютъ бѣлка и содержать только зародышъ съ искривленнымъ корешкомъ и двумя сѣмядолями.

Какъ въ строеніи органовъ, такъ и въ свойствахъ своихъ крестоцвѣтныя растенія, представляютъ много сходства: всѣ они снабжены острыми, летучими началами, находящимися во всѣхъ частяхъ растенія. Вещества эти придаютъ имъ острый, но пріятный вкусъ, дѣлающей ихъ пригодными для употребленія въ пищу людямъ и домашнимъ жи-

*) См. Харьковскій Сборникъ вып. 3-й. 1889 г.

вотнымъ. Оттого некоторые виды крестоцвѣтныхъ, съ древнѣйшихъ временъ воздѣлываемые въ огородахъ и на поляхъ, подъ влияниемъ продолжительной культуры образовали много разновидностей и до сихъ поръ доставляютъ неоцѣнимый пищевой материалъ въ видѣ огородной капусты, рѣпы, брюквы и т. п. Всѣ к. въ сѣменахъ своихъ содержатъ жирное масло. Поэтому некоторые изъ нихъ, рапсъ, сурѣпица, кольза и др. воздѣлываются на поляхъ, какъ маслянистыхъ растенія, но масло ихъ, по присутствію въ немъ горькихъ веществъ, не годится въ пищу людямъ, а употребляется для освѣщенія или для техническихъ производствъ. Многіе виды к. у древнихъ народовъ употреблялись какъ цѣлебныя средства противъ различныхъ болѣзней; новѣйшая медицина мало пользуется ими, но какъ народная врачебная средства они сохраняютъ свое значение, и оказываются особенно полезными противъ цинготной болѣзни. Наконецъ, немногіе виды этого семейства, отличающіеся разнообразiemъ оттѣнковъ и запахомъ цвѣтковъ, разводятся, какъ любимыя садовыя растенія, неприхотливыя относительно климата и ухода.

Обширное семейство крестоцвѣтныхъ, содержащее до 1200 видовъ и распространенное преимущественно въ сѣверномъ и умеренномъ поясѣ нашего полушарія, имѣетъ и въ нашей флорѣ до 80 представителей. Большинство изъ нихъ однокожъ встречаются у насъ рѣдко, иные—весьма рѣдко и только немногіе принадлежать къ обыкновеннымъ. Въ сѣмействѣ видѣ на лугахъ и пастбищахъ к. доставляютъ для дом. животныхъ здоровый и вкусный, но скудный кормъ, не многихъ только, по причинѣ непріятнаго ихъ запаха, дом. животныхъ не трогаютъ, но ядовитыхъ между ними нѣть. Распознаніе некоторыхъ родовъ и видовъ, какъ мы выше упомянули, довольно затруднительно тѣмъ болѣе, что и авторы въ описаніи ихъ часто несогласны и относятъ ихъ то къ одному, то къ другому роду или виду. Поэтому и при опредѣленіи нужно обращать особенное вниманіе на форму плодовъ, на нервы на ихъ створкахъ и расположение въ нихъ сѣмянъ, а при собираніи для гербарія брать только такие экземпляры, въ которыхъ находятся уже зрѣлые плоды.—Мы раздѣлимъ все семейство по формѣ плодовъ на 4 группы и перечислимъ только главнѣйшіе роды и виды, чаще встречающіеся въ предѣлахъ нашей губерніи.

А. Стручковыя. Плодъ *стручекъ* удлиненный, двугнѣздный развѣзающійся двумя створками, сѣмена прикреплены къ обоимъ краямъ остающейся продольной перегородкой.

Гулявникъ, *Sisymbrium*, L. Растенія отъ 1 до 2 фут. высоты. Стручки *цилиндрические* съ 3-мя замѣтными нервами на створкахъ, сѣмена въ 1 рядѣ. Цвѣтки у иныхъ видовъ желтые. **Г. баҳромистый,** *S. Sophia* L. однолѣтній, темно-зеленый, растетъ около жильевъ; отличается отъ другихъ видовъ этого рода листьями тройко-перисто-разсѣченными на мелкія линейныя долики; цвѣтки малы; стручки узкіе голые. Листья употреблялись древними для быстраго заживленія ранъ, оттого и назвали это растеніе *Sophia chirurgicorum* (мудрость

хирурговъ).—*G. лекарственный*, *S. officinale* L., называемый въ народѣ „Сухорѣбромъ“, растетъ тоже около жильевъ, по улицамъ и около заборовъ. Шершавый отъ прижатыхъ волосковъ, съ распростертными вѣтками, листья перисто-раздѣльные съ большою оконченою лопастью; стручки шиловидно-заостренные, косматые и плотно прижатые къ вѣткамъ. Однолѣтній, цвететъ съ мая до поздней осени.—*G. косматый*, *S. Loeselii* L. Самый обыкновенный у насъ, растетъ по полямъ, между хлѣбами и около жильевъ. Стебель и листья покрыты волосками, листья перисто-вырѣзные съ коньконосною оконченою лопастью, стручки вдвое длиннѣе отклоненныхъ цветоноожекъ.—*G. весенгерскій*, *S. rapaponicum*. Jascq., называемый въ народѣ „рогаткою“, растетъ по окраинамъ полей и между хлѣбами. Высокое до 4 ф. сизо-зеленое, совершенно голое растеніе съ распростертными вѣтками и блѣдно-желтыми цветоноожками, стеблевые листья перисто-разсѣченные на линейныя долики, стручки длинные, немного изогнутыя, на толстыхъ цветоноожкахъ.—*G. сжатый*, *S. strictissimum* L. попадается изрѣдка въ кустарникахъ; имѣть стебли невѣтвистые, листья щельные, продолговато-ланцетныя, стручки длинные, расположенные сжаты мѣромъ на вершинѣ стебля; многолѣтній.—*G. узколистный*, *S. junceum* M. B. растетъ по степнымъ мѣстамъ, сизо-зеленый, верхніе листья почти линейныя, нижніе шире, но опадаютъ скоро, стручки длинные и подобно предыдущему прижаты къ оси соцвѣтія.

Чесночникъ, *Alliaria Andrz.* Родъ этотъ названъ отъ чесночного запаха, издаваемаго листьями растенія при растираніи ихъ. Единственный видъ, Чесночникъ лекарственный, *A. officinalis* DC. встрѣчается у насъ весьма часто въ садахъ и рощахъ подъ тѣнью деревьевъ; достигаетъ 3 ф. высоты, темно-зеленаго цвета, нижніе листья широкіе, яйцевидныя, на длинныхъ черешкахъ, верхніе сердцевидныя, зубчатые, цветки белыя, стручки голые съ сильно выдавшимся среднимъ первомъ на створкахъ. Молодые листья могутъ быть употребляемы для приправы кушаньевъ вместо лука.

Желтушикъ, *Erysimum* L. Растенія сѣроватыя, шершавыя отъ прижатыхъ трехраздѣльныхъ волосковъ, съ простыми сидячими листьями и желтыми цветами. Отъ Гулявника родъ этотъ отличается четырехгранными стручками отъ сильно выдавшихся среднихъ первовъ на створкахъ; сѣмена въ одинъ рядъ, столбикъ очень короткій съ двуполатымъ рыльцемъ. До 10 видовъ въ нашей флорѣ, но б. ч. встрѣчающихся рѣдко и опредѣленіе ихъ затруднительно. Чаще другихъ встречаются у насъ: *Ж. обыкновенный*, *E. cheiranthoides* L. около жильевъ, въ садахъ и огородахъ. Стебль вѣтвистый, листья ланцетныя, заостренные, слегка зубчатые; стручки вдвое длиннѣе цветоноожекъ отклоненные, рыльце слегка выемчатое.—*Ж. сжатый*, *E. strictum*, Gärtn. Листья уже и тупѣе, чѣмъ у предыдущаго, стручки длинные, прижаты къ оси соцвѣтія, растетъ на стежахъ.—*Ж. лѣсной*, *E. sylvaticum*, M. B. растетъ по опушкамъ лѣснымъ и между кустарниками; листья ланцетныя, выемчато-зубчатые, стручки отклоненные,

столбикъ тонкій и длинный.—*Ж. съдой*, *E. canescens* Roth. растет по степямъ; листья линейные, цѣльнокрайніе, сѣроватые отъ прижатыхъ волосковъ, стручки отклонены, съ толстымъ столбикомъ.—*Ж. узколистный*, *E. angustifolium*. DC, причисляемый некоторыми авторами къ особому роду *Syrgenia*, встрѣчается у насъ часто на смычущихъ пескахъ; отличается отъ предыдущихъ болѣе крупными, почти сидячими, цвѣтками, короткими обоюдо-острыми стручками съ длиннымъ столбикомъ; въ нихъ семена расположены въ 2 ряда.

Вечерница, *Hespéris* L. Одинъ видъ этого рода, *B. душистая*, *H. matronalis* L., называемый въ народѣ „Ночною фіалкою“, встрѣчается у насъдов. часто въ рощахъ и на лугахъ, и охотно разводится крестьянами въ деревенскихъ палисадникахъ. Растеніе высокое до 3 ф. съ широколанцетными почти сидячими стеблевыми листьями и блѣдно-лиловыми цветками, издающими пріятный запахъ особенно въ тихіе вечера и ночь. Гораздо рѣже на степныхъ и перелогахъ попадается *B. грустная*, *H. tristis*, L. ниже первой, съ зеленоватыми лепестками вѣнчика, на которыхъ замѣтны лиловыя жилки. Оба вида многолѣтніе зацвѣтаютъ въ юнѣ.

Левкой, Mathiola, R. Br. Кромъ Однолѣтняго левкоя, M. annua L., повсюду разводимаго въ садахъ въ роскошныхъ маxровыхъ и душистыхъ формахъ съ различными оттенками красокъ, есть у насъ и дикорастущій видъ, **Л. душистый**, M. fragrans, Bunge, встречающійся нерѣдко на мѣловыхъ кряжахъ по берегамъ Оскола и Донца. Онъ имѣть цвѣтки мутно-лиловые, невзрачные, но съ пріятнымъ запахомъ.

Вяжечка, Turrilis, L. Единственный видъ этого рода, *B. гладкая*, *T. glabra* L. встрѣчается у насъ часто на открытыхъ, сухихъ мѣстахъ, б. ч. на суглинкахъ. Все растеніе сизо-зеленое голое, до 3 ф. высоты; стебель не вѣтвистый, листья продолговатые, заостренные стрѣловиднымъ основаніемъ, сидячіе; цвѣтки блѣдно-желтые, стручки длинные, прижаты къ стеблю. Цвѣтеть лѣтомъ. Питательное пастицкое растеніе; листья пригодны для салата, а сѣмена содержать много жирнаго масла.

Сердечникъ, *Cardamine* L. Растенія съ линейными сплюснутыми стручками, бѣлыми или блѣдо-розовыми цвѣтками и непарно-перистыми листьями, коихъ оконечный листокъ только немнога болѣе побочныи.—*C. горький*, *C. amara* L. На сырыхъ лугахъ, мѣстами въ изобиліи (Печенѣги, по Донцу); корневище тонкое съ отпрысками, листья съ 5—7 парами побочныхъ листочковъ, цвѣтки крупные, бѣлые, съ липовыми тычинками.—*C. луговой*, *C. pratensis* L. дов. часто, особенно въ Изюмскомъ у., на лугахъ по Донцу; отличается отъ другихъ розовыми цвѣтками. *C. болотный*, *C. uliginosa* M. B., крупнѣе предыдущихъ, до $2\frac{1}{2}$ ф., съ толстымъ корневищемъ и крупными бѣлыми цвѣтками.—*C. разверзающійся*, *C. impatiens* L. Нѣжная растенійца, произростающая въ изобиліи въ тѣнистыхъ рощахъ.

(Люботинъ); стебли густо-облистенные, листья со многими парами окружленныхъ зубчатыхъ листочковъ, цветки крошечные, созревшіе стручки при дотрогиваніи мгновенно разверзаются—*C. малоцветный*, *C. parviflora* L. по величинѣ похожъ на предыдущій, но листьевъ гораздо меньше, бѣлыхъ крошечныхъ цветковъ мало и стручки отклонены отъ стебля, опадають изрѣдка на влажныхъ пескахъ по берегамъ рекъ.—*C. косматый*, *C. hirsuta* L. съ развитѣннымъ отъ основанія стеблемъ, темно-зелеными листьями и маленькими бѣлыми цветками о 4 тычинкахъ; въ тѣнистыхъ мѣстахъ изрѣдка.—Зелень всѣхъ видовъ Сердечника доставляетъ вкусный и здоровый хотя необильный кормъ для скота, можетъ быть употребляема также въ супъ и для салата. Всѣ виды цветутъ въ маѣ и въ началѣ лѣта, но не долго.

Зубянка. *Dentaria* L. Растенія весення съ толстымъ горизонтальнымъ корневищемъ, покрытымъ мясистыми чешуйками въ видѣ зубцевъ, перисто-разсѣченными листьями и лиловыми цветками. Участъ попадаются изрѣдка 2 вида: *Z. пятиместная*, *D. quinquefolia* M. B. съ 3—5 стеблевыми перисто-разсѣченными листьями и блѣдно-розовыми цветками.—*Z. луковичная*, *D. bulbifera* L. имѣетъ много стеблевыхъ листьевъ, изъ коихъ нижніе перисто-разсѣченные, верхніе цѣльные, снабженные въ пазухахъ луковичными почками, отпадающими въ зрѣлости; при благопріятныхъ условіяхъ изъ луковичекъ образуются новыя особи.

Постѣпка, *Arabis*. L. Малыя до 1 ф. растенія, б. ч. шершавыя отъ прижатыхъ волосковъ, съ розеткою цѣльныхъ листьевъ при основаніи, бѣлыми цветками и линейными стручками съ незамѣтными нервами. Только 2 вида встрѣчаются чаще другихъ: *P. полевая*, *A. Thaliana* L. повсюду на поляхъ, травянистыхъ мѣстахъ и на легкихъ супесчаныхъ почвахъ; отъ нѣсколькихъ дюймовъ до 1 ф. высоты, смотря по качеству почвы; нижніе листья продолговатые зубчатые, цветки крошечные, бѣлые рас простертъ щиткомъ, цветутъ съ апрѣля до осени, стручки вверхъ.—*P. косматая*, *A. hirsuta*, Scop. по межамъ и окраинамъ полей не рѣдко; крупнѣе и выше предыдущаго вида, стебли неразвѣтленные, стеблевые листья сердцевидныя основаніемъ объемлющіе, цветки бѣлые, стручки въ удлиненныхъ гроздахъ.

Свирѣпа, *Barbarea*. R. Br. Растенія съ линейными почти цилиндрическими стручками, желтыми,дов. крупными цветками и лировидно-перистыми листьями съ широкую оконечною лопастью, отъ 1 до 2 ф. высоты. Растутъ на лугахъ и особенно часто на поляхъ въ яровыхъ посѣвахъ, какъ сорные, двулѣтнія травы. Къ самыи обыкновеннѣе принадлежитъ *C. обыкновенная*, *B. vulgaris*, R. Br. съ прямыми немного отклоненными отъ стебля стручками и видоизмѣненіе ея: *B. arcuata*, Reichb. съ немного изогнутыми стручками. Гораздо рѣже встрѣчаются *C. ранняя*, *B. graciosa*, R. Br. на сырыхъ и влажныхъ мѣстахъ съ широкую оконечною лопастью листьевъ и *C. сжатая*, *B. stricta* Andr. въ кустарникахъ, съ прижатыми къ оси соцветія стручками.

Крессъ, *Nasturtium*, R. Br. Небольшія нѣжныя растенія, съ не-парно-перисто-разсѣченными листьями, коихъ оконечная доля шире и со стручками удлиненными или короткими. Виды Кресса растутъ обыкновенно на влажныхъ низменныхъ мѣстахъ, на поемныхъ лугахъ, по берегамъ рѣчекъ и ручьевъ и на болотахъ. Цвѣтки у всѣхъ желтые, но у однихъ вѣнчикъ вдвое длиннѣе чашечки, у другихъ почти равенъ ей. Къ первымъ принадлежитъ: *K. луговой*, *N. silvestre*, R. Br. съ удлиненными стручками, *K. золотистый* *N. aureum*, Boiss. и *K. короткоплодный*, *N. brachycarpum*, C. A. Meyer. Всѣ три вида, по показанію проф. Черниева (Конспектъ растеній, стр. 4) „распространены по всей Украинѣ, часто растутъ на поемныхъ лугахъ совмѣстно и зацвѣтаютъ тотчасъ послѣ спаденія весеннихъ водъ, покрывая золотистымъ ковромъ берега и островки. Они оплодотворяются взаимно и образуютъ переходныя, формы трудныя для опредѣленія“.—На болотистыхъ мѣстахъ столь-же часто встрѣчается *K. болотный*, *N. palustre* DC., съ вѣнчикомъ едва выдающимся изъ чашечки, короткими раздутыми стручечками.—*K. полевой*, *N. Turganinovii*, Czernw., растетъ на болѣе сухихъ мѣстахъ, обыкновенно по окраинамъ полей. Онъ выше ростомъ, сильнѣе развѣтвленъ и имѣеть очень короткие, почти шаровидные стручечки.—Зелень Кресса имѣеть немного острый, но пріятный вкусъ и весною можетъ быть употребляема въ видѣ салата.

Капуста. *Brassica* L. Растенія отъ 2 до 4 ф. высоты съ листьями голубовато-зелеными, нижними лировидно-раздѣльными, верхними сидячими, и желтыми цвѣтками; чашечка прижата, стручки съуживающіеся на верхушкѣ въ б. или м. длинный клювъ, створки съ 1 нервомъ и 2-мя побочными жилками, сѣмена въ одинъ рядъ.—Самый замѣчательный родъ во всемъ семействѣ, по множеству весьма полезныхъ разновидностей, воздѣлываемыхъ повсюду въ огородахъ и на поляхъ и доставляющихъ вкусную и здоровую пищу людямъ и кориць домашнимъ животнымъ. Изъ культурныхъ растеній отличаются 3 вида. *Огородная капуста*, *B. oleracea*, L. Стебель и корневые листья голые съ голубоватымъ налетомъ, верхніе листья съжженными основаниемъ сидячие, вѣнчикъ блѣдно-желтый, соцвѣтие уже во время цветенія удлиненное. Въ дикомъ состояніи растетъ по берегамъ Средиземного моря и съ глубокой древности разводится на поляхъ и въ огородахъ въ различныхъ видеизмѣненіяхъ. Отличаются: кочанную капусту, вирзингъ или сафой, курчавую, брюссельскую, колраби, цвѣтную и мн. др.—*Брюква*, *B. Napus*, L. Листья сизо-зеленые, верхніе объемлющіе стебель, цвѣтки золотисто-желтые съ сильнымъ медовымъ запахомъ, 4 длиннѣйшая тычинки отклонены. Въ дикомъ состояніи встречается въ Голландіи, у насъ же разводится въ трехъ видеизмѣненіяхъ. *Огородная брюква*, *B. Napus* L. var. *esculenta*, съ толстыми корнями воздѣлывается въ пищу людямъ. *Rapсъ озимый* и *яровый* *B. Napus* var. *oleifera*, съ тонкими корнями, воздѣлываются на поляхъ какъ маслянистые растенія. Сѣмена рапса содержать много масла, ко-

торое однакожъ годится только для освѣщенія и техническихъ производствъ.—*Rapta*, B. Rapa L. Корневые листья травянисто-зеленые и косматые, стеблевые сизо-зеленые, верхніе объемлющіе стебель, соцвѣтіе во время цвѣтенія плоское (щитковидное) неудлиненное какъ у двухъ предыдущихъ видовъ и этимъ легко отъ нихъ отличается. Въ дикомъ состояніи рапта произрастаетъ въ Помераніи и Мекленбургѣ въ большомъ количествѣ на поляхъ и между хлѣбами какъ сорное растеніе. Она встрѣчается и у насъ довольно часто въ совершенно дикомъ видѣ на поляхъ и перелогахъ. Ботаники называютъ ее „полевою капустою“, *B. campestris* L. Два видоизмѣненія ея: *оазимая* и *яровая* *сурпиница* часто воздѣлываются на поляхъ въ среднихъ губерніяхъ, какъ маслинистыхъ растенія. Онѣ выносятъ рапса, относительно холода, и довольствуются почвою менѣе плодородною. Сѣмена ихъ менѣе рапсовыхъ, но по качеству масла совершенно съ ними сходны. Къ этому же виду принадлежать: *Огородная рапта*, *B. Rapa var. esculetana* съ мясистымъ, округленнымъ, бѣлымъ корнемъ, воздѣлываемая повсемѣстно въ огородахъ какъ овощь и *Кормовая рапта*, воздѣлываемая на поляхъ въ Германіи и Англіи (турнепсъ) для корма домашнихъ животныхъ. Нѣкоторыя разновидности послѣдней имѣютъ большой корень, достигающій до 30 ф. вѣса.

Изъ дикорастущихъ видовъ капусты изрѣдка встрѣчается у насъ *Черная горчица*, *Brassica nigra* L. на поляхъ и между хлѣбами. Это однолѣтнее растеніе, зеленое, до 3 ф. высоты, нижніе листья его лировидно-раздѣльные, верхніе копьевидны основаніемъ сидячіе, стручки прижаты къ вѣткамъ съ клювомъ, который въ три раза короче длины стручка. Черная горчица выдѣлывается въ большихъ размѣрахъ на поляхъ въ южной Франціи для сѣмянъ, которые хотя вдвое менѣе черныхъ сѣмянъ бѣлой горчицы, но содержать больше эфирныхъ масла и пряныхъ веществъ и потому употребляются для приготовленія лучшихъ сортовъ французской горчицы, имѣющей обширный сбытъ.—*Горчица узколистная*, *Brassica juncea*, Czernw., довольно сходная съ предыдущею, имѣетъ верхніе листья узко-ланцетные или линейные и стручки бугорчатые отклоненные, встрѣчается у насъ тоже изрѣдка на сорныхъ мѣстахъ и на поляхъ. Хотя названа проф. Черняевымъ „Сарентскою горчицею“, но въ культурѣ кажется не была испытана. Горчица, воздѣлываемая нѣмецкими колонистами въ окрестностяхъ Саренты (Саратовской губ.) происходитъ изъ Китая. Она совершенно голая не имѣть волосковъ ни на листьяхъ, ни на стеблѣ, стручки ея тоже гладкіе, чѣмъ рѣзко отличается отъ косматыхъ стручковъ бѣлой горчицы. Сѣмена ея малыя желто-бурыя, но превосходного качества и цѣнятся даже за границею выше другихъ сортовъ горчицы.

Горчица. *Sinapis* L. Родъ этой отличается отъ капусты только морфологически: стручками съ болѣе длиннымъ, сплюснутымъ клювомъ, и 3—5 сильно выдавшимися нервами на створкахъ (у стручковъ капусты только одинъ нервъ), при томъ соцвѣтіе у горчицы при созрѣ-

ваниі плодовъ мало удлиняется. *Бѣлая горчица*. *S. alba* L. попадается у насъ на поляхъ только изрѣдка и вѣроятно въ одичаломъ видѣ, за то часто разводится въ огородахъ, и иногда въ небольшихъ размѣрахъ и на поляхъ, для сѣянія, которымъ поступаютъ въ аптеки или употребляются для приготовленія столовой горчицы. Видъ этотъ легко отличить отъ всѣхъ другихъ видовъ капусты и горчицы по короткимъ стручкамъ съ длиннымъ плоскимъ клювомъ, покрытымъ жесткими, бѣлыми волосками; створки стручка съ 5 нервами.—*Г. полевая*, *S. arvensis*, L., называемая въ народѣ „Сурепицей“, растетъ въ изобиліи на поляхъ между хвѣбами какъ тяготное сорное растеніе, указывающее однакожъ на хорошее качество почвы. У нея только нижніе листья лировидно-раздѣльные, верхніе лайцевидные или продолговатые неравномѣрно-зубчатые, стручки покрыты жесткими обращенными назадъ волосками съ длиннымъ клювомъ, въ которомъ чисто содержится одно сѣмя. Сѣмена черныя содержать до 20% жирнаго масла. Истребляютъ эту однолѣтнюю сорную траву полотьемъ. Въ свѣжемъ видѣ вмѣстѣ съ другимъ зеленымъ кормомъ скотъ поѣдаетъ ее охотно.

В. Стручковыя. Плодъ „стручечекъ“, двугнѣздный, разверзающійся, коего длина только въ 2—3 раза превышаетъ ширину. Стручечекъ можетъ быть сплюснутъ съ боковъ или краевъ, а соотвѣтственно этому перепончатая перегородка его бываетъ широкою или узкою.

а. Стручечки сплюснутые съ боковъ, съ широкою перегородкою.

Икотникъ, *Alyssum* L. Растенія небольшія, б. ч. сѣрыя отъ покрывающихъ ихъ звѣздчатыхъ волосковъ, листья цѣльные, цветки бѣлые или желтые, при увиданіи бѣлѣющіе. Стручечки эліптическіе или округлые съ 2—6 сѣменами въ каждомъ гнѣздѣ.—*И. обыкновенный*, *A. incanum* L. (*Berteroa incana* DC), называемый въ народѣ „бѣлоцвѣтомъ“, а также „бѣлью“, самое обыкновенное растеніе на поляхъ, иногда сплошнымъ ковромъ покрываетъ цѣльные десятины перелоговъ, столь же обыкновено въ садахъ и около жильевъ. До $1\frac{1}{2}$ ф. высоты, листья ланцетные, рѣдко-зубчатые, стручки эліптическіе съ 4—6 сѣменами въ каждомъ гнѣздѣ. Легко отличается отъ другихъ видовъ по бѣлымъ цветкамъ, коихъ лепестки глубоко-разщеплены на двѣ части, такъ что снизу кажется будто въ цветкѣ 8 узкихъ лепестковъ. Однолѣтний и цвететъ начиная съ весны до поздней осени.—*И. малый*, *A. minimum*, Willd. Однолѣтний попадаетсядов. часто на поляхъ и перелогахъ. Только до 3 дюймовъ высоты, стебли восходящіе, листья продолговато-линейные, цветки крошечные цѣльные съ цѣльными лепестками и опадающею чашечкою; стручки округлые.—*И. чашечный*, *A. calycinum* L. (*Psilonema calic.* C. A. Meyer), на поляхъ и перелогахъ изрѣдка. Выше ростомъ предыдущаго, зеленоватый, листья продолговато-ланцетные, цветки желтые, стручечки округлые съ выемкою на верхушкѣ, обыкновенно окружены увядающею чашечкою.

Тачка, *Draba* L. Маленькая растенійца съ розеткою листьевъ при основаніи, стручечки продолговатые къ обоимъ концамъ съуженные,

съ многочисленными сѣменами въ каждомъ гнѣздѣ. Два вида, встрѣчающіеся у насъ очень часто. *T. весенняя*, *D. verna* L. На открытыхъ сухихъ мѣстахъ, особенно на пескахъ, зацвѣтаетъ какъ только спѣга сойдуть. Изъ розетки ланцентныхъ листьевъ появляется нѣсколько стебельковъ безлистныхъ, на коихъ гроздовидно расположены маленькие бѣлые цвѣточки съ разщепленными на двое лепестками.—*T. желтая* *D. lutea* Gilib. на лугахъ, поляхъ, въ садахъ и огородахъ, до $\frac{1}{2}$ фута высоты, листья розетки яйцевидные, къ основанию суживающіеся, стеблевые сидячіе, цвѣтки желтые съ цѣльными лепестками, струччи на горизонтальныхъ цвѣтоноожкахъ.

Рыжей *Camelina*, Crantz. Родъ этотъ легко отличается по стручкамъ *грушевидной* формы съ выпуклыми створками и остриемъ на верхушкѣ.—*P. посѣвныи*, *C. sativa* Crantz. Растеніе почти голое, до 2 ф. высоты, стеблевые листья узко-ланцетные, стрѣловидныиъ основаниемъ сидячіе, цвѣтки блѣдно-желтые, стручечки съ плотными створками и узкимъ, плоскимъ краемъ. На поляхъ и между хлѣбами обыкновенное, а въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ и воздѣлывается для сѣмянъ, содержащихъ много масла.—*P. мелкоплодныи*, *C. microsarga*, Andrz. Сходенъ съ предыдущимъ, но стебель и листья покрыты прижатыми звѣздчатыми волосками; стручечки меньше, немного сплюснуты съ боковъ съ широкимъ плоскимъ краемъ, сѣмена почти вдвое меньше, чѣмъ у предыдущаго. Встрѣчается особенно часто въ льнахъ и вообще на степяхъ и перелогахъ.

Хрѣнъ, *Cochlearia*, L. Растенія большія, стручечки элиптическіе или почти шаровидные.—**X. настоящій**, *C. armigera* L. Стебли до 3 ф. высоты, на верху развѣтвленные; корневые листья черешчатые, большие, самые нижніе гребенчато-перисто-раздѣленные, позднѣйшіе цѣльные городчатые, стеблевые ланцетные до линейныхъ, цвѣтки бѣлые, стручечки элиптическіе. На посѣнныхъ лугахъ во всей Украинѣ обыкновенный, но рѣдко приносить зрѣлые плоды. Употребленіе хрѣна для приправы кушаньевъ и въ медицинѣ всѣмъ известно. Корни его толстые цилиндрическіе, бѣлые, содержать острое летучее эфирное масло, вызывающее слезы и дѣйствующее жгучимъ образомъ на вкусовые нервы. Самое сильное дѣйствие оказываютъ корни, собранные позднею осеню или раннею весною. Настой хрѣна на водѣ или спиртѣ съ пользою употребляется въ народѣ отъ спазмъ желудка, этотъ же настой разбавленный водою, какъ полосканіе служитъ превосходнымъ средствомъ противъ разслабленія десенъ и флюса. Хрѣнъ не рѣдко воздѣлываются у насъ въ огородахъ, а въ Баваріи, въ окрестностяхъ Форхгейма, на поляхъ на пространствѣ десятковъ десятинъ. Корень воздѣлываемаго хрѣна не уступаетъ въ своихъ свойствахъ дикорастущему.—**X. водяной**, *C. amphibia*, Ledeb. (*Nasturtium amph.* DC). По берегамъ рѣчекъ и на болотахъ, отчасти въ водѣ, у насъдовъ. обыкновенное растеніе. Стебель дудчатый, голый, внизу съ отпрысками, до 1 ф. и выше; листья погруженные въ воду гребенчато-

разщепленные на мелкие доли, надводные цельные, продолговатые зубчатые; цветки желтые въ зонтиковидныхъ гроздахъ, стручки продолговатые въ 3—4 раза короче отстоящихъ цветоножекъ. Цвѣтетъ въ концѣ мая и июня.

б. Стручечки съ краевъ сжаты, а потому съ узкою поперечной перегородкою.

Ярутка, *Thlaspi, L.* Растенія совершенно голыя съ прикорневою розеткою листьевъ и сидячими стеблевыми; стручки овальные съ выемкою на верхушкѣ и крылатыми ладьевидными створками.—*Я. полевая,* *T. arvense, L.* До 1 фут. высоты, стеблевые листья, стрѣловидныя основаниемъ сидячие, стручки почти овальные, широко-окрыленные съ узкою выемкою на верхушкѣ. Однолѣтнее на поляхъ и огородахъ сорное растеніе, при употреблении которого молоко коровъ получаетъ непріятный вкусъ, оттого въ народѣ растеніе это называются „вередникомъ“.—*Я. холмовая,* *T. petfoliatum, L.* Ниже ростомъ, пускаеть одинъ только стебель, стеблевые листья овальные, сердцевидныя основаниемъ объемлюще стебель, стручки обратно-яйцевидные съ широкой выемкою на верхушкѣ и узкимъ крыломъ. По окраинамъ дорогъ, на холмахъ попадается гораздо рѣже, цвететъ весною. Цвѣтки у обоихъ видовъ блѣдны.

Жеруха, *Lepidium L.* Стручечки яйцевидные до сердцевидныхъ, съ небольшою выемкою на верхушкѣ; створки ладьевидные на спинкѣ килеватые или крылатые, гибѣда односѣянія.—*Ж. посѣчная,* *L. sativum L.* Воздѣлывается по всей Европѣ въ огородахъ для салата и какъ пряное растеніе для приправы кушаньевъ. Изрѣдка попадается одичалымъ на пустыряхъ и около жильевъ. Все растеніе голубовато-зеленое до $1\frac{1}{2}$ ф. высоты, нижніе листья перисто-разщепленные, верхніе линейные; стручки прижатыя, овальные къ верхушкѣ широко-окрыленные. Зацвѣтаеть въ июнѣ. Красно-бурыя сѣмена, находящіяся въ продажѣ, проростаютъ очень быстро на влажной бумагѣ или на тряпкѣ и потому ихъ высѣваютъ подъ Пасху для украшенія стола. Сѣмена эти содеражать острое эфирное масло подобно зелени и поэтому употребляются какъ лѣкарственные средства. (*Semina et herba nasturtii hor-lensis*).—*Ж. мусорная,* называемая въ народѣ „вѣничникомъ“ или „клошовникомъ“ за непріятный запахъ, принадлежитъ у насъ къ самыемъ обыкновеннѣмъ растеніямъ, попадающимся въ изобилии на сорныхъ мѣстахъ, около жильевъ и на старыхъ перелогахъ. Растетъ кустиками въ $\frac{1}{2}$ —1 ф. высоты, нижніе листья перисто-разщепленные, верхніе сидячие; цветки б. ч. только съ 2-мя тычинками и часто безъ вѣничика; стручечки отклоненные овальные, къ верхушкѣ узко-окрыленные. Цвѣтетъ все лѣто. Отваръ этого растенія крестильне употребляютъ противъ лихорадки, а зелье для уничтоженія блохъ.—*Ж. широколистная,* въ народѣ „собачий хрѣтъ“ или „хриноѣкъ“, часто попадается у насъ на солонцеватыхъ почвахъ, въ ложбинкахъ, где застаивается вода и по берегамъ рѣчекъ. Стебли до 2 ф. и выше, развѣтвленные, нижніе листья яйцевидные, городчато-пильчатые, стебле-

вые сидячие ланцетные до линейныхъ, стручечки округленные, безкрылье, отстоящіе. Растенія совершенно голыя, блѣдовато-зеленія, легко узнаются по росту и густому соцвѣтію, имѣющему видъ зонтика. Попадаются вредными для рогатаго скота, который однакожъ его не трогаетъ. Другіе виды жерухи, какъ то: *Ж. тачковидная*, *L. draba* L. и *Ласковецъ*, *L. perfoliatum*, L., встрѣчается у насъ очень рѣдко, на поляхъ и по дорогамъ.

Сумочникъ, *Capsella*, Vent. Единственный видъ этого рода *Сумочникъ обыкновенный*, *C. bursa pastoris* L., имѣющій обширное распространение по всему земному шару, растетъ и у насъ въ изобилии, на сорныхъ мѣстахъ, по дорогамъ и особенно въ садахъ на травникахъ, какъ сорное растеніе. Онъ узнается легко по своеобразнымъ обратно-трехугольнымъ стручечкамъ, напоминающимъ пастушью сумку древнихъ, отчего и получилъ систематическое латинское название. Растенія однолѣтнія небольшія, до 1 ф. высоты, съ прикорневою розеткою листьевъ, б. ч. перисто-раздѣльныхъ, тонкими развѣтвленными стеблями и блѣдыми цвѣтками; иногда лепестки цвѣтковъ превращаются въ тычинки, тогда въ цвѣткахъ бываетъ 10 тычинокъ. Листья розетки тоже весьма измѣнчивы относительно формы, такъ что отличаются не сколько разновидностей этого вида. Сѣмена содержать до 20%, жирного масла, пригоднаго для освѣщенія.

С. Орѣшковыя. *Nicotinaceae*. Стручечки неразверзающіеся, иногда окрыленные, двугнѣздные или одногнѣздные.

Рыжикъ, *Neslea*, Desv. Стручечекъ почти шаровидный съ оставшимся столбикомъ, одногнѣздный, односѣмянный. Единственный видъ этого рода *P. полевой*, *N. paniculata*, Desv, встрѣчается у насъ часто на поляхъ и между хлѣбами. Онъ очень сходенъ по наружности съ Рыжеемъ (*Camelina*), описаннымъ выше, но легко отличается по маленькимъ совершенно шаровиднымъ стручечкамъ, коихъ диаметръ въ 3—4 раза короче отстоящихъ цвѣтоножекъ; цвѣтки блѣдно-желтые, стеблевые листья стрѣловиднымъ основаниемъ сидячіе, однолѣтніе; цвѣтетъ въ іюнѣ и іюлѣ. Сѣмена содержать жирное масло.

Вайды, *Isatis* L. Отличается своеобразными продолговатыми силюснутыми, окрыленными стручками, висячими на очень тонкихъ цвѣtonожкахъ и въ зрѣлости черниющими. *B. красильная*, *I. tinctoria* L., встрѣчается у насъ изрѣдка на поляхъ и перелогахъ совершенно въ дикомъ видѣ. Вайды содержатъ въ листьяхъ своихъ прочную синюю краску и прежде воздѣлывалась въ большихъ размѣрахъ во Франціи, Турингіи, Лаузаци и Бранденбургѣ. Листья срѣзывались три раза въ лѣто и размятые въ свѣжемъ видѣ формировались въ шарики, употребляемые для окраски въ синій и зеленый цвѣта. Теперь вайды воздѣлываются только въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ для подмѣси къ индиго, которое даетъ гораздо ярче и красивѣе краску, и совершенно вытѣшило вайду изъ употребленія.

Д. Членисто-стручковые. Стручекъ изъ двухъ или многихъ члениковъ, распадающейся въ зрѣлости на поперечные членики, или не распадающейся.

Грыцникъ, (Свербига, Горлюна) *Bunias* L. Стручки яйцевидные, бугорчатые, неравнобокіе, съ косо поставленнымъ столбикомъ и двумя односѣмянными гнѣздами, расположеными одно надъ другимъ. По этимъ признакамъ легко распознать единственный у насъ видъ: *I. луговой*, *B. orientalis* L., произрастающій на лугахъ, поляхъ и на пустыряхъ. Растеніе высокое до $2\frac{1}{2}$ ф., развѣтленное, съ нижними листьями лировидно-раздѣльными и большою оконечнouю лопастью, слѣдующіе листья продолговатые, при основаніи копьевидные, на вершинѣ заостренные, верхніе ланцетные, цветки ярко-желтые, стручки на косо-вверхъ стоячихъ плодоножкахъ. Цвѣтеть съ конца мая. Молодые листья пригодны для салата. Деревенскіе мальчики весною охотно поѣдаютъ свѣжіе стебли, содержащіе острый, но пріятный для вкуса сокъ. Въ Германіи воздѣлываются иногда на тощихъ почвахъ, какъ кормовое растеніе. Оно развивается раньше другихъ, укрѣпляясь легкими почвы и такъ разрастается, что трудно его истребить, между тѣмъ даетъ здоровый и вкусный кормъ для рогатаго скота и другихъ дом. животныхъ.

Рѣденникъ, *Chorispora*. D. C. Стручекъ линейный съ поперечными перехватами, суженный на верху въ длинный носикъ. Единственный видъ этого рода, *P. дикий*, *Ch. tenuella* D. C., цветущій съ половины мая, принадлежитъ у насъ къ обыкновеннымъ на сорныхъ мѣстахъ, около заборовъ и по окраинамъ луговъ, на легкихъ почвахъ. Растетъ небольшими кустами, отъ $\frac{1}{2}$ до 1 ф. высоты, шероховатый отъ желѣзистыхъ волосковъ; листья продолговатые, нижніе выемчато-крупно-зубчатые; цветки лиловые, стручки, на короткихъ цветоножкахъ оттопыренные и немного изогнутые, въ зрѣлости распадаются на отдѣльные поперечные членики.

Рѣдька, *Raphanus* L. Къ этому роду принадлежитъ всѣмъ известная *P. огородная*, *R. sativus* L. Растеніе это происходитъ изъ Китая и издавна воздѣлывается въ огородахъ, а отчасти и на поляхъ, какъ овощъ и пряное растеніе въ различныхъ видоизмѣненіяхъ. Настоящая огородная рѣдька отличается толстымъ, мясистымъ стеблемъ различной величины и цвета. *Редисъ* или *мясичная рѣдька*, *R. sativus* var. *radicula*, имѣть корень рѣпчатый и мягкий съ нѣжнымъ мясомъ и различного цвета отъ бѣлаго до темно-фиолетового. Развивается въ парникахъ и на грядкахъ для непосредственного употребленія. *Китайская рѣдька*, *R. sativus* var. *chinensis*, съ тонкимъ вѣтвистымъ корнемъ воздѣлывается въ послѣднее время на поляхъ, какъ маслянистое растеніе, но въ этомъ отношеніи она далеко уступаетъ рапсу. Рѣдька часто встречается у насъ и въ одичаломъ видѣ возлѣ жильевъ и на поляхъ. Ее легко узнать по стручкамъ раздутымъ внизу и оканчивающимся коническимъ остриемъ. Стручки съ 2—3-мя мало

замѣтными перехватами, неразверзаются и содержать одинъ рядъ сѣяній, расположенныхъ въ корковомъ веществѣ. Цвѣтки лиловые, или бѣлые съ лиловыми жилками; корневые листья лировидно-перисто-раздѣльные, стебель развѣтвленный, отъ 1—2 ф. высоты, цвѣтеть съ июня до августа.

Катранъ. *Crambe*, L. Родъ этотъ легко отличается по двучленнымъ стручкамъ, изъ коихъ верхній членникъ яйцевидно-округлый содержитъ одно сѣмя, нижній цилиндрический, не отдѣленный перегородкою, безъ сѣмени. Степная довольно большая растенія. Чаше другихъ попадаетъ на степяхъ *K. перистолистный*, *C. pinnatifida* R. Br., голое сизо-зеленое растеніе съ перисто-надрѣзанными листьями; верхній членникъ стручечка, почти гладкій.—*K. венгерскій*, *C. Tatarica* Jacq. Сходенъ съ предыдущимъ, но болѣе развѣтвленъ и имѣть стручечки морщинистые. Цвѣтки у обоихъ видовъ бѣлые. Послѣдній имѣть большой мясистый и сладковатый корень, который венгерцы, разрѣзавъ на тонкія пластинки, употребляютъ вместо салата, а въ вареномъ виде—какъ овощъ.

Сем. 7-е. Резедовыя. Resedaceae.

Изъ этого семейства, къ которому принадлежитъ любимая и повсюду разводимая въ садахъ и теплицахъ *Резеда душистая*, *Reseda odorata* L., происходящая изъ Египта, въ дикомъ состояніи у насъ встрѣчается только одинъ видъ *Резеда красильная*, *R. luteola* L., попадавшійся мнѣ изрѣдка на мѣловыхъ горахъ въ окрестностяхъ Славянска и Святыхъ горъ. Она имѣть стебель прямой, отъ 2—3 ф. высоты, развѣтвленный, листья продолговато-ланцетные, цвѣтки желтоватые, безъ запаха, зреяя коробочки вверхъ стоячія. По видимости此刻 можно узнать въ ней резеду, но она не имѣть запаха, за то во всѣхъ частяхъ ея находится красящій пигментъ, дающій при обработкѣ квасцами желтую очень прочную краску. Для этой цѣли въ Англіи и Голландіи разводятъ ее кое-гдѣ на поляхъ въ небольшихъ впрочемъ размѣрахъ.

Сем. 8-е. Фіалковыя. Violarieae.

Это небольшое семейство имѣть представителемъ въ Европѣ только одинъ родъ.

Фіалка, *Viola*, L. Растенія небольшія, травянистые, съ простыми листьями, снабженными прилистниками, и довольно крупными, красивыми, иногда душистыми, цвѣтками. Цвѣтки состоять изъ 5 чашелистиковъ, внизу удлиненныхъ, 5-ти неравномѣрныхъ лепестковъ, изъ коихъ нижній большой снабженъ шпорцемъ; 5 тычинокъ на весьма короткихъ нитахъ съ пыльниками, обращенными внутрь и конусообразно покрытыми пестикъ. Пестикъ одинъ, одногнѣздный съ однимъ столбикомъ, оканчивающимся головчатымъ или крючковатымъ рыльцемъ. Плодъ

одногнездная коробочка, въ зрѣости растрескивающаяся 3-ми створками, на внутренней сторонѣ которыхъ въ одинъ рядъ расположены сѣмена.—Фіалки во всѣхъ частяхъ своихъ, особенно же въ корневищахъ, содержать особое вещество, віолинъ, имѣющее разрѣшающія, а въ большихъ дозахъ рвотные свойства, но въ настоящее время почти неимѣющее примѣненія въ медицинѣ. Напротивъ, запахомъ и красотою цвѣтковъ, фіалки съ древнѣйшихъ временъ привлекали вниманіе человѣка; у Грековъ служили эмблемою женскаго цѣломудрія и скромности и до сихъ поръ разводятся охотно въ садахъ, какъ любимыя украшающія растенія.—Родъ фіалки отличается значительною измѣнностью формъ, но новѣйшія наблюденія доказали, что многія изъ этихъ формъ, принимаемыя прежними ботаниками за отдельные виды, представляютъ только разновидности, возникшія отъ вліянія мѣстныхъ почвенныхъ и климатическихъ условій. Переходныя формы, встрѣчающіяся даже въ ограниченной мѣстности, вполнѣ подтверждаютъ это мнѣніе. Въ нашей флорѣ проф. Черняевъ отличалъ до 15 видовъ ф., изъ коихъ только немногія принадлежатъ къ самымъ обыкновеннымъ, остальные же встрѣчаются довольно рѣдко. Раздѣляются родъ этотъ на двѣ группы. *A.* Фіалки безстебельныя, т. е. съ подземными корневищемъ, на которомъ сидятъ листья, а во время цвѣтенія появляются цвѣтоножки съ цвѣтками. Къ нимъ принадлежать: *F. душистая*, *V. odorata* L. Самое обыкновенное и любимое весеннее растеніе, съ корневищемъ, пускающимъ длинные побѣгы, зацвѣтающіе въ будущемъ году, широко-сердцевидными, наверху притупленными листьями и душистыми, темно-лиловыми, поникшими цвѣтками. Въ рощахъ, между кустарниками, и въ садахъ встрѣчается оч. часто и во множествѣ. Цвѣтетъ въ концѣ марта и въ апрѣль. Цвѣтки идутъ на приготовленіе духовъ, для чего употребляются преимущественно культурные формы „итальянской фіалки“, *Violet de Parme*. Пигментъ, заключающійся въ лепесткахъ, употребляется въ аптекахъ для окрашиванія сиропа, а въ кондиторскихъ для окрашиванія конфетъ.—Видъ этотъ измѣняется: одно изъ видоизмѣнений, названное *Фіалкою прелестною* *Viola suavis* M. B., встрѣчается у насъ часто въ тѣнистыхъ рощахъ. Побѣги ея короче, зацвѣтаютъ въ то же лѣто, цвѣтки крупнѣе, не столь душистые и лепестки внутри бѣлые постепенно переходятъ къ вершинѣ въ лиловые.—*F. косматая*, *V. hirta* L, отличается отъ предыдущей отсутствиемъ побѣговъ, листьями лйцевидно-сердцевидными, пріостренными, цвѣтками блѣдно-лиловыми, издающими слабый запахъ только по утрамъ и вечеромъ; листья цвѣтоножки и коробочка покрыты у неї короткими волосками. Эта фіалка принадлежитъ тоже къ самымъ обыкновеннымъ, встрѣчается въ рощахъ и садахъ въ изобилии, но обыкновенно на болѣе сухихъ и открытыхъ мѣстахъ. Цвѣтетъ гораздо обильнѣе предыдущей и зацвѣтаетъ насколькими днями позже. За видоизмѣненіе ея считаютъ *F. холмовую*, *V. collina* Besser, встрѣчающуюся у насъ рѣже, на лѣсныхъ полянахъ, по опушкамъ, а иногда и на совершенно открытыхъ склонахъ. Она меныше предыдущей, свѣтло-зеленаго цвѣта, имѣть

листья продолговатые, глубоко-сердцевидные, цветки съ белым шпорцемъ. *Ф. болотная*, *V. uliginosa* Schrad., по наружности довольно сходила съ предыдущею, растетъ густыми кустиками на низменныхъ мѣстахъ, но встрѣчается гораздо рѣже предыдущихъ. Она почти голая, имѣетъ листья сердцевидные, прилистники широко-ланцетные, до половины сросшиеся съ черешкомъ, лепестки блѣдно-розовые съ тонкими продольными жилками, безъ запаха.

В. фіалки съ настоящимъ стеблемъ отъ $\frac{1}{2}$ до 1 ф. высоты, листьями очередными, изъ пазухи которыхъ выростаютъ цветоножки съ цветками. Здѣсь относится: *Ф. чудесная*, *V. mirabilis*, L. замѣтная тѣмъ, что раннею весною она изъ толстаго подземнаго корневища выпускаетъ только почковидные листья и цветоножки съ крупными, голубовато-лиловыми и немногого душистыми, но бесплодными цветками. Въ концѣ же весны на той же особи развиваются настоящіе стебли до $\frac{1}{2}$ высоты, съ 2—3 листьями, въ пазухахъ которыхъ на короткихъ цветоножкахъ появляются цветки хотя и не взрачные съ недоразвившимся цветкомъ, но приносящіе зрѣлые плоды. Видъ этотъ растетъ только въ тѣнистыхъ рощахъ и встрѣчается у насъ часто.—*Ф. собачья*, *V. canina*, L., въ развитіи дов. сходна съ предыдущею. Съ ранней весны появляется съ весьма короткими стеблями и округленными листьями, впослѣдствіи стебель вырастаетъ до 1 ф., листья удлиняются до ланцетныхъ съ короткими прилистниками; цветки блѣдно-лиловые, безъ запаха, съ желтоватымъ шпорцемъ, всѣ плодоносны. Растетъ въ рощахъ и кустарникахъ, встрѣчается довольно часто. *Ф. узколистная*, *V. persicifolia*, Schkr., легко узнается по узкимъ ланцетнымъ листьямъ съ б. или м. окрыленнымъ черешкомъ, прилистникамъ, превышающимъ длину черешковъ и довольно крупнымъ не душистымъ цветкамъ. Видъ этотъ измѣняется смотря по мѣстонахожденію и потому отличаются нѣсколько видоизмѣненій его, принимаемыхъ прежде за отдѣльные виды. Изъ нихъ *Ф. высокая*, *V. clatior* Fr., растетъ въ рощахъ подъ тѣнью и достигаетъ до $1\frac{1}{2}$ ф. высоты; цветки голубые. *Ф. луговая*, *V. pratensis*. Koch., на влажныхъ лугахъ съ блѣдно-голубыми цветками, ниже предыдущей; *Ф. прудовая*, *V. stagnina* Kit., совершенно голая съ блѣдно-лиловыми цветками. Всѣ эти формы встрѣчаются у насъ нерѣдко на соотвѣтственныхъ мѣсторожденіяхъ, цветутъ въ маѣ и начальѣ лѣта и послѣдняя даже до поздней осени. *Ф. трехцветная*, *V. tricolor* L. Самое обыкновенное растеніе повсюду, на поляхъ, перелогахъ, по опушкамъ лѣсныхъ, въ садахъ и огородахъ, легко отличается отъ всѣхъ другихъ фіалокъ по большими листовидными прицвѣтниками, глубоко-раздѣленными на линейныя доли. Растеніе б. ч. голое съ развѣтвленнымъ стеблемъ и продолговатыми рѣдко-зубчатыми листьями, цветки б. ч. окрашены въ три цвета: желтый, голубой и лиловый, безъ запаха. Отъ этого вида, широко распространеннаго по всему земному шару, происходятъ всѣ наши садовые фіалки, называемыя обыкновенно „Анютиними глазками“. Садовая культура произвела замѣтѣнныя разновидности этого легко измѣ-

няющагося растенія, разновидности отличаюшіеся величиною цвѣтковъ и необыкновеннымъ разнообразіемъ оттѣнковъ. Даже въ дикомъ состояніи измѣнчивость эта ясно обнаруживается, смотря по качеству почвы и мѣстонахожденію. На тощихъ супесчаныхъ почвахъ мы встрѣчаемъ однолѣтнія разновидности съ крошечными желтыми цвѣтками, на болѣе плодородныхъ суглинкахъ вѣнчики крупнѣ и лиловый цвѣтъ преобладаетъ. Цвѣтутъ онѣ начиная съ весны все лѣто до глубокой осени и даже нѣкоторыя культурныя многолѣтнія формы легко выдерживаютъ зиму. Трава лекарственна, на вкусъ приторна и немного острая, но теперь рѣдко употребляется. *Herba jaccae s. Violae triwloris.*

Сем. 9-е. РОСЯНКОВЫЯ. *Droseraceae.*

Растеніца эти получили большую извѣстность съ тѣхъ поръ (1876 г.), когда знаменитому Ч. Дарвину удалось доказать, что онѣ листьями своими, снабженными особаго рода желѣзками, могутъ ловить насѣкомыхъ и питаются ими соками, слѣдовательно — животною пищею, — фактъ до того времени совершенно неизвѣстный и почти невѣроятный. Однакожъ дальнѣйшія наблюденія многихъ ученыхъ вполнѣ подтвердили это и теперь, кроме росянокъ, извѣстно еще нѣсколько растеній, обладающихъ этимъ свойствомъ.

Росянка, *Drosera*, L. Маленькая растеніца съ крошечными бѣлыми цвѣтками изъ 5 чашелистиковъ, 5 лепестковъ и 5 тычинокъ; плодникъ съ 3-мя вильчатыми рыльцами. Цвѣтки въ одностороннихъ рѣдкихъ гроздахъ. Листья густо усажены особыми желѣзистыми волосками, которые Дарвинъ назвалъ „щупальцами“, такъ какъ они подвижны. Щупальцы состоятъ изъ тонкой красноватой ножки и шаровидной желѣзки на верху, выдѣляющей прозрачную, сильно-блестящую, густую и липкую жидкость въ видѣ капельки росы. Лишь только насѣкомое сядетъ на листъ, оно прилипаетъ и сейчасъ же сосѣдніе щупальцы наклоняются надъ нимъ и удерживаютъ его. Чѣмъ больше насѣкомое бѣется, тѣмъ больше отдаленныхъ щупальцевъ склоняются къ нему и липкимъ сокомъ своимъ покрываютъ все тѣло, такъ что бѣдное животное вскорѣ погибаетъ. Щупальцы однакожъ удерживаютъ его до тѣхъ поръ, покамѣстъ посредствомъ сока, имѣющаго свойство растворять мягкия части тѣла, не высосутъ его, такъ что спустя нѣкоторое время отъ насѣкомаго остаются только одни твердые вѣнчаніе покровы; тогда щупальцы снова выпрямляются, а оставшійся сухой остовъ уносится вѣтромъ. — У насъ 2 вида этого рода. *P. круглолистная*, *D. rotundifolia* L., съ округленною пластинкою и длинными черешками листьевъ, прилегающими къ землѣ и образующими розетку, при основаніи стеблей и *P. длиннолистная*, *D. longifolia*, L., съ косо вверхъ стоящими, лопатчатыми, съуживающимися къ основанію листьями. У послѣдней грозды короче листьевъ, у первой, напротивъ, вдвое длиннѣе. Оба вида растутъ на открытыхъ, мокрыхъ,

преимущественно торфянистыхъ и мшистыхъ мѣстахъ. Найти ихъ и замѣтить въ травѣ и мхахъ довольно трудно, но отличить отъ другихъ растеній очень легко по листьямъ, усѣяннымъ даже въ сухое время блестящими капельками жидкости, какъ бы росою. Оба вида изрѣдка встрѣчаются и въ окрестностяхъ Харькова: Малая Даниловка, по мокрымъ берегамъ Лопани, с. Гавриловка, въ торфянистыхъ котловинахъ окрестныхъ возвышеностей, за р. Удами.

Сем. 10-е. Истодовыя, Polygaleae.

Изъ этого семейства только одинъ родъ

Истодъ, *Polygala* L., имѣеть у насъ представителями нѣсколько небольшихъ многолѣтнихъ травянистыхъ растеній, отличающихся своеобразнымъ устройствомъ цвѣтка. Изъ нихъ самый обыкновенный, встрѣчающійся повсюду на лугахъ, травянистыхъ мѣстахъ и въ кустарникахъ *И. хохлатый*, *P. comosa*, Schkr., имѣеть блѣдно-шурпуровые цвѣтки, образующіе густые грозды на верхней части тонкихъ, восходящихъ стеблей; листья цѣльные, нижніе продолговатые, верхніе линейные. Цвѣтки состоять изъ неопадающей чашечки, изъ 5 чашелистиковъ, изъ коихъ два внутренніе окрашенные, называемые „крыльями“, больше и сѣтчато-нервные, вѣнчикъ изъ 3 лепестковъ, нижній, въ видѣ лодочки съ бахромчатымъ краемъ, сростается съ тычинками расположеными въ два пучка, въ каждомъ пучкѣ по 4 пыльника. Узкіе прицвѣтнички на верхушкѣ грозда выдаются надъ цвѣточными почками, образуя какъ бы хохолокъ, замѣтный впрочемъ только на близкомъ разстояніи.—Другіе виды, встрѣчающіеся у насъ гораздо рѣже, весьма сходны съ этимъ и отличаются только по величинѣ цвѣтковъ, окраскѣ ихъ и мѣстонахожденію. *И. большой*, *P. maior* L., выше ростомъ предыдущаго, имѣеть цвѣтки крупнѣе, темно-пурпуровые и грозды рѣже, растетъ по сухимъ лугамъ и по лѣснымъ опушкамъ.—*И. сибирскій*, *P. sibirica* L., растущій по мергелистымъ откосамъ овраговъ, имѣеть цвѣтки зеленоватые. Всѣ эти растенія содержатъ въ корневищахъ и стебляхъ горькое начало, но несмотря на то охотно поѣдаются рог. скотомъ и овцами и служать имъ, вѣроятно, возбуждающею приправою къ корму.—*И. горкій*, *P. amara* L. не растущій у насъ, но первѣдкій въ Полтавской губер. и западнѣе, употребляется въ аптекахъ для сборовъ, подъ названіемъ: *Herba polygalae amarae*.

Семейство 11-е. Гвоздичныя. Silenae.

Къ этому семейству принадлежать травянистые растенія, средняго роста, отъ 1 до 2 ф. высоты, съ утолщенными узлами, на которыхъ супротивно расположены узкие цѣльнокрайніе листья. Чашечка трубчатая съ 5—6-ю зубчиками, остающаяся. Лепестковъ 5, съ отгибомъ (платинкою) и длиннымъ ноготкомъ. Тычинокъ 10. Завязь одногнѣздная,

многосемянная, съ центральнымъ стъмяносцемъ и 2, 3 или 5-ю столбиками. Плодъ б. ч. коробочка, раскрывающаяся на верху 4, 5, 6—10-ю зубчиками; рѣдко—ягода.—Всѣ здѣсь принадлежащія растенія не содержать острыхъ, ни ядовитыхъ веществъ; въ медицинѣ почти не употребляются, но доставляютъ домашнимъ животнымъ хотя не обильный, но здоровый и всегда вкусный кормъ, поэтому с. хозяинъ охотно видѣтъ ихъ на поляхъ и лугахъ. Нѣкоторыя разводятся въ садахъ, какъ украшающія растенія. При опредѣленіи родовъ необходимо обращать вниманіе на число столбиковъ.

Гипсолябка, *Gypsophila* L. Цвѣтки малые; чашечки съ 5 зубчиками, лепестковъ 5, постепенно суживающихся къ основанию; столбиковъ 2; коробочка раскрывающаяся 4-мя зубчиками. — Два вида этого рода принадлежать у насъ къ обыкновеннымъ растеніямъ. *G. полевая*, *G. muralis* L., растетъ у насъ вездѣ на пастищахъ, поляхъ и между хлѣбомъ. Маленькое, однолѣтнее растеніе, съ тонкимъ сильно развѣтвленнымъ стеблемъ, линейными листьями и крошечными блѣдо-розовыми цвѣтками, на лепесткахъ которыхъ замѣты темно-пурпуровые жилки.—*G. метельчатая*, *G. paniculata* L. Растеніе крупное, сизо-зеленое, голое, отъ половины стебля сильно-развѣтвленное съ маленькими блѣдыми цвѣтками, растетъ на степяхъ, перелогахъ и по межамъ между хлѣбами. Сильные осенне вѣтры вырываютъ ее часто съ корнемъ и перекатываютъ по стели на далекое растояніе. Оттого и народное название „перекатиполе“.

Гвоздика, *Dianthus*, L. Цвѣтки довольно крупные. Чашечка 5-зубчатая, снизу окружена нѣсколькими чешуйками; лепестки съ горизонтальнымъ отгибомъ (пластинкою) и вертикальнымъ, линейнымъ поготкомъ. Тычинокъ 10, столбиковъ 2. Коробочка одногнѣздна, 4-створчатая.—Полевая гвоздика такъ сходны по строенію цвѣтка съ садовыми, что ихъ безъ труда можно узнать съ первого взгляда; за то опредѣленіе видовъ затруднительно, такъ какъ нѣкоторыя формы значительно измѣняются какъ отъ мѣстонахожденія, такъ и вслѣдствіе гибридациіи. При опредѣленіи нужно преимущественно обращать вниманіе на форму чешуекъ и прицвѣтниковъ окружающихъ чашечку и на общий видъ растенія (*habitus*), что легче всего удается на живыхъ растеніяхъ. Изъ 15 видовъ свойственныхъ нашей флорѣ только слѣдующіе встрѣчаются чаще. А) Гвоздики съ одиночными цвѣтками, расположеными въ углахъ вѣтокъ или на верхушкахъ. *G. травяная*, *D. deltoides* L. Растетъ на сухихъ травянистыхъ мѣстахъ, имѣть стебли тонкие, прилегающіе, вильчато-развѣтвленные листья линейные; цвѣтки небольшіе, чешуйки чашечки зеленые, съ остриемъ не доходящимъ до половины чашечки; лепестки красные, узкіе, не прикасающіеся другъ къ другу.—*G. полевая*, *D. campestris* M. B., принадлежащій къ обыкновеннымъ и встрѣчается какъ на поляхъ и перелогахъ, такъ и на степяхъ. Стебель съ основанія вѣтвистый; листья узко-линейные; цвѣтки крупные, одиночные, по 4 чешуйки при основаніи чашечки, съзывающіе въ острѣ не достигающіе зубцовъ чашечки;

пластинки лепестковъ красныя, соприкасающіеся, съ темными пятнами, снизу зеленоватыя. Измѣняется значительно, смотря по мѣстонахожденію.—*Г. лѣсная*, *D. seguieri*, *Vill.* Видъ еще болѣе измѣнчивый, чѣмъ предыдущая. Стебель восходящій или прямой, иногда развѣтвленный; листья линейно-ланцетные; цвѣтки красные съ темно-пурпурзовымъ кольцомъ въ горлушки, расположены или пучкомъ на верхушкѣ стебля, или по 2 по 3 на концахъ вѣтокъ; чешуйки зеленые съ короткою остью. Растетъ какъ на открытыхъ мѣстахъ, такъ и на прогалинахъ и опушкахъ лѣсныхъ, а нерѣдко и на лугахъ.—В) Гвоздики съ цвѣтками скученными въ пучки на верхушкѣ стеблей: *Г. монашеская*, *D. carthusianorum*, *L.* Довольно обыкновенная на песчаныхъ почвахъ, въ борахъ. Стебель и линейные листья зеленые, голые; цвѣтки почти сидячіе въ пучкахъ отъ 6 до 7, лепестки кирпично-красные; чешуйки и прицвѣтники сухіе, кожистые красно-бурые и этимъ признакомъ легко отличается отъ слѣдующаго вида. Въ Западной Европѣ разводится въ садахъ и названная Линнеемъ вѣроятно потому, что картезіанскіе монахи первые стали воздѣлывать ее въ садахъ.—*Г. юловчатая*, *D. capitatus*, *D.C.*, встрѣчается тоже довольно часто на степяхъ и сухихъ лугахъ. Она отличается отъ предыдущей, съ которой по общему виду очень сходна, сизо-зеленымъ цвѣтомъ стеблей и листьевъ, широко-линейными листьями, блѣдными кожистыми чешуйками, внезапно съуживающимися въ остріе, достигающее до зубцовъ чашечки.—*Г. пышная*, *D. superbus*, *L.*, вполнѣ заслуживаетъ свое название за красоту цвѣтовъ. Она растетъ только на сырыхъ лугахъ и легко распознается по крупнымъ блѣдно розовымъ цвѣткамъ, у коихъ лепестки перисто-раздѣлены на линейные долики въ видѣ бахромы. Встрѣчается у насъ однако довольно рѣдко.

Садовая гвоздика принадлежать у насъ къ 3 видамъ. Самая обыкновенная и давно находящаяся въ культурѣ *Г. бородчатая*, *D. barbatus*, *L.*, происходит изъ Тироля, встрѣчается ли у насъ въ дикомъ видѣ,—это решить трудно, но разводится повсюду, даже въ крестьянскихъ палисадникахъ. Отлично переноситъ наши суровыя зимы. Такъ называемая „голландская гвоздика“ принадлежать къ виду *D. caryophyllus* *L.*, а въ послѣднее время появились и „китайская“ *D. sinensis*. Послѣдние два вида представляютъ въ культурѣ много разновидностей, отличающихся весьма красивыми махровыми цвѣтками со множествомъ оттенковъ красокъ отъ блѣдно-розовыхъ до темно-пурпуровыхъ, но чувствительны къ холоду и не выносятъ зимы.

Мыльнянка. *Saponaria*, *L.* Чашечка безъ чешуекъ внизу, столбикъ 2.—Два вида этого рода принадлежать у насъ къ обыкновеннымъ. *M. лекарственная*, *S. officinalis* *L.* Растеніе крупное до $2\frac{1}{2}$ футовъ высоты съ широко-ланцетными, 3-нервными, сидячими листьями и блѣдно-розовыми, чаще бѣлыми крупными цвѣтками. Встрѣчается часто по берегамъ рекъ, въ садахъ и огородахъ, какъ сорное растеніе, многолѣтнее. Содержитъ въ корнѣ и листьяхъ „сапонинъ“ разрѣщающее средство и поэтому корень употребляется въ аптекахъ (*Radix*

saponariae). Отваръ корня взболтанный пѣнится какъ мыльная вода и можетъ быть употребленъ для стирки бѣлъя и выведенія жирныхъ пятенъ на сукнѣ; рекомендуютъ и для мытья овечьей шерсти.—*M. полевая*, *S. vaccaria* L., называемая въ народѣ „стоголосникомъ“, ниже ростомъ предыдущей, имѣть листья ланцетные, расширенные и сросшиеся при основаніи, чашечки раздутыя съ 5 зелеными жилками и цветки съ малымъ розовымъ вѣнчикомъ. Растетъ на пашняхъ и между хлѣбомъ, встрѣчается часто. Оба вида цветутъ съ лѣта до поздней осени. Послѣднюю скотъ поѣдаетъ охотно и полагаютъ, что кормъ такой увеличиваетъ удои молока у коровъ.

Силены, *Silene* L (Смолевка). Силены по наружности мало имѣютъ сходства съ гвоздиками. Цветки у нихъ бѣлые или зеленоватые, чашечки безъ чешуекъ внизу и пестикъ съ 3-мя столбиками. Вѣнчикъ изъ 5 лепестковъ часто бываетъ снабженъ привѣнчикомъ. Коробочка 6-створчатая. Изъ 11-ти видовъ, свойственныхъ нашей флорѣ, слѣдующіе принадлежать къ обыкновеннымъ: *C. пузырьчатая*, *S. inflata*, Smith. (*Cucubalus Behen* L.), называемая въ народѣ „щелкунцомъ“, растетъ на поляхъ, по опушкамъ лѣснымъ и около дорогъ. Растеніе до 2 ф. высоты, голое, листья продолговато-ланцетные, почти сидячіе; цветки на верхушкѣ стеблей въ цимозномъ соцвѣтіи, крупные съ бѣлымъ вѣнчикомъ. Легко узнается по голымъ перепончатымъ, сѣтчато-нервнымъ чашечкамъ, раздутымъ во время созреванія плодовъ въ видѣ пузыря. Это растеніе съ древнихъ временъ считалось цѣлебнымъ средствомъ противъ некоторыхъ болѣзней, но въ настоящее время совершенно вышло изъ употребленія.—*C. липкая*, *S. viscosa*, Pers., по росту и соцвѣтію нѣсколько похожа на предыдущую, но легко отличается отъ нее тѣмъ, что стебли, листья и чашечка ея покрыты короткими желѣзистыми волосками, выдѣляющими липкую жидкость. Цветкидов. крупные бѣлые, чашечка цилиндрическая не раздута; встрѣчаетсячасто на степныхъ перелогахъ и цвететъ все лѣто.—*C. околышевая*, *S. otites*, Smith., растетъ по супескамъ и черноземнымъ перелогамъ, иногда въ изобилии. Она имѣть стебли прямые, твердые, вѣтвистые; листья слегка пушистые, лопатчатые, съуживающіеся въ черешокъ; цветки малые, многочисленные, въ маленькихъ гроздахъ, расположенныхъ окольшами на верхней части стебля и вѣтокъ; лепестки зеленовато-бѣлые съ цѣльнымъ отгибомъ. Видъ этотъ измѣняется и представляетъ двѣ разновидности, столь же часто встрѣчающіеся, какъ и главная форма и принимаемая некоторыми авторами за отдѣльные виды: *C. мѣлкоцвѣтная*, *S. parviflora*, Ehrh. и *C. развѣсистая*, *S. effusa*, Otth. (*volgensis*, Smith).—*C. поникшая*, *S. nutans* L., растетъ вездѣ по чернымъ лѣсамъ, и особенно на срубахъ и на лѣсныхъ прогалинахъ, а также и въ садахъ; имѣть соцвѣтіе въ видѣ сжатой, односторонней метелки, цветки довольно крупные, повисшіе, бѣлые и немножко душистые, но раскрывающіеся только по утру и вечеромъ; нижние листья продолговатые, съуживающіеся въ черешокъ, верхніе ланцетные.—*C. зеленоватая*, *S. chlorantha*, Ehrh., растетъ по холмамъ, сухимъ степнымъ косогорамъ и надъ обрывами. Растеніе совер-

шенно голое, стебель почти безлистный; цветки въ сжатыхъ одностороннихъ метелкахъ желтовато-зеленые, цвететъ летомъ.—*C. татарская*, *tatarica*, Pers., встрѣчается у насъ рѣже предыдущихъ, на супесчаныхъ лугахъ, по берегамъ рекъ, легко отличается отъ другихъ по густо-облистеннымъ стеблямъ и зеленоватымъ повисшимъ цветкамъ, образующимъ длинную одностороннюю метелку.—*C. ягодная*, *S. baccaifera*, Roth. (*Cucubalus bacciferus* L.), значительно отличается отъ предыдущихъ плодами въ видѣ черной блестящей ягоды, окруженной вздутою чашечкою. Встрѣчается только въ тѣнистыхъ местахъ, въ лѣсахъ между кустарниками и въ садахъ возлѣ заборовъ. Имѣеть стебель мягкий, цветущійся, листья яйцевидные или продолговатые, заостренные, вѣнчики зеленовато-блѣлые, лепестки глубоко-разщепленные съ двумя зубчиками при основаніи отгиба.

Куколица, *Melandryum*. Röhling. По наружности нѣсколько сходна съ силенами, но пестикъ снабженъ 5 столбиками. *K. луговая*, *M. pratense*, Röhl. (*Lychnis vespertina*, Sibth.). Крупное однолѣтнее растеніе, покрытое короткими желѣзистыми волосками, отчего немногого липкое; листья яйцевидные до удлиненныхъ, заостренные, съуживающіеся къ основанию; цветки двудомные, большие, блѣлые, раскрывающіеся только вечеромъ и немного душистые. Встрѣчается у насъ часто на сухихъ лугахъ и поляхъ, въ кустарникахъ и садахъ.—*K. смолистая*, *M. sylvestre*, Röhl. (*Lychnis diurna*, Sibth.), очень сходная съ предыдущею, встрѣчается у насъ гораздо рѣже на низменныхъ местахъ и по берегамъ рекъ, имѣеть цветки тоже двудомные, но пурпуровые, раскрывающіеся днемъ и безъ запаха. Оба вида доставляютъ хороший, сочный кормъ.

Дрема, *Lychnis*. L. Чашечка перепончатая съ 10 перепончатыми первами и 5-ю зубчиками, лепестки съ ноготками, столбиковъ 5.—*D. смолистая*, *L. viscaria* L., называемая въ народѣ „смолкою“, растетъ въ изобилии на супесчаныхъ лугахъ и легко узнается по голымъ стеблямъ, покрытымъ подъ узлами красно-буровою смолою; прикорневыхъ листьевъ много, они лопатчаты, съуживающіеся въ черешокъ; цветки пурпуровые, отгибъ лепестковъ на верху выемчатый.—*D. кукушкина*, *L. Flos cicuti*, L., на свѣжихъ, немного торфянистыхъ лугахъ встречается довольно часто и легко отличается отъ предыдущей, съ которой имѣеть много сходства цветками, у коихъ отгибъ лепестковъ раздѣленъ на 4 узкия доли; междуузлія безъ смолистыхъ выдѣлений; листья ланцетные.—*D. восточная*, *L. chalcedonica* L., называется въ народѣ „Горитвою, Зирочки, Дѣвичьей красою“, мнѣ въ дикомъ состояніи не попадалась и вѣроятно встречается рѣдко, по издавна разводится въ крестьянскихъ палисадникахъ, какъ украшающее растеніе. Она имѣеть стебли косматые, листья эліптические и красивые ярко-пунцовыя цветки собранные густымъ пучкомъ на верхушкѣ стебля.

Куколь, *Agrostema*. L. Всѣмъ съ хозяевами знакомое растеніе *Куколь обыкновенный*, *A. githago*, L., встречается преимуществен-

но въ посѣвахъ ржи. Его легко узнать по сѣроватымъ отъ прижатыхъ волосковъ стеблямъ, линейнымъ листьямъ и довольно красивымъ, крупными розовыми цветками, между лепестками которыхъ торчатъ длинные, зеленые зубцы чашечки. Какъ сорное однолѣтнее растеніе онъ самъ по себѣ не причиняетъ особаго вреда посѣвамъ, но крупныя, угловатыя, чёрныя сѣмена его содержать ядовитое вещество и смолоты въ большомъ количествѣ съ зернами ржи придаютъ муку вредныя свойства. Такое зерно необходимо очищать, что впрочемъ теперь достигается легко, посредствомъ усовершенствованныхъ чистилокъ.

Семейство 12-е. Мокричные. Alsineae.

Травы съ болѣе или менѣе нѣжными, или тугими стеблями и супротивными, цѣльнокрайними листьями. Чашечка 4—5 листная, остающаяся; лепестковъ 4—5, съ короткимъ ноготкомъ или сидячихъ; тычинокъ 10 или менѣше; плодникъ одногнѣздный, многосѣмянный съ 3-мя столбиками; плодъ—коробочка, разверзающаяся 3—10-ю зубцами, или створками.—При опредѣленіи родовъ необходимо обращать особое вниманіе на число створокъ и зубчиковъ коробочки.

Ишанка, *Sagina*, L. Маленькая стелющіяся по землѣ травки съ шиловидными листьями и крошечными цветками. У насъ только 2 вида. *M. стелющаѧся*, *S. procumbens* L. Стебель развѣтвленный, до 2 д. длины, цветки бѣлые, на длинныхъ, тонкихъ цветоножкахъ; чашелистиковъ, лепестковъ и тычинокъ по 4. Встрѣчается дов. часто на супесчаныхъ влажныхъ почвахъ, по берегамъ рекъ.—*M. узловатая*, *S. nodosa* L., по росту и наружности сходна съ предыдущею, но отличается отъ нея пятернымъ числомъ частей цветка. Растетъ на влажныхъ, торфяныхъ мѣстахъ, встрѣчается рѣже.

Песчанка, *Arenaria*, L. Несольшія, прямо-стоячія, голыя или слегка пушистыя растенія, съ бѣлыми цветками. Чашелистиковъ и цѣльнокрайнихъ лепестковъ по 5-ти; тычинокъ 10, рѣдко менѣше; столбиковъ 3.—Къ этому роду относится у насъ 8 видовъ. Изъ нихъ только 2 встрѣчаются часто. *P. злаколистная*, *A. draminifolia*, Schrad., растетъ по лѣснымъ прогалинамъ, борамъ и степямъ; имѣть листья линейные, голые. *P. чебрецолистная*, *A. serpyllifolia*, L., съ листьями овальными, сидячими. Растетъ по полямъ и около лѣсовъ.

Звѣздчатка, *Stellaria* L. Виды этого рода легко узнаются по бѣлымъ цветкамъ, имѣющимъ видъ звѣздочки изъ 5 лепестковъ, глубоко раздѣленныхъ на 2 узкія доли; чашечка 5—разщепленная, тычинокъ 10, рѣдко менѣше, столбиковъ 3, коробочка съ 6 зубчиками. Изъ 7 видовъ, растущихъ въ предѣлахъ описываемой мѣстности, слѣдующіе 3 принадлежать у насъ къ самымъ обыкновеннымъ: *Z. средняя*, *S. media*, Vill., называется въ народѣ „мокрицею“, растетъ во множествѣ въ садахъ и огородахъ, на грядкахъ какъ сорнякъ. Однолѣтнее, нѣжное растеніе съ цилиндрическими, приподнимающимися стеблями; листья голые, серцевидно-яйцевидные, простира-

ные; цветки на верхушках стеблей в цимозном соцветии, при солнечном освещении раскрываются в виде 10 лучевой звездочки, лепестки почти равны чашечке. Цветет с ранней весны до поздней осени. Травка, имеющая мягкительные свойства, охотно поедается домашнею птицею и птичками, а потому ее дают канарейкамъ. Хороший кормъ и для дом. животныхъ. — *З. обыкновенная*, *S. holoscea*, L. Стебель выходящий, 4—гранный, голый; листья широколанцетные, длинико-заостренные, тугие; цветки крупные, лепестки белые, вдвое длиннее чашечки, до половины разщепленные. Растет повсюду в садахъ, рощахъ и лесахъ, всегда подъ тенью, цветет в мае до июня. — *З. травянистая*, *S. graminea*, L., имеет стебли тонкие, приподнимающиеся до 2 ф. и длиннее, листья ланцетно-линейные, сидячие, цветки маленкие в цимозном раскинутом соцветии, венчикъ едва длиннее чашечки, лепестки глубоко-раздѣльные. Повсюду на лугахъ, по опушкамъ леснымъ и на травянистыхъ местахъ съ легкимъ, супесчаною почвою обыкновенное. Видоизменение сильно развитленное и съ меньшими цветками, называемое „пьяно травою“ или „конскимъ вехомъ“ по замечанию проф. Черняева (Конспектъ, стр. 11) въ свѣжемъ или высушеномъ виде действуетъ какъ сильный ядъ на лошадей, оттого и названо имъ „hippocronta“ (убивающая лошадей). Но предположение это, основанное вѣроятно на народной молвѣ, требуетъ доказательныхъ опытовъ для подтверждения; тѣмъ болѣе, что главная форма не содержитъ никакихъ острыхъ началь и, какъ показываетъ ежедневный опытъ, примѣщанная даже въ значительномъ количествѣ къ сѣму, совершенно безредна.

Ясколка, *Cerastium*, L. Однолѣтня или многолѣтня травы отъ основания развитленные съ белыми цветками въ оконечныхъ цимозныхъ гроздахъ. Чашелистиковъ 5, лепестковъ 5, б. ч. двураздѣльныхъ, тычинокъ 10, или по недоростанію меньше, столбиковъ 5, коробочка раскрывающаяся на верху 10-ю зубчиками. — *Я. обыкновенная*, *C. vulgatum*, L. Нѣжное, отъ основания сильно-развѣтленное желѣзисто-пушистое растеніе съ приподнимающимися стеблями, до 1 ф. длины, подъ конецъ осени образующе рыхлый дернъ. Основные листья малые, черезчатые, стеблевые сидячие отъ яйцевидныхъ до продолговатыхъ, чашелистики немнога косматые съ перепончатыми краями; лепестки б. ч. короче чашелистиковъ, тычинокъ иногда только 5, коробочка при созрѣваніи вдвое длиннее чашечки, цилиндрическая, немнога изогнутая. На пустыряхъ и воздѣлываемыхъ местахъ, на сухихъ и сырыхъ почвахъ и въ лесахъ обыкновенное. Измѣняется смотря по местонахожденію; такими разновидностями теперь считаются: *Я. липкая*, *C. viscosum*, L. и *Я. пятитычинковая*, *C. semidecandrum*, L. Всѣ эти формы цветутъ съ весны до поздней осени. — *Я. полевая*, *C. arvense*, L., встречается часто на межахъ полей и вообще на открытыхъ травянистыхъ местахъ, ниже ростомъ предыдущей, имеетъ листья ланцетные, цветки совсѣмъ большие, белые, на короткихъ цветоножкахъ, лепестки вдвое длиннее чашелистиковъ. *Я. водяная*, *C. aquaticum*, L. (*Malachium aquat. Tr.*),

растущая на сырыхъ мѣстахъ, по берегамъ стоячихъ водъ и на влажныхъ лѣсныхъ склонахъ, замѣтно отличается отъ предыдущихъ широкими стеблевыми листьями серцеридными, сидячими и покрытыми короткими желѣзистыми волосками; стебли слабые, часто до 2 ф. длины, приподнимающиеся; цвѣтки малые, бѣлые, лепестки глубоко-двураздѣльные на половину выше чашечки. Коробочка раскрывается 5 створками цѣльными или только на верхушкѣ разщепленными на 2 зубчика.

Семейство 13-е. Повоиничковыя. Elatineae.

Маленькия, однолѣтнія травки съ супротивными, или окольшевыми листьями и правильными пазушными, бѣлыми цвѣтками. Растутъ на болотахъ и въ стоячихъ водахъ. Единственный родъ *Повоиничекъ*, *Elatine L.*, имѣеть у насъ 2 вида: *П. мокричный*, *E. alsinastrum L.*, съ окольшевыми листьями и *П. перѣчный*, *E. hydropiper L.*, съ лопатчатыми, супротивными листьями. Оба вида встрѣчаются рѣдко.

Семейство 14-е. Леновыя. Lineae.

Травянистые растенія съ цѣльными, сидячими листьями и правильными цвѣтками содержать въ стебляхъ волокно пригодное для техническаго употребленія, въ сѣменахъ—жирное масло и слизистыя вещества, а иногда и смолистое начало, оказывающее слабительное дѣйствіе. 2 рода, изъ коихъ часто встречаются только виды льна.

Ленъ, *Linum L.* Цвѣтки правильные; цѣльныхъ чашелистиковъ, лепестковъ, тычинокъ и столбиковъ по 5-ти; коробочка 10-тиѣздная. Всѣ дикорастущіе виды льна легко узнаются по общему сходству ихъ съ обыкновеннымъ посѣвнымъ льномъ.—*Л. посѣвный*, *L. usitatissimum L.*, однолѣтний, стебли одиночные, листья ланцетныя до линейныхъ, трехнервные, чашелистики голые, лепестки голубые, едва соприкасающіеся своими краями.—Драгоценное растеніе, съ древнейшихъ временъ находящееся въ культурѣ, отечество котораго до сихъ поръ съ достовѣрностью неизвѣстно, но какъ полагаютъ—окрестности Кавказа. Въ настоящее время во многихъ странахъ умѣренного пояса ленъ воздѣлывается въ обширныхъ размѣрахъ на поляхъ, преимущественно для волокна, а у насъ въ степныхъ губерніяхъ и для сѣянья, содержащихъ отличного качества жирное масло, пригодное какъ для приправы кушаньевъ, такъ и для техническаго употребленія. „Линяная макуха“, т. е. выжимки, остающіеся отъ приготовленія масла, составляетъ вкусный и здоровый приdatочный кормъ для домашнихъ животныхъ, которыхъ ёдятъ ее охотно. Напротивъ, въ зеленомъ видѣ линяное растеніе вредно дѣйствуетъ на организмъ животныхъ и они инстинктивно не трогаютъ его. Точно также воды, въ которыхъ вымачиваются ленъ становятся вредными и опасными для водопоя дом. животныхъ, заражаютъ воздухъ зловредными міазмами и часто отравляютъ рыбу въ рѣкахъ. Поэтому въ гигіеническомъ отношеніи мочка льна въ теку-

тихъ водахъ, какъ это у насъ постоянно практикуется въ деревняхъ, не должна быть дозволяема, а для этой цѣли должны быть выкопаны возлѣ рѣкъ и прудовъ особые водоемы, изъ которыхъ вода выливалась бы по временамъ на ровныя пространства, гдѣ всасываясь въ почву и испаряясь подъ влажнѣемъ воздуха, теряла бы вскорѣ свои вредныя свойства—Изъ дикорастущихъ видовъ льна мы отмѣтимъ слѣдующіе: *L. многолѣтній*, *L. regenne* L., имѣть подземное корневище, пускающее ежегодно по нѣсколько стеблей, листья ланцетные, 3—5 первыя, чашелистики голые, лепестки голубые, заходящіе краями одинъ на другой, цвѣтоноски послѣ отцвѣтенія склоняются внизъ. Растеть на степяхъ, встрѣчается довольно часто, цвѣтеть лѣтомъ. За границею были сдѣланы опыты разведенія этого льна на поляхъ, но волокно его оказалось грубое.—*L. австрійскій*, *L. austriacum* L., близко сходный съ предыдущимъ, отличается отъ него цвѣтками, сидѣющими на горизонтальныхъ цвѣтоноскахъ.—*L. косматый*, *L. hirsutum* L., растеніе желѣзисто-косматое, имѣть стебли толстые, сильно-развѣтвленные, нижніе листья лопатчатые, верхніе элиптические, тупые; цвѣтки крупные, блѣдо-лиловые. Растеть на степяхъ, по обрывамъ овраговъ, а иногда и на лугахъ, встрѣчается довольно часто. Цвѣтеть все лѣто.—*L. жилковатый* *L. nervosum* W. K. Стебли тонкіе, голые; нижніе листья продолговатые, верхніе ланцетные съ 3—7 жилками, цвѣтки на короткихъ цвѣтоноскахъ голубые, почти вдвое меньше, чѣмъ у посѣвнаго льна. Встрѣчается на открытыхъ мѣстахъ и въ кустарникахъ довольно рѣдко.—*L. слабительный*, *L. catarthicum* L. имѣть стебли тонкіе и цвѣтки блѣлые. Отъ всѣхъ другихъ видовъ отличается листьями, расположеннымися супротивно. Однолѣтнее растеніе, встрѣчающееся довольно часто на лугахъ. Отварь травы имѣть горький вкусъ и сильное слабительное дѣйствіе. Употребляется крестьянами, подъ названіемъ „Кукушкина льна“ отъ запоя.—*L. желтый*, *L. flavum* L. Многолѣтнее растеніе, имѣть листья голые, нижніе лопатчатые, верхніе ланцетные и тѣ и другіе при основаніи снабжены двумя желѣзками; цвѣтки крупные желтые собраны пучкомъ на верхушкѣ стеблей. Встрѣчается дов. часто на степяхъ и на травянистыхъ склонахъ долинъ; цвѣтеть въ юнѣ.—Къ этому же виду нужно причислить и *A. украинскій* *L. usranicum* Czernw, растущій по всей Українѣ на мѣловыхъ кряжахъ. Онъ отличается немнogo отъ предыдущаго меньшими сѣриристо-желтыми цвѣтками и тѣмъ, что часто стебли и листья его бываютъ немнogo мохнаты.

Семейство 15-е Мальвовые. Malvaceae.

Травянистыя растенія съ очередными листьями и парными прилистниками. Чашечка двойная, внутренняя 5-раздѣльная, вѣнчиная 3-листная, трехъ-раздѣльная или много-раздѣльная. Вѣничекъ правильный, 5-лепестный, лепестки внизу сросшиеся съ тычинками. Тычинокъ много, сросшихся нитями въ одинъ пучекъ. Плодиковъ много, всѣ съ сво-

ими столбиками приростаютъ къ центральному плодоносцу (столбцу) и только при созреваніи плода распадаются на отдѣльные плодики (сѣмянки).—Большое семейство тропическихъ странъ, изъ коего только $\frac{1}{6}$ часть приходится на Европу. Виды содержать во всѣхъ частяхъ своихъ, а многогодѣтніе преимущественно въ корневищахъ и сѣменахъ, слизистыя вещества совмѣстно съ жирнымъ масломъ. Оттого и употребляются въ медицинѣ какъ мягчительныя, обволакивающія и утоляющія боли средства. Волокно стебель пригодно для выдѣлки грубыхъ тканей, а листья могутъ служить питательнымъ и вкуснымъ кормомъ для домашнихъ животныхъ. Нѣкоторые виды мальвовыхъ давно известны въ садовой культурѣ какъ украшающая видныя растенія. Слѣдующіе роды имѣютъ у насъ своихъ представителей.

Мальва, *Malva L.* (Рожа, Просвирникъ). Виѣшняя чайечка 3 листная, столбиковъ много. Плодъ при созреваніи распадается на отдѣльные односѣмянине членники.—**М. лѣсная**, *M. sylvestris L.* Стебли прямые или приподнимающіеся слегка-волосистые, листья округленные, 5—7 лопасные, съ неравномѣрными городчатыми лопастями; цвѣтки въ пазухахъ листьевъ по 2, или по нѣсколько; лепестки розовые, съ лиловыми жилками, на верхушкѣ выемчатые, въ нѣсколько разъ длиннѣе чашечки; плодики гладкіе сѣтчато-нервные. На поляхъ, при дорогахъ, возлѣ заборовъ, дов. рѣдко. Цвѣтетъ въ іюнѣ и вторично осенью. Листья и цвѣтки употребляются въ медицинѣ: *Flores Malvae vulgaris*.—**М. мауританская**, *M. mauritiana*, называемая также „Зинизивромъ“ разводится иногда въ садахъ. Она сходна съ предыдущею, но имѣеть цвѣтки темно-красные. Хотя и значится для южной Россіи, но въ дикомъ состояніи мнѣ въ здѣшнемъ краѣ никогда не попадалась.—**М. округлолистная**, *M. rotundifolia L.* (*M. borealis Wallm.*), имѣемая въ народѣ „просвирками, калачиками“, имѣетъ стебли стелющіеся, листья округлые, городчатые съ 5—7 не глубокими лопастями, цвѣтки малые въ пазухамъ листьевъ, вѣнчикъ едва-выдающійся изъ чашечки, блѣдно-розовый до бѣлаго, плодики морщинистые съ острыми краями. Одногодѣтніе растеніе на сорныхъ мѣстахъ, подъ заборами, въ садахъ и огородахъ, и на поляхъ обыкновенное. Цвѣтетъ отъ мая до осени. Въ медицинѣ употребляются листья: *Herba Malvae minoris*, снаружи, какъ мягчительное средство, а внутрь въ видѣ чая отъ золотухи.—**М. обыкновенная**, *M. vulgaris Fr.* (*M. neglecta*, *Wallr.*), которую б. ч. смѣшиваютъ съ предыдущею, таѣтъ какъ по стеблямъ и листьямъ она очень сходна съ нею, отличается однаждѣ болѣе крупными цвѣтками, у коихъ лепестки розовые, глубоко-выемчатые, на верхушкѣ, вдвое длиннѣе чашечки. Она встрѣчается въ нашемъ краѣ рѣже предыдущей по окраинамъ полей, на межахъ, а нерѣдко и кустарничкахъ. По-свойствамъ своимъ оба вида сходны и имѣютъ то же употребление.—**М. кудрявая**, *M. crispa L.* Растеніе дов. крупное, съ Востока, имѣетъ стебли толстые прямые, листья округлые съ волнисто-кудрявymi краями; цвѣтки небольшие, некрасивые въ пазухахъ листьевъ, пучками; вѣнчикъ бѣловатый едва выдающійся изъ чашечки. Развивается иногда въ садахъ, ради красивыхъ листьевъ.

Алтей, *Althea L.* Наружная чашечка 6—9 раздѣльная, доли узкия; столбики и плоды какъ у Мальвы. У насъ одинъ только видъ дикопроизрастающій *A. лекарственный*, *A. officinalis*. Многолѣтнее растеніе съ толстымъ корневищемъ, пускающимъ, ежегодно одинъ стебель, прямой, войлочно-мохнатый; листья съ обѣихъ сторонъ покрыты мягкимъ, густымъ, бархатнымъ пушкомъ, чѣмъ это растеніе замѣтно отличается отъ всѣхъ другихъ, нашей флоры. Листья черешчатые, сердцевидные или лайцевидные, нижніе 5-ти, верхніе 3—лопастные. Цвѣтки средней величины, на короткихъ цвѣтоноожкахъ, по нѣсколько въ пазухахъ листьевъ, и на верхушкѣ стебля скучены пучкомъ; лепестки блѣдо-розовые, вдвое длиннѣе чашечки.—Растетъ на влажныхъ лугахъ и по берегамъ рѣкъ, встрѣчаетсядов. часто. Съ глубокой древности извѣстно за свои цѣлебныя свойства. Листья и цвѣты (*Flores et herba altheae.*), а особенно корневище (алтейный корень) содержатъ слизистыя вещества и употребляются въ аптекахъ для приготовленія различныхъ препаратовъ мягчительныхъ и утоляющихъ боли. Оттого въ средней Германіи растеніе это въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ воздѣлывается въ дов. большихъ размѣрахъ на поляхъ. *A. садовый*, *A. rosea Cav.* (Садовая рожа, штокроза). Стебель прямой, жестко волосистый, листья 5—7 угольные или со столькими же лопастями; цвѣтки болѣшіе на короткихъ ножкахъ, одиночные или 2—3 въ пазухахъ листьевъ образуютъ длинное соцвѣтие на верхней части стебля. Цвѣтки весьма разнообразныхъ оттенковъ окраски отъ бѣлыхъ и палевыхъ чрезъ всѣ переходы красныхъ до темно-пурпуровыхъ. Въ послѣднее время появились маxровые необыкновенно красивыя разновидности.—Любимое украшающее растеніе, съ Востока. Цвѣтки, (*Flores Malvae arboreae s. hortensis.*), содержащіе много слизи, употребляются подобно цвѣткамъ алтея. Лепестки темно-пурпуровой разновидности служатъ безвредною окраскою для виноградныхъ винъ и поэтому въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ по Рейну воздѣлываются на поляхъ для этой цѣли.

Хатыма, *Lavatera*, *Tournef.*, отличается отъ мальвы только вѣнчицею 3—расщепленою, а не 3—листною, какъ у мальвы; въ прочихъ же частяхъ цвѣтка сходна съ послѣднею.—Единственный видъ. *X. тюрингенская*, *L. thuringiaca L.* Все растеніе немножко войлочно отъ прижатыхъ звѣздчатыхъ волосковъ; стебель прямой, 2—3 ф. высини; листья округлые, нижніе 5, верхніе 3 лопастные зубчатые; цвѣтки одиночные рѣдко по 2 въ пазухахъ листьевъ на длинныхъ цвѣтоноожкахъ; вѣнчики розовые, въ нѣсколько разъ длиннѣе чашечки; плодики голые—На лугахъ, поляхъ, по опушкамъ лѣсныхъ и въ садахъ дов. обыкновенное. Корневища, листья и цвѣтки въ свойствахъ своихъ сходны въ алтеемъ и имѣютъ подобное же примѣненіе. Много прекрасныхъ разновидностей разводится за границею, какъ садовая украшающая растенія.

Семейство 16-е. Липовыя. *Tiliaceae.*

Высокія деревья съ очередными листьями, опадающими прилистниками и правильными цвѣтками въ цимозномъ соцвѣтіи. Одинъ только родъ.

Лиша. *Tilia L.* Соцвѣтіе снабжено болѣшимъ, удлиненнымъ, блѣдно зеленымъ прицвѣтникомъ, до половины сросшимся съ цвѣтоножкою. Чашечка 5-раздѣльная, вѣнчикъ 5-лепестный, тычинокъ много, плодъ —орѣшекъ, отъ недоростанія внутреннихъ перегородокъ одногнѣздный. Лиша не образуетъ у насъ сплошныхъ насажденій, а встрѣчается разсѣянно по чернолѣсью въ смѣси съ другими древесными породами, или же разводится въ паркахъ и садахъ. По природѣ своей она не любить мокрыхъ и сырыхъ мѣстъ, а предпочитаетъ сухія, съ связною, суглинистою почвою. При благопріятныхъ условіяхъ липа растетъ быстро, достигаетъ 50 и даже 80 ф. высоты, до полутора аршина въ діаметрѣ и очень долговѣчна. Даже у насъ попадались прежде экземпляры 200 лѣтняго возраста, а теперь и столѣтняя липа —рѣдкость. Отличаютъ 2 вида, или быть можетъ двѣ разновидности липы, довольно сходныя между собою, произрастающія въ нашихъ лѣсахъ. Чаще однакожъ встрѣчается *L. обыкновенная* (мелколистная) *T. parvifolia Ehr.* Она имѣеть листья косо-серцевидные, заостренные, остропильчатые, съ обѣихъ сторонъ голые, снизу сѣровато зеленые; соцвѣтіе изъ 3 до 13 цвѣтковъ. —*L. крупнолистная*, *T. grandifolia Ehr.*, отличается отъ предыдущей нѣсколько большиими листьями такой же формы, но длинно-заостренными и съ нижней стороны покрытыми нѣжнымъ пушкомъ; соцвѣтіе только изъ 2—4 цвѣтковъ. Послѣдняя зацвѣтаетъ недѣлею или двумя позже; обѣ цвѣтутъ въ концѣ июня и въ юлѣ. Въ качествахъ же своихъ они почти совершенно сходны. Древесина липы мягка, но очень легка и однородна (безъ слоеvъ). Она обладаетъ способностью быстро сохнуть, не трескаясь и не коробясь и потому употребляется на различныя столярныя и токарныя издѣлія, особенно же пригодна для рѣзьбы и украшенія внутренности храмовъ. Для кустарного промысла лиша доставляетъ тоже превосходный материалъ для выѣлки деревянной посуды, мебели и т. п. Кромѣ того, изъ липы приготавливаютъ лубокъ, мочало, лыко и тѣмъ объясняется значительное истребленіе липы въ нашихъ лѣсахъ. Лѣсничие однакожъ не очень цѣнятъ липу, такъ какъ она занимаетъ мѣсто для другихъ болѣе цѣнныхъ твердыхъ породъ; какъ тощливо липа тоже не хороша, она не даетъ достаточно теплоты и истлѣваетъ скоро, но уголь получаемый изъ липы очень хорошъ для рисованія. Душистые цвѣтки липы даютъ превосходнаго качества взятоекъ для пчелъ и употребляются въ медицинѣ (*Flores Tiliae*). Въ народѣ липовый отваръ, имѣющій легкое потогонное свойство, употребляется отъ простуды.

Семейство 17-е. Звѣробойныя. Hypericineae.

Травы съ супротивными цѣльными листьями, б. ч. усѣянными прозрачными точками, замѣтными особенно противъ свѣта. Небольшое семейство, содержащее у насъ только одинъ родъ.

Звѣробой, *Hypericum L.* Листья супротивные, чашечка 5-листная, вѣнчикъ 5-лепестный, желтый; тычинокъ много, сросшихся ни-

тами въ 3 или пять пучковъ. Коробочка 3-гнѣздная. — Всѣ виды въ листьяхъ и цвѣткахъ содержатъ желтый и красный пигменты, эфирное масло и горькое эстрактивное начало, дѣйствующее тонически. Какъ кормъ для дом. животныхъ они не пригодны, скотъ поѣдаетъ ихъ только съ голоду; примѣщанные къ сѣну они твердыми стеблями ухудшаютъ его свойства.— Изъ шести видовъ, произрастающихъ въ предѣлахъ нашей мѣстности, чаще встрѣчаются слѣдующіе: *Z. обыкновенный*, *H. regforatum* L. Самое обыкновенное растеніе на сухихъ лугахъ, на легкихъ супесчаныхъ почвахъ, по окраинамъ полей, въ садахъ и огородахъ. Стебель 1—2 ф. прямой, съ двумя супротивными ребрышками сверху, листья продолговатые до линейныхъ, сидячіе, усѣянные прозрачными, а по краямъ черными точками. Цвѣтки на верхушкѣ стеблей собраны цимознымъ полузонтикомъ, дов. крупные, желтые, чашелистики съ голыми краями, лепестки вдвое длиннѣе чашелистиковъ. Цвѣтеть съ конца іюня (Иванъ-зелье) все лѣто. Трава употребляется въ аптекахъ для приготовленія варенаго масла (*Oleum hyperici costum*), дѣйствующаго противъ ревматизма. Водочная настойка на высушенныхъ цвѣткахъ звѣробоя, пріятнаго краснаго цвѣта, служить какъ желудочное, средство, а также употребляется отъ кашля и при отдышикѣ. Изъ травы его можно добывать красную краску.— *Z. красивый* *H. elegans*. Stephan. По общему виду очень сходенъ съ предыдущимъ, но ниже его ростомъ, имѣетъ стебли тоньше, листья серцевиднымъ основаніемъ объемлющіе стебель, продолговатые или ланцетные; чашелистики съ бахромчатыми краями. Послѣднимъ признакомъ легко отличается отъ предыдущаго, съ которымъ по свойствамъ своимъ совершенно сходенъ. На открытыхъ мѣстахъ, столь же часто какъ и первый.— *Z. пушистый*, *H. hirsutum* L., коего стебли и листья покрыты нѣжнымъ пушкомъ, растетъ преимущественно въ кустарникахъ и лѣсахъ, по прогалинамъ и опушкамъ. Онъ выше ростомъ обаихъ предыдущихъ, до $2\frac{1}{2}$ ф., имѣетъ листья эліптическіе, почти черешчатые, безъ прозрачныхъ точекъ, чашелистики снабжены желѣзистыми рѣсничками и цвѣтки крупнѣе. Видъ этотъ встрѣчается рѣже на указанныхъ выше мѣстностяхъ, но въ свойствахъ своихъ сходенъ съ предыдущими.

Семейство 18-е. Кленовые. Acerineae.

Деревья съ супротивными листьями и правильными цвѣтками. У насъ одинъ родъ.

Кленъ, *Acer*. L. Чашечка б. ч. 5-разщепленая, лепестковъ 5, тычинокъ б. ч. 8, иногда 10, свободныхъ. Цвѣтки двуполые, или только мужскіе; плодъ — крылатка (*samara*), состоящая изъ двухъ сросшихся плодиковъ, снабженныхъ каждымъ перепончатымъ, продолговатымъ крыльшкомъ, въ зрѣлости распадается. У насъ 3 вида этихъ деревьевъ, растущихъ въ рощахъ и черныхъ лѣсахъ и разводимыхъ въ паркахъ, садахъ и около жильевъ.— *K. обыкновенный*, *A. platonoides* L. Красивое по формѣ и листьямъ своимъ дерево, выше среднаго роста, въ лѣсахъ достигаетъ до 25 ар. высоты и отъ 10 до 12 вер. въ ди-

аметръ. Листья дланевидно 5—7-лопастные, съ длинно-заостренными лопастями, съ обѣихъ сторонъ голые. Цвѣтки въ полузонтикахъ, распускаются обыкновенно до появленія листьевъ, въ апрѣлѣ. Крылатка крупнѣе, чѣмъ у слѣдующаго. К. об. растеть въ тѣнистыхъ лѣсахъ, совмѣстно съ другими древесными породами, не образуя однакожъ сплошныхъ насажденій. Въ садахъ и паркахъ одно изъ красивѣйшихъ и прочныхъ, но недолговѣчныхъ деревьевъ. Твердая, однородная, бѣлая древесина его идетъ на различныя столярныя подѣлки, но не такъ прочна какъ у паклена. Весенний сокъ слаше, чѣмъ у березы, но добываніе его наносить вредъ дереву.—*K. полевой*, *A campestre* L., называемый обыкновенно „пакленомъ“, ниже ростомъ предыдущаго, имѣть листья и плоды меньше. Листья у него 5-лопастные, средняя лопасть 3-разщепленная, всѣ лопасти тупыя, чѣмъ легко отличается отъ предыдущаго. Пакленъ встрѣчается въ нашихъ лѣсахъ чаще предыдущаго, но тоже всегда въ смѣшаніи съ другими породами. Древесина его сѣроватая, часто извилисто-полосатая, выше цѣнится ремесленниками за свою прочность, большую твердость и упругость.—*K. татарскій*, *A. tataricum* L., называемый въ народѣ „черноклиною, чернокленомъ или некленомъ“ принадлежитъ тоже къ обыкновеннымъ деревьямъ въ нашихъ лѣсахъ и рощахъ, гдѣ растеть не въ чащѣ, а обыкновенно по опушкамъ и на болѣе открытыхъ мѣстахъ. Чернокленъ обыкновенно ниже ростомъ обоихъ предыдущихъ видовъ, рѣдко достигаетъ выше 20 ф. и легко распознается по темной корѣ, продолговатымъ, заостреннымъ и зубчатымъ (но не лопастнымъ) листьямъ и по красивымъ краснымъ плодамъ. Ради этихъ-то красныхъ плодовъ онъ и былъ введенъ въ садовую культуру въ западной Европѣ, гдѣ въ дикомъ состояніи не встрѣчается. Чернокленъ зацвѣтаетъ гораздо позже обоихъ предыдущихъ видовъ уже послѣ развитія листьевъ, съ половины мая до юна. Сѣроватая древесина его столь же прочна какъ у паклена.

Семейство 19-е. Каштановыя. Hippocastaneae.

Большія деревья съ дланевидно-сложными листьями и неправильными цвѣтками. Одинъ только родъ разводимый у насъ въ садахъ и паркахъ.

Каштанъ, *Aesculus*. L. Чашечка 5-лопастная, вѣнчикъ неправильный, цвѣтки въ конусовидныхъ гроздахъ на концахъ вѣтокъ, тычинокъ б. ч. 7, столбикъ 1, плодъ 1—2 гнѣздна, колючая коробочка. *K. горыкій*, *Ae. Hippocastanum* L. (Конский каштанъ). Высокое, тѣнистое дерево, разводимое охотно въ паркахъ и садахъ и отлично выдерживающее наши зимы. Каштанъ достигаешь у насъ 60 ф. высоты и 12—14 вер. въ діаметрѣ; имѣть листья дланевидно-сложные изъ 7 листочковъ, цвѣтки въ густыхъ коническихъ гроздахъ, лепестковъ 5 бѣлыхъ съ желтыми и розовыми пятнами, тычинокъ 7—8, неравноМѣрныхъ.—Отечество каштана неизвѣстно, полагаютъ однакожъ, что онъ происходитъ изъ Гималайскихъ горъ. Въ Европу впервые онъ былъ привезенъ знаменитымъ ботаникомъ Клузіусомъ и посаженъ въ

Вѣнѣ въ 1588 г. откуда и распространился по всей Германіи и другимъ странамъ Европы. Каштант г. преимущественно разводится какъ украшающее растеніе. Онъ растетъ быстро, даетъ много тѣни и во время цветенія, въ маѣ, украшается многочисленными гроздами цветковъ. Древесина его, однакожъ, губчата, грубо-волокниста и скоро подвергается гниению, поэтому на столярныя и плотничныя издѣлія не употребляется. Большая темно-красная, блестящія сѣмена содержать много крахмала и пригодны для кормленія свиней, овецъ и рогатаго скота. Вымоченные въ щелочной водѣ для уничтоженія горечи и смолистыя вмѣстѣ съ хлѣбнымъ зерномъ, они могутъ служить для печенія хлѣба. Кора горкъ, каштана, подобно хинной коркѣ, быть можетъ пригодна противъ лихорадки и разслабленія пищеварительныхъ органовъ. Каштанъ у насъ держится хорошо до 50—60 лѣтъ; очень старыхъ деревьевъ мнѣ не приходилось встрѣтить.—*Сѣдѣобный каштанъ*, *Castanea vesca* L., разводимый въ большомъ количествѣ въ паркахъ и садахъ южной Германіи, Франціи и др. странахъ для сѣдѣобныхъ плодовъ, не выдерживаетъ нашихъ зимъ, даже въ защищенныхъ мѣстахъ и потому разводится только кое гдѣ въ видѣ опыта.

Семейство 20-е. Виноградные. Ampelideae.

Небольшое семейство умеренно-теплого пояса, изъ коего только два вида разводятся у насъ въ садахъ.

Виноградъ настоящій. *Vitis vinifera* L. Драгоценный и всемирно известный кустарникъ съ цѣпляющимися стеблями, выемчато-лопастными, зубчатыми листьями и небольшими цветками въ пазушныхъ гроздахъ. Недоразвившіеся грозды преобразовываются въ длинные усы, которыми стебли прикрепляются къ какой-нибудь опорѣ.—Виноградъ у насъ разводится въ садахъ, больше для опытовъ, нежели съ экономическою цѣлью. Въ защищенныхъ мѣстахъ, при соответственномъ уходѣ, онъ растетъ хорошо, каждый годъ вызрѣваетъ вполнѣ, но урожай его подверженъ значительному колебанию, смотря по состоянию погоды. На зиму требуетъ безусловно защиты, т. е. легкаго прикрытия землею (по не навозомъ).—Отечествомъ винограда считаются Грузію, гдѣ и въ настоящее время встрѣчаются въ совершенно дикомъ видѣ мощные кусты винограда съ толстыми, въ 2—3 вершка, стеблями. Воздѣлываемый съ древнейшихъ временъ, виноградъ и по настоящее время составляетъ богатство многихъ странъ и мѣстностей умеренно-теплого пояса земного шара. Насчитываются до 1400 разновидностей этого драгоценного растенія и только въ послѣднее время культурѣ его нанесла огромный вредъ крошечная мушка, известная подъ названіемъ филоксера.—Разводимый въ нашихъ садахъ, такъ называемый *Дикий виноградъ* принадлежитъ къ особому виду и даже роду. Систематическое название его *Vitis hederacea* Ehrh. (или *Ampelopsis quinquefolia*, Mich.). Эта цѣпляющейся кустарникъ происходитъ изъ Канады, отличается красивыми сложными листьями изъ 5-ти продолговатыхъ листочковъ, листья его краснеютъ, а не желтѣютъ по осени. Онъ обладаетъ въ

высшей степени способностью переносить засуху и зимнюю стужи, не требует никакого ухода, развивается съ году на годъ лучше и отлично украшаетъ бесѣдки и стѣны домовъ. Цвѣтетъ въ концѣ июня, крошечные цвѣтки его въ гроздахъ образуютъ черныя ягодки суховатыя и невкусныя.

Семейство 21-е. Гераневые. Geraniaceae.

Небольшое семейство умеренно-теплого пояса, у насъ имѣеть представителями только травянистые растенія съ узловатыми стеблями и супротивными нижними листьями. Цвѣтоножки въ пазухахъ листьевъ, или супротивны имъ. У насъ въ дикомъ состояніи только два рода. Виды ихъ произрастаютъ на различныхъ мѣстностяхъ и изъ которыхъ интересны только по красотѣ цвѣтковъ. Гераневые доставляютъ скучный корицъ, а б. ч. и совершенно плохой, поэтому появляясь на лугахъ въ большомъ количествѣ, они считаются съ хозяевами за сорные растенія.

Герань, *Geranium* L. (Журавельникъ). Цвѣтки правильные, чашелистиковъ и лепестковъ по 5-ти, тычинокъ 10, расположенныхъ въ два кружка. Плодиковъ 5, каждый со своимъ столбикомъ сростается съ длиннымъ, центральнымъ столбцомъ (плодоносцемъ) и только во время зрѣлости отдѣляется, спирально закручиваясь вверхъ. Изъ многочисленныхъ видовъ этого рода мы укажемъ на слѣдующіе: А) цвѣтоножки съ 2-мя цвѣтками. *G. лучовая* *G. pratense* L. Крупное, юсматое растеніе, съ прямыми стеблями, многократно надрѣзанными листьями и большими голубыми цвѣтками на длинныхъ цвѣтоножкахъ, кои послѣ отцвѣтія изгибаются внизъ. На сухихъ лугахъ, по опушкамъ лѣснымъ,дов. часто. Отъ всѣхъ другихъ видовъ легко отличается по красивымъ голубымъ цвѣткамъ. Цвѣтетъ съ июня до осени.—*G. холмовая*, *G. collinum*. Steph. Сѣдая отъ прижатыхъ волосковъ, стебель вѣтвистый, листья 5—7 раздѣльные, съ острыми ромбическими, глубоко надрѣзанными долами. Цвѣтки на длинныхъ цвѣтоножкахъ красновато-лиловые. Цвѣтетъ лѣтомъ и встрѣчается дов. часто на лугахъ и между кустарниками.—*G. лѣсная*, *G. sylvaticum* L. Стебель прямой, развѣтвленный, листья дланевидно-разрѣзные на 7 долей. Цвѣтки средней величины, блѣднолиловые, на короткихъ цвѣтоножкахъ, которые послѣ цвѣтенія удлиняются, но не отклоняются внизъ. Растетъ по тѣнистымъ мѣстамъ, на сырой почвѣ, встрѣчается рѣдко. Цвѣтетъ въ маѣ и июнѣ.—*G. болотная*, *G. palustre* L. Стебель снизу прилегающій, вѣтвистый, листья дланевидно-разрѣзенные на 5—7 долей; цвѣтки лиловые на очень длинныхъ цвѣтоножкахъ, кои послѣ цвѣтенія изгибаются внизъ съ прямо стоячими плодами. На влажныхъ болотистыхъ лугахъ дов. обыкновенное. Цвѣтетъ съ июня до поздней осени.—В) цвѣтоножки съ однимъ цвѣткомъ. *G. пурпуровая*, *G. sanguineum* L. Листья дланевидно-разрѣзенные на 7—9 сегментовъ, кои въ свою очередь разщеплены на 3—5 линейныхъ доли; цвѣтки пурпуровые, красивые,

на длинныхъ цветоноожкахъ б. ч. по одиночкѣ. На лугахъ между кустарниками, въ рощахъ, нерѣдко. Цвѣтетъ съ конца мая долго. Отваръ травы употребляютъ для укрѣпленія волосъ. За границею разводится въ садахъ, какъ украшающее растеніе.

Изъ однолѣтнихъ видовъ герани чаще другихъ встрѣчаются у насъ: *G. мягкая*, G. molle, L. Стебель слабый, стелющійся, мохнатый, листья округлые глубоко-надрѣзанные на 3—7-лопастей, лопасти съ тупыми зубчиками; цветки малые, лепестки розовые или голубоватые, на верху выемчатые, длине чашечки; плодики голые, морщинистые. На сорныхъ мѣстахъ, при дорогахъ, въ кустарникахъдов. обыкновенная.—Съ нею близко сходна *G. маленькая*, G. pusillum, L., растущая преимущественно въ огородахъ, на грядахъ, между овощами, а равно и подъ заборами. Растеніе еще нѣжнѣе предыдущаго. Лепестки у нея лиловые или красноватые, едва длине чашечки. Встрѣчается дов. часто.—*G. перисто-листная*, G. robertianum, L. Отличается отъ всѣхъ другихъ нашихъ видовъ листьями тройчатыми или пятерными и листочками двояко-перисто-раздѣльными. Стебли прямые, сильно-развѣтвленные, косматые съ красноватыми узлами, листья тоже къ осени краснѣютъ. Цвѣтки малые, розово-лиловые, лепестки вдвое длине чашечки. Трава при растираніи въ пальцахъ издаетъ непріятный запахъ. Въ тѣнистыхъ мѣстахъ, на влажныхъ склонахъ въ лѣсахъ, обыкновенная. Цвѣтетъ лѣтомъ.

Аистникъ. Erodium. Цвѣтки по строенію совершенно сходны съ цвѣтками герани, только 5 вѣнчихъ тычинокъ лишены пыльниковъ, 5 внутреннихъ съ пыльниками. *A. вехолистный*, E. cicutarium, L'Herit. Малыя растенія, не выше 1 ф., стебли вѣнистые, б. ч. распространѣтые, или восходящіе; листья сложные, перистые, листочки почти до средняго церва перисто-раздѣльченіе. Цвѣтки малые, розовые, очень похожіе на цвѣтки герани, но расположены зонтикомъ по 4—6-ти, на концахъ длинныхъ цветоноожекъ. На сорныхъ мѣстахъ, подъ заборами и на поляхъ обыкновенный. Однолѣтнее значительно измѣняющееся растеніе, смотря по мѣстности. Цвѣтетъ съ конца июня до поздней осени.—Къ этому же семейству принадлежать и многочисленные разновидности *Пеларгонія* (*Pelargonium*), растеній, происходящихъ изъ Капланда и разводимыхъ у насъ въ теплицахъ. Нѣкоторыя изъ нихъ, высаженные лѣтомъ въ грунтъ, отлично держатся до осени и цвѣтутъ обильно.

Семейство 22-е. Бальзаминовыя. Balsamineae.

Сочные, однолѣтнія травянистыя растенія, съ неправильными цвѣтками. Одинъ родъ.

Бальзамина, Impatiens L. (Пригунь). Чашечка 5-листная, окрашена, нижній чашелистникъ съ шпорцемъ; вѣнчикъ 5-лепестный, нижніе 2 лепестка сростаются съ боковыми, тычинокъ 5; плодъ 5-камерная коробочка, въ зрѣлости при дотрогиваніи мгновенно разверзаю-

щался. У насъ одинъ только дикорастущій видъ: *Б. дикая* *J. noli me tangere* L. Растеніе нѣжное, голое, отъ 1 до 2 ф. высоты; листья черешчатые, продолговатые, пильчатые; цвѣтки въ пазухахъ листьевъ на длинныхъ цвѣтоножкахъ по 3—4, висячіе, изъ нихъ обыкновенно 1 или 2 большиe, лимонно-желтые, но бесплодные, въ остальныхъ маленькихъ развиваются плодовые коробочки. На влажныхъ затѣненныхъ мѣстахъ въ лѣсахъ б. ч. по берегамъ рѣчекъ и источниковъ; довольно обыкновенное. Цвѣтетъ въ юль и августѣ.

Садовые бальзамини, *J. balsamina*, происходятъ изъ Остъ-Индіи и охотно разводятся у насъ въ садахъ, какъ украшающія растенія. Существуетъ много разновидностей этихъ растеній, отличающихся разнообразiemъ оттѣнковъ и красотою б. ч. маxровыхъ цвѣтковъ.

(Продолженіе въ сльдующемъ году).