

Римская ромашка. *Anthemis nobilis*. Сложноцветное растение. Европа. Ароматическое, горькое, тоническое, тошнотворное.

Баульчикъ. *Anthriscus Cerofolium*. Зонтичное растение. Европа. Листы пахнуть весьма пріятно.

Снѣдокъ. *Anthriscus vulgaris*. Европа. Ядовитое.

Antiaris toxicaria. Хлѣбноплодное растение. Остъ-Индія. Сокъ чрезвычайно ядовитъ; имъ отравляютъ дикари копья и стрѣлы.

Сельдерей. *Apium graveoleus*. Зонтичное растение. Южная Европа. Острого, ядовитаго свойства, въ дикомъ состояніи, особенно если растеть въ сыромъ мѣстѣ.

Aralia nudicaulis. Арапіевое растение. Соединенные Американские штаты. Тоническое.

Ежовка. *Arbutus Unedo*. Вересковое растение. Западная и Южная Европа. Плодъ наркотический; кора и листья вяжущие.

Вонючій дягиль. *Archangelica officinalis*. Зонтичное растение. Европа. Корень и плоды жгущіе, ароматические, возбуждающіе, тонические.

Лапушникъ. *Arctium majus*. Сложноцвѣтое растеніе, мочегонное, разрѣшающее.

Толокнянникъ. *Arctos taphylos Uva Ursi*. Вересковое растеніе. Сѣверная Европа, Азія и Америка. Вяжущаго, рвотнаго, мочегонного свойства.

Капустная пальма. *Areca oleracea*. Пальма. Вестъ-Индія и преимущественно Барбадосъ. Сладкое, питательное расте-

ніє. Конечная почка, — пальмовая капуста, употребляется въ пищу.

Areca Catechu. По всей Индії. Плодъ вяжущаго, наркотического свойства. Орѣхи, смѣшанные съ известью и бетелемъ, жуютъ.

Argemone mexicana. Маковое растеніе. Изъ Мексики. Наркотического, слабительного, мочегонного свойства.

Aristolochia anguicida. Кирказоновое растеніе. Мексика. Корень составляеть противоядіе отъ укушенія змѣй.

Кирказонъ. Aristolochia Clematitis. Европа. Корни сильно возбуждающаго свойства.

Aristolochia guaco. Тропическая Америка. Доставляеть известное противоядіе «гуако» отъ укушенія змѣй.

Aristolochia longa. Южная Европа. Горькое, возбуждающее и тоническое.

Расть. Aristolochia rotunda. Южная Европа. Свойства тѣ же, что у Aris. longa.

Aristolochia Serpentaria. Соединенные Американскіе Штаты. Возбуждающее, послабляющее, потогонное.

Armeria vulgaris. Свинчатоное растеніе. Европа. Цвѣтки имѣютъ мочегонное свойство.

Баранья трава. Arnica montana. Сложноцвѣтное растеніе. Альпы. Острого, рвотнаго свойства.

Artanthe elongata. Перецневое растеніе. Перу. Сильно вяжущее.

Божье дерево. *Artemisia Abrotanum*. Сложноцветное. Европа. Пахучее, горькое, острое.

Полынь. *Artemisia Absinthium*. Европа. Ароматическое, горькое, тоническое.

Эстрагонъ. *Artemisia Dracunculus*. Сибирь. Ароматическое, горячительное, способствующее слюноотделению.

Artemisia Moxa. Китай. Измятые концы побеговъ образуютъ рыхлую волокнистую массу, употребляемую для моксы.

Artemisia Sieberi. Палестина. Бальзамическое, съ неприятнымъ запахомъ, горькое.

Artocarpus incisa. Хлѣбноплодное растеніе. Острова Тихаго Океана и Индийского Архипелага. Большой величины плодъ употребляется въ пищу разрѣзаный и высушенный; до созреванія содержитъ бѣлый клейкий сокъ.

Образки *Arum maculatum*. Ароидное растеніе. Вдоль изгородей. Все растеніе и преимущественно клубень имѣютъ острыя, Ѣдкія свойства; въ корневищѣ много крахмала, который известенъ въ торговлѣ подъ названіемъ португальскаго саго.

Asagraca officinalis. Лилейное растеніе, Мексика. Свойства такія же, какъ у *Ueratrum*.

Asarum canadense. Курказоновое растеніе. Канада. Горячительное, ароматическое, возбуждающее и потогонное.

Подорожникъ. *Asarum europaeum*. Европа. Острое, рвотное, послабляющее, потогонное; производить чиханіе.

Asclepias curassavica. Ласточниковое растение. Весь-Индія. Рвотное и слабительное.

Asclepias tuberosa (Asclepias decumbens.). Соединенные Американские Штаты. Корень имѣеть потогонное, тоническое и возбуждающее свойство.

Сизая плѣсень. Aspergillus glaucus. Микроскопический грибъ, появляющійся на различныхъ веществахъ, пришедшихъ въ разложеніе, и между прочимъ на сырѣ.

Марена. Asperula odorata. Мареновое растеніе. Европа. Пріятно пахнетъ, когда высохнетъ. Мочегонное.

Aspidium Filix. Папоротникъ. По сухимъ оврагамъ. Вяжетъ, тошнить.

Astragalus gummifer. Мотыльковое растеніе. Курдистанъ. Камедь, содержащаяся въ этомъ растеніе, имѣеть слизистыя, обволакивающія, питательные свойства.

Astragalus strobiliferus. Курдистанъ. Свойства тѣ же.

Astragalus verus Olivur. Тоже.

Лебеда. Atriplex hortensis. Лебедовое растеніе. Листья питательны. Съмена, говорятъ, производятъ тошноту.

Сонная одурь. Atropa Belladonna. Пасленовое растеніе. Европа, Нарконического, ядовитаго свойства.

Овесъ. Avena sativa. Злакъ. Месопотамія. Съмя питательно, въ крупѣ переваривается желудкомъ легко.

Asalea pontica. Вересковое растеніе. Кавказъ, Малая Азія. Наркотическое, вредное, если не опасное.

Balsamodendron Myrrba. Миртовое растение. Абиссинія, Возбуждающее, раздражающее, вяжущее, тонического свойства.

Barosma crenata. Рутовое растение. Мысъ доброй надежды. Ароматического, тонического, возбуждающего, мочегонного и потогонного свойства.

Batatas edulis Choisi (Convolvulus Batac. Выюковое растение. Остъ-Индія. Сладкаго вкуса, питательнаго, нѣсколько послабляющаго свойства.

Berberis Licum Royle. Барбарисъ. Индія. Весьма вяжущаго свойства.

Барбарисъ. *Berberis vulgaris*. Европа. Ягоды кислые, вяжущія. Кора вяжущая.

Свекла. *Beta vulgaris*. Лебедовое растение. Южная Европа, Корни сахаристые, питательные.

Береза. *Betula alba*. Березовое растение. Сѣверная Европа. Изъ коры получается деготь.

Betula nigra. Сѣверная Америка. Кора имѣеть острый, бальзамическая свойства. Изъ сока получается «березовая камфора».

Bixa orellana Флакуртиевое растение. Тропическая Америка. Сѣмена имѣютъ вяжущія свойства. Ихъ покрываетъ краснаго цвѣта мякоть, которою подкрашиваютъ сыры.

Bletia verecunda. Дремликъ. Весь Индія. Клубни горьковатые, пахучие, ароматические.

Boswellia thurifera. Colebrooke. Миртовое растение. Горист-

тая часть Индіи. Содержитъ смолистое масло возбуждающіхъ свойствъ.

Botrytis Bossiana Montagne. Микроскопический грибъ. Въ тѣлѣ шелковичнаго червя составляетъ причину болѣзни, известной подъ именемъ «muscardine».

Рѣпа. *Brassica Napus*. Крестоцвѣтное растеніе. Франція и Южная Европа. Питательная, противоцинготная свойства.

Брюква. *Brasica Rapa*. Южная Европа. Тѣ же свойства.

Капуста *Brassica oleracea*. По морскимъ берегамъ Западной Европы. Питательная, противоцинготная свойства.

Brayera anthelmintica. Розовое растеніе. Абиссинія. Слабительного, противоглистного свойства.

Bryonia dioica. Тыквенное растеніе. Европа. Корень рвотного, слабительного, острого, ядовитаго свойства.

Bumelia lycioides. Сапотовое растеніе. Соединенные Американскіе Штаты. Плодъ сладковатаго вкуса и вяжущаго свойства.

Сусакъ. *Butomus umbellatus*. Сусаковое растеніе. Въ глубокихъ болотахъ. Корневище и сѣмена острого, горькаго свойства.

Самшитъ. *Buxus sempervirens*. Молочай. Европа. Горькаго, потогоннаго, слабительного, острого свойства.

Caesalpinia coriaria. Мотыльковое растеніе. Тропическая Америка. Стручки до вызрѣванія весьма вяжущаго свойства.

Калужница. *Calla palustris.* Ароидное растение. По болотамъ въ Европѣ и Сѣверной Америкѣ. Жгучія, Ѣдкія свойства. Въ корневищѣ много крахмала.

Ноготки. *Calendula officinalis.* Сложноцвѣтное растеніе. Азія. Прежде употреблялось въ медицинѣ, какъ карминативное средство.

Callitris quadrivalvis. Хвойное растеніе. Марокко. Застывшій сокъ представляетъ горькую смолу, имѣющію многія техническія употребленія. Древесина пахучая, твердая, прочная, цвѣта краснаго дерева.

Ласточкиночка. *Calotropis gigantea.* Ласточниковое растеніе. Остъ-Индія. Потогонные свойства.

Вьюнокъ. *Calystegia sepium.* Вьюнковое растеніе. Европа. Послабляющія свойства.

Камфорное дерево. *Camphora officinarum.* Лавровое дерево. О. Формоза, Китай и Японія. Острья, возбуждающія, ядовитыя свойства.

Canna edulis Марантовое растеніе. Перу. Крахмаль питательный, смягчающій.

Canna Achiras Gillies. Америка, отъ Мендозы до Гватемалы. Клубни употребляются въ Перу и Чили въ пищу; они содержать много крахмала.

Конопля. *Cannabis sativa.* Конопляное растеніе. Индія и Персія. Возбуждающее, наркотическое, болеутоляющее, возбуждающее аппетитъ, одуряющее.

Каперсъ. *Capparis spinosa.* Каперсовое растеніе. На югѣ Европы. Противоцинготного, возбуждающаго свойства.

Турецкий перецъ. *Capsicum annuum*. Полевое растеніе. Мексика. Возбуждающее свойства; въ большомъ количествѣ — ядовито.

Capsicum bacatum и *Capsicum frutescens*. Остъ-Индія. Свойства тѣ же.

Сердечникъ. *Cordawine pratensis*. Крестоцвѣтное растеніе. По лугамъ въ Европѣ. Цвѣты возбуждающего, потогоннаго мочегоннаго свойства.

Осока. *Carex orenaria*. Ситовниковое растеніе. Въ рыхломъ песчанистомъ грунте, вблизи рѣкъ и моря. Корневище сладковатое, съ непріятнымъ землистымъ послѣдующимъ вкусомъ; свойства потогонныя, разрѣшающія.

Красный пырей. *Carex hirta*. По сырымъ лугамъ. Свойства тѣ же что и у *C. orenaria*.

Грабъ. *Caspinus Betulus*. Орѣшниковое растеніе. Европа. Тоническая свойства.

Тминъ. *Carum Carvi*. Зонтичное растеніе. Европа. Ароматическое, возбуждающее.

Гвоздичное дерево. *Caryophyllus aromaticus*. Миртовое растеніе. Острова Остъ-Индскаго архипелага. Пахучее, карминативное, желудочное.

Cassia acutifolia. Мотыльковое растеніе. Египетъ и Нубія. Листья слабительного, тонического свойства.

Cassia elongata. Аравія. Свойства тѣ же.

Cassia fistula. Остъ-Индія. Мякоть стручковъ слабительного свойства.

Каштанъ. *Costanea vesca*. Орѣшниковое растеніе. Южная Европа. Орѣхи сладкие, употребляемые въ пищу.

Волторошникъ. *Catalpa syringifolia*. Биньонійное растеніе. Соединенные Американскіе Штаты. Слизистое свойство.

Caltha edulis. Целастровое растеніе. Аравія. Листья наркотического, возбуждающего свойства.

Cedrela Toona. Щедрелевое растеніе. Бенгаль. Индійский Архипелагъ. Тонического, вяжущего свойства.

Cenomyse rangiferina. Лишай. На возвышенныхъ мѣстахъ. Составляетъ существенный кормъ сѣвернаго оленя.

Cenomyse ruxidata. Въ сухихъ лѣсахъ. Слизистый, горький; употребляется какъ истландскій мохъ.

Приворотъ. *Centauroa Calcitrapa*. Сложноцвѣтное растеніе. Европа. Корень горькаго вкуса.

Ипекакуана. *Cephaelis Spesacuanha*. Хинное растеніе. Бразилия. Рвотное. Наркотическое.

Лавровишневое дерево. *Cerasus Lauracerasus*. Миндалевое растеніе. Требизондъ. Ядовитаго свойства.

Cerasus virginiana. Соединенные Американскіе Штаты. Кора вяжущаго свойства.

Вишневое дерево. *Cerasus vulgaris*. Малая Азія. Плодъ сочный, сладкаго, нѣсколько кисловатаго вкуса. Кора содержитъ камедь.

Цареградскій стручекъ. *Seratonia Siligua*. Мотыльковое растеніе. Сирія. Мякоть плода сладкаго вкуса, питательна и имѣетъ послабляющія свойства.

Cerbera Manghas. Кутровое растение. Остъ-Индія. Зерна рвотнаго, ядовитаго свойства.

Cerbera Taoghin. Мадагаскаръ. Зерна сильнейший ядъ; одного достаточно для отравленія двадцати человѣкъ.

Исландскій мохъ. Cetraria islandica. Лишай на землѣ, въ съверныхъ широтахъ. Слизистое, тоническое, горькое вещество, употребляемое въ медицинѣ.

Chavica Bethe. Перечневое растеніе. Остъ-Индія. Листьями обертываютъ арековые орѣхи, присыпая известью, и жуютъ. Свойства наркотическія и вяжущія.

Chavica officinarum. Острова Индѣйскаго Архипелага. Употребляется какъ Piper nigrum, но степень свойства болѣе сильная.

Chavica Roxburghii. Бенгалъ. Свойства тѣ же, что предъидущаго.

Чистотѣль. Chelidonium majus. Маковое растеніе. По пустырямъ. Острого, наркотического, слабительного, рвотнаго, ядовитаго свойства.

Лебеда. Chenopodium anthelminticum. Лебедовое растеніе. Соединенные Американскіе Штаты. Ароматическое, сильно пахучее. Содержитъ масло, употреблявшееся въ медицинѣ.

Chenopodium Botryo. Южная Европа. Пріятно пахнетъ, имѣеть разрѣшающія и глистогонныя свойства.

Chenopodium olidum. Европа. Воняетъ Противоспазматическая и кровогонная свойства.

Chimaphila maculata. Грушанковое растение. Соединенные Штаты. Острого, тонического, наркотического, мочегонного свойства.

Chimaphila umbellata. Северная Америка. Свойства тѣже.

Chiococca densifolia. Хинное растеніе. Тропическая Америка. Кора корня сильное рвотное и слабительное средство.

Chloranthus inconspicuus. Хлорантовое растеніе. Китай. Ароматического, сильно возбуждающаго средства.

Chloranthus officinalis. Ява. Свойства какъ у предъидущаго.

Chondrus crispus. Водоросль. По морскимъ каменистымъ берегамъ въ Европѣ. Питательныя, мягчительныя свойства.

Эндивія. *Cichorium Endivia.* Сложноцвѣтное растеніе. Остъ-Индія. Горькое.

Цикорій. *Cichorium Intybus.* Европа. Горькое, послабляющее.

Cicuta virosa. Зонтичное растеніе. Европа. Сильно ядовито.

Cinchona Condaminea. Хинное растеніе. Локса въ Перу. Возбуждающее, тоническое, вяжущее.

Cinchona micrantha. Перу. Свойства тѣже.

Cinnamomum zeylanicum. Лавровое растеніе. Цейлонъ. Даётъ ароматическую, возбуждающую, тоническую и вяжущую пряность.

Cinnamomum Cassia Blume. Китай. Свойства тѣже.

Cissampelos Pareira. Полулунниковое растение. Бразилія.
Корень тонический, мочегонный.

Cissus cordata. Виноградное растение. Малабаръ. Остраго
свойства.

Cistus creticus. Цистовое растение. Кандія. Содержитъ смо-
листый возбуждающий сокъ.

Citrus acida. Померанцевое растение. Индія и Китай.
Корка плода ароматическая. Мякоть противоцинготная.

Апельсинъ. Citrus aurantium Risso. Въ лѣсахъ на Гимолѣ
и въ Китаѣ. Мякоть плода сладкая, прохладающая, соч-
ная; корка ароматическая, тоническая; листья ароматические
горькие.

Меллароза. Citrus Bergamia Risso. Разводится въ южной
Европѣ. Корка чрезвычайно пахучая; изъ нея и изъ цвѣтовъ
получается бергамотное масло.

Citrus Bigaradia Risso. Разводится въ южной Европѣ. Корка
плода горькая, ароматическая, тоническая; мякоть острая,
горькая. Изъ цвѣтовъ получается померанцевое масло —
Neroli.

Померанецъ. Citrus decumanus. Разводится въ южной Ев-
ропѣ. Ароматическое, кисловатое.

Сладкий лимонъ. Cirrus Limetta. Разводится въ южной
Европѣ. Употребляется какъ лимонъ.

Обыкновенный лимонъ. Citrus Limonum. Въ лѣсахъ сѣ-
верной Индіи. Корка благовонная, горькаго, ароматического
свойства, поправляющая пищевареніе, сокъ кисловатый, освѣ-
жающій, противоцинготный.

Сладкий лимонъ. *Citrus Lumia.* Разводится въ южной Европѣ. Свойства тѣ же, что и у *C. Limetta*, но достоинство ихъ выше.

Citrus Medica. Въ лѣсахъ сѣверной Индіи. Изъ корки получается лимонное масло «huile de cedrat».

Ломонось. *Clematis erecta.* Лютиковое растеніе. Средняя Европа. Листья чрезвычайно острого, жгучаго свойства.

Нарынная трава. *Clematis Flammula.* Южная Европа. Листья такого же свойства. Цвѣты хорошо пахнутъ.

Clematis Vitalba. Средняя Европа. Плоды и листья жгучаго, острого свойства.

Крестовый корень. *Cnicus Benedictum.* Сложноцвѣтное. Персія, Натолія. Тоническое, потогонное, тошнотворное.

Хрѣнъ. *Cochlearia Armoracia.* Крестоцвѣтное растеніе. По лугамъ въ Европѣ. Острого, возбуждающаго свойства.

Cochlearia officinalis. По морскимъ берегамъ въ Европѣ. Возбуждающаго, потогоннаго, мочегоннаго, и противоцинготнаго свойства.

Coccoloba uvifera. Гречичное растеніе. По берегамъ Вест-Индіи. Вяжущаго, кислаго свойства.

Cocculus palmatus. Полулунниковое растеніе. Мозамбикскій берегъ. Тонического, слизистаго, пищеварительного свойства.

Кокосовая пальма. *Cocos nucifera.* Пальма. По берегамъ тропическихъ острововъ. Корень наркотический, плодъ маслянистый, стволъ крахмалистый.

Кофеиное дерево. *Coffea arabica*. Хинное растение. Счастливая Аравия и Нубия. Возбуждающее.

Безвременникъ. *Colchicum autumnale* Лилейное растение. По лугамъ въ западной Европѣ. Острый ядъ.

Colocasia antiquorum. Ароидное растение. Тропическая страна: Египетъ, Греція. Щдкаго, жгучаго свойства, которое исчезаетъ вареніемъ въ водѣ; послѣ этого листья могутъ быть употребляемы въ пищу какъ шпинатъ, а клубни для похлебки.

Colocasia esculenta. Ароидное растение. Тропическая Америка. Свойства и употребленіе тѣ же что и *C. antiquorum*.

Пузырное дерево. *Colutea arbores cens*. Мотыльковое растение. Южная Европа. Листья послабляющаго свойства.

Comarum palustre. Розовое растение. Европа. Противолихорадочного свойства.

Омегъ. *Conium maculatum*. Зонтичное растение. Европа. Мочегонное, наркотическое, ядовитое.

Ландышъ. *Convallaria majalis* Лилейное растение. Европа. Корневище острого, послабляющаго, и мочегоннаго свойства.

Convallaria Polygonatum. Тамъ же. Свойства тѣ же.

Повилика. *Convolvulus arvensis*. Вьюнковое растение. Европа. Слабительное свойство.

Convolvulus dissectus Cavanilles. Южная Америка и южная Африка. Содержитъ водосинельную кислоту.

Convolvulus scamomonia. Натолія. Сильное драстическое.

Copaifera officinalis. Мотыльковое растеніе. Тропическая Америка. Масло, которое содержится въ этомъ растеніи, имѣеть возбуждающія свойства.

Cordia latifolia. Кордіевое растеніе. Ость - Индія. Производить сочный, слизистый, обволакивающій плодъ.

Cordia Муха. Ость-Индія. Тоже.

Corchorus olitorius. Липовое растеніе. Тропическая страны. Слизистаго, питательного свойства.

Coriadrum sativum. Зонтичное растеніе. Натолія. Ароматическое, возбуждающее, карминотивное.

Cornus florida. Корнусовое растеніе. Соединенные Американские Штаты. Тоническое, вяжущее, горькое.

Кизиль. *Cornus mascula*. Европа. Кора имѣеть противолихорадочная дѣйствія.

Глогъ. *Cornis sanguinea*. Европа. Въ семенахъ содержитя много масла, свойствами похожаго на оливковое.

Cornus suecica. Европа. Ягоды тонического дѣйствія.

Coronilla Emerus. Мотыльковое растеніе. Южная Европа. Листья послабляющаго, драстического свойства.

Лѣщина. *Corylus Avellana*. Орѣшниковое растеніе. Европа. Орѣхи сладкие, употребляемые въ пищу.

Морская капуста *Crambe maritima*. Крестоцвѣтное растеніе. По морскимъ берегамъ западной Европы. Противоцинготное, питательное вещество.

Cramaeva gynandra. Канеривое растение. Ямайка. Кора на корняхъ нарывается какъ шпанская мушка.

Serpinus. *Crithmum maritimum*. Зонтичное растение. Европа. Ароматическое, соленое.

Crocus vernus. Косатиковое (Ирисовое) растение. Европа. Клубневая луковица содержитъ острый сокъ.

Crocus sativus Allioni. Южная Европа. Сухія рыльца считаются кровогонными, возбуждающими. Это шафранъ.

Croton balsamiferum. Молочай. Весь-Индія. Изъ него перегонкою получается *Eau de Mantes*, употребляемая въ медицинѣ.

Croton Draco. Мексика. Сокъ, засыхая, образуетъ краску, драконову кровь. (*Sangre del drago*).

Croton Elenteria. Багама. Кора ароматического, горькаго, тонического свойства.

Croton Pavana. Индійскій архипелагъ. Свойства тѣ же что и *C. Tiglum*.

Croton pseudo-China. Мексика. Свойства тѣ же.

Croton Tiglum. Остъ-Индія. Масло, содержащееся въ съменахъ, сильно раздражающаго, драстическаго, ядовитаго свойства.

Crozophora Tinctoria. Молочай. Берега Средиземного моря. Сокъ синѣеть на воздухѣ и отъ щелочей.

Cubeba canina. Перецневое растение. Ява. Оstryя, ароматическая возбуждающія свойства.

Cubeba officinalis. Ява. Свойства тѣ же.

Cucumis Colocynthis. Тыквенное растеніе. Сирія и Индія. Горькаго, острого, тошнотворнаго, драстического свойства.

Арбузъ. Cucumis Mela. Персія. Прохладительного, послабляющаго свойства.

Cucumis pseudo-colocynthis Royle. Съверная Индія. Такія же свойства какъ у C. Colocynthis.

Cucusbita aurantia. Тыквенное растеніе. Отечество не извѣстно. Свойства такія же какъ у Cucumis Colocynthis, но въ слабѣйшей степени.

Тыква. Cucusbita maxima. Отечество не извѣстно. Не много послабляющаго свойства. Плодъ составляетъ пищу.

Cucurbita Melopepo. Отечество не извѣстно. Свойства та-
кія же.

Тыква. Cucurbita Pero. Востокъ. Нѣсколько слабитъ; пи-
тательный плодъ.

Cuminum Cyminum. Зонтичное растеніе. Египетъ и бе-
рега Средиземнаго моря. Слабо возбуждающее и кармина-
тивное.

Curcas purgans. Молочай. Вестъ-Индія. Свойства такія
же какъ у Croton Tiglum.

Curcuma longa. Инбирное растеніе. Ость-Индія. Клубни
ароматического, горькаго, возбуждающаго свойства.

Curcumae Zedoaria. Тропическая Азія. Корневище горькаго,
ароматического, горячительного свойства.

Curcumа Zerumbet. Остъ-Индія. Свойства тѣ же что у
C. Zedoaria.

Cycas circinalis. Цикадовое растеніе. Остъ-Индія. Каме-
листое мучнистое сѣмя.

Дряква. Cyclomen europaem. Первоцвѣтное растеніе. Силь-
но послабляющаго свойства.

Айва. Cydonia vulgaris. Яблоновое растеніе. Южная Ев-
ропа. Плодъ печеный составляетъ пріятную пищу; слизь,
отдѣляющаяся отъ сѣмянъ, питательного обволакивающаго
свойства.

Корды. Cynara scolymus. Сложноцвѣтное растеніе. Южная
Европа. Донце цвѣточнаго ложа употребляется въ пищу.

Cyperus longus. Сестовниковое растеніе. По влажнымъ и
поемнымъ лугамъ. Корневище горькаго вкуса, вяжущее, аро-
матическое, съ запахомъ фіалокъ. Изъ него приготавляется
ароматическая вода тоническихъ свойствъ.

Земляной миндаль. Cyperus esculentus. Разводится въ
Южной Европѣ. Корневище питательное, возбуждающее.
Употребляется въ пищу какъ орѣхи; даетъ оршадъ.

Cytisus alpinus. Мотыльковое растеніе. Европа. Сѣмена
наркотического свойства. (153 Р.)

Cytisus Laburnum. Европейскія Альпы тѣ же свойства.

Cytisus scoparius. Европа. Рвотныя, послабляющія, моче-
гонные свойства.

Волчье лыко. Daphne Mezereum. Ягодновое растеніе,

встрѣчаемое въ Европѣ. Острыя, послабляющія, ядовитыя свойства.

Daphne Laureola. Мѣсто нахожденія и свойства тѣ же.

Datura sanguinea. Пасленовое растеніе. Перу. Сѣмена производятъ сильнѣйшее возбужденіе.

Дурманъ. Datura stramonium. Европа. Сѣмена производятъ умоизступленіе.

Морковь. Daucus Carola. Зонтичное растеніе. Плодъ ароматического, возбуждающаго, мочегоннаго свойства; корень питательнъ.

Daucus gummifer. Южная Европа. Въ корняхъ содержится горькое бальзамическое вещество.

Сокирки. Delphinium Consolda. Лютиковое растеніе. Въ поляхъ. Сѣмена острого, рвотнаго свойства.

Delphinium staphisagria. Южная Европа. Сѣмена рвотнаго, слабительнаго, острого свойства.

Ясенецъ. Dictamnus albus. Рутовое растеніе. Южная Европа. Ароматического, тонического, мочегоннаго, противоспазматического свойства.

Dieffenbachia seguina. Ароидное растеніе. Вестъ-Индія. Содержитъ острый и ядовитый сокъ.

Нанерсточная трава. Digitalis purpurea. Мочегоннаго, томнотворнаго, послабляющаго, наркотического свойства.

Dion edule. Цикадовое растеніе. Мексика. Сѣмена содержать очень много крахмала, который извлекается для пищи.

Dioscorea sativa. Діоскорейное растеніе. Тропическая Америка. Большиє мясистые корни содержать много крахмала и составляютъ самое главное питательное вещество, где растеть это растеніе.

Dioscorea triphylla. Ость Индія. Корни мучнистые, ядовитыя.

Dorema ammoniacum. Зонтичное растеніе. Персія. Содер-житъ вонючую камедистую смолу, имѣющую возбуждающія свойства.

Dorstenia brasiliensis. Тутовое растеніе. Весь-Индія и Бразилія. Корневище возбуждающаго, тонического, потогон-наго, тошнотворнаго свойства.

Dorstenia Contrayerva. Тропическая Америка. Свойства тѣ же.

Drimis Winteri. Магнолійное растеніе. На горахъ южной Америки. Кора имѣть возбуждающее, ароматическое, тоническое свойство.

Дерябка. Eclabium agreste. Тыквенное растеніе. Южная Европа. Сокъ имѣть ѳдкія, раздражающія, драстическія свойства.

Масляная пальма. Elacis guinensis. Пальма. Берега Гви-неи и почти вся тропическая Америка. Плоды содоржать мягкительное жирное масло, которое въ свѣжемъ состояніи употребляется въ пищу, въ иномъ-же—на приготовленіе пальмового масла.

Elettaria cardamomum. Инбирное растеніе. Малаборъ. Сѣмена ароматическая, безъ остроты и жгучести.

Бѣлотный хвоцъ. *Equisetum huemale*. Хвоцъ. По по-
емнымъ мѣстамъ. Корневища содержать питательное веще-
ство. Стебли употребляются на полированіе дерева, кости
и мѣди. Водяной хвоцъ. *Equisetum fluviatile*. Въ водѣ. На
корневицахъ бываютъ клубни, содержащіе много крахмала.
Они употреблялись въ пищу еще Римлянами подъ названі-
ями «*Equisetum*» чечевица. *Ervum Lens*. Мотыльковое рас-
теніе. Европа. Съмена крахмалистая употребляемая въ пищу.
Въ большомъ количествѣ имѣеть наркотическое свойство.

Адамова голова *Eryngium campestre*. Зонтическое расте-
ніе. Европа. Корень ароматической, тонической, мочегонный.

Eryngium maritimum. Европа. Свойства корня тѣ же.

Erysiphe communis. Микроскопический грибъ на листьяхъ
живыхъ травяныхъ растеній, особенно горохѣ.

Erysiphe bicorvis. На листьяхъ клена, отчего дѣлаетъ ихъ
шершавыми.

Золототысячникъ. *Erythraca Centaurium*. Горечавское расте-
ніе. Европа. Горькаго, нѣсколько возбуждающаго свойства.

Erythroxylon Coca. Перу. Наркотическое, возбуждающее.

Engenia Pimenta. Миртовое растеніе. Вестъ-Индія. Сред-
нее между перцемъ и гвоздикой.

Бересклетъ. *Euonymus europaeus*. Цelaстровое растеніе.
Европа. Съмена острого, рвотнаго и послабляющаго свойства.

Сѣдачъ. *Eupatorium cannabinum*. Сложноцвѣтное растеніе.
Европа. Корень горькаго ароматического свойства.

Eupatorium glutinosum. Перу. Вяжущаго свойства.

Euphorbia atniguorum. Молочай. Западная часть варварійскихъ владѣній. Смола содержащаяся въ немъ чрезвычайно ядовита.

Euphorbia Cyporissias. Европа. Сильный ядъ.

Caphorbia gerasdiana. Европа. Корень рвотный.

Euphorbia hiberna. Ирландія. Корень наркотический.

Euphorbia ipecacuanha. Сѣверная Америка. Рвотного слабительного, потогонного свойства.

Euphorbia Lathyris. Европа. Сильное наркотическое, острое.

Euphorbia officinarum. Западная часть Варварійскихъ владѣній. Тѣ же свойства, что и у Eup. antiquorum.

Глазница. Euphrasia officinalis. Норичниковое растеніе. Европа. Слабаго горькаго и ароматического свойства.

Exogonium Purga. Вьюнковое растеніе. Мексика. Сильнаго дростического свойства.

Бобы коневьи. Faba vulgaris. Мотыльковое растеніе. Берега Каспія. Корни—мочегонного свойства, сѣмена не вызревшія—питательного, созрѣлые же—ядовитаго свойства.

Гречка. Fagopyrum esculentum. Гречичное растеніе. Развивается въ земледѣлии. Сѣмена содержать много крахмала. Даетъ крупу и муку.

Ferula orientalis. Зонтичное растеніе. Греція. Малая Азія. Доставляетъ африканскую аммоніаковую камедь.

Ferula Persica. Персія. Содержитъ смолу, похожую свойствами на ту, которую даетъ: Narthex Asafoetida.

Смоква. Винная ягода. Ficus Carica. Тутовое растеніе. Восточная Азія. Плодъ питательнъ, слизистъ, послабляющій, можетъ разстроить желудокъ; не зрѣлый—острый.

Ficus elastica. Сильчетъ. Сокъ млечный, острый, клейкій. Производитъ каучукъ.

Flacourtie Ramontchi. Флакуртиевое растеніе. Мадагаскаръ. Плоды походятъ на черносливъ; употребляются въ пищу.

Фенхель. Foeniculum officinale. Зонтичное растеніе. Берега Средиземного моря. Ароматическое, возбуждающее и карминативное.

Земляника. Fragaria vesca. Розановое растеніе. Европа. Плодъ—превосходное десертное блюдо.

Шпанская земляника. Fragaria virginiana. Соединенные Американские Штаты. Свойства тѣ же.

Franciscea uniflora. Норичниковое растеніе. Бразилія. Слабительнаго, рвотнаго свойства.

Ясень. Fraxinus excelsior. Оливковое растеніе. Европа. Кора тонического, листья противолихорадочнаго, мочегоннаго свойства.

Fraxinus Ornus. Южная Европа. Изъ вѣтвей выдѣляется сладкогорькое вещество, — манна, имѣющее послабляющія свойства.

Рябчикъ. Fritillaria imperialis. Лилейное растеніе. Персія. Луковицы острого, ядовитаго свойства, съ особымъ непріятнымъ запахомъ.

Fucus vesiculosus. Водорось. Морские берега. Слабопитательные, очищающие свойства.

Galipea Cusparia. Рутовое растение. Южная Америка. Сильного ароматического, возбуждающего свойства.

Garcinia Mangostana. Клюзийное растение. Индийский Архипелагъ. Плодъ самый вкусный; свойства его—питательные, освѣжающие.

Gaultheria procumbens. Вересковое растение. Съверная Америка. Вяжущаго, ароматического свойства,

Стародубка, *Gentiana Amarella*. Горечавковое растение Европа. Горькаго, нѣсколько наркотического свойства.

Змѣевикъ. *Gentiana campestris*. Европа. Свойства тѣ же

Gentiana Lutea. Европа. Свойства тѣ же,

Gentiana pannonica. Европа. Свойства тѣ же.

Gentiana punctata. Европа. Свойства тѣ же.

Gentiana purpurea. Европа. Свойства тѣ же.

Geranium maculatum. Гераній. Соединенные штаты. Корень очень вяжетъ.

Geranium moschatum. Южная Европа. Ароматический, вяжущій.

Geranium Robertianum. Въ лѣсахъ въ Европѣ. Ароматический, вяжущій.

Geum canadense. Розовое растеніе Соединены Американскіе Штаты. Слабая тоническая свойства.

Собачиха. *Geum rivale*. Европа. Вяжущаго, и тонического свойства.

Вивишикъ *Geum urbanum*. Европа. Свойства тѣже.

Gillenia trifoliata. Розовое растеніе. Соединенные Американские штаты. Корень рвотнаго свойства.

Солодковый корень. *Glycyrrhiza glabra*. Мотыльковое растеніе. Южная Европа. Слизистая, питательная, обволакивающія свойства. Изъ корня получается такъ называемая лакрица.

Gomnocarpus fruticosus. Ласточниковое растеніе Остраго, послабляющаго свойства.

Gossypium barbadense. Простирняковое растеніе. Америка. Производить хлопчатую бумагу.

Хлопчатникъ. *Gossypium herbaceum*. Ость-Индія. Производить хлопчатую бумагу.

Graphium penicilloides Corda. Микроскопический грибъ, разрушающій древесину, преимущественно сосновую и осиновую.

Лихорадочная трава. *Gratiola officinalis*. Норичниковое растеніе. Европа. Сильного мочегоннаго, тошнотворнаго свойства; острый горький ядъ.

Бакаутъ. *Guaiacum officinale*. Весть—Индія. Остраго, возбуждающаго свойства.

Guaiacum sanctum. Порто—Рико. Свойства тѣже.

Guazuma ulmifolia. Бинетнерійное растеніе. Весть-Индія.

Плодъ сочный, слизистый, употребляемый въ Бразиліи въ пищу. Имѣеть потогонное свойство.

Guizotia oleifera. Сложноцвѣтное растеніе. Абиссинія. Ость-Индія. Изъ сѣмянъ получается масло, употребляемое въ пищу.

Gyrophora proboscidea. Лишай. На горныхъ породахъ. Питательнъ, но горекъ и имѣеть послабляющія свойства.

Gyrophora erosa. Тоже.

Hebrandendron pictorium. Ключійное растеніе. Малабаръ. Содержить острую, драстическую смолу.

Hebrandondron gambogioides. Цейлонъ. Свойства тѣ же что и у предыдущаго

Hedera Helix. Арапіевое растеніе. Европа. Листья горькія; плоды—горькие, тошнотворные, рвотные.

Heinica salicifolia. Плакуновое растеніе. Новая Испанія. Сильного потогоннаго и мочегоннаго свойства.

Земляная груша. Helianthus tuberosus. Сложноцвѣтное растеніе. Бразилія. Клубни слегка ароматического свойства; питательны.

Helleborus foetidus. Лютиковое растеніе. По пустырямъ и лѣсамъ въ средней Европѣ. Листья имѣютъ рвотное, слабительное, ядовитое свойство.

Чемерица. Helleborus niger. Тѣнистые лѣса въ средней Европѣ. Слабительного, кровегоннаго, остронаркотического, ядовитаго свойства.

Helleborus orientalis. Малая Азія. Свойства предъидущаго.

Сморчокъ. *Helvella crispa.* Грибъ. По лѣсамъ. Питательный. Употребляется въ пищу.

Hemidesmus indica. Ласточниковое растеніе. Ость-Индія. Потогонное и мочегонное свойство.

Борщъ. *Heracleum sphondylium.* Зонтичное растеніе. Европа. Острое, нарывное.

Henchera americana. Камнеломковое растеніе. Соединенные Американские штаты. Корни сильно вяжущаго свойства.

Ячмень. *Hordeum distichum* Злакъ. Полагаютъ, происходит изъ Месопоталии. Разводится въ значительныхъ размѣрахъ. Зерна обволакивающаго, питательного свойства; щелуха нѣсколько острого свойства. Употребленіе—солодъ, крупа и мука. Существенная часть пива и кваса.

Хмѣль. *Humulus Lupulus.* Крапивное растеніе. По изгородямъ въ Европѣ. Наркотическое, ароматическое и тоническое.

Бѣлена *Hyoscyamus niger.* Пасленовое растеніе. Европа. Наркотическое, ядовитое растеніе.

Звѣробой. *Hypericum perforatum.* Звѣробойное европейское растеніе. Свойства вяжущія.

Hyssopus officinalis. Губоцвѣтное растеніе. Южная Европа. Возбуждающаго, желудочного свойства.

Haematoxylon campeachianum. Мотыльковое растеніе. Юкатанъ. Кора имѣетъ вяжущее свойство.

Schnocarpus frutescens. Кутровое растение. Остъ-Индія, преимущественно о. Цейлонъ. Слабительного свойства,

Жолдъ. *Ilex Aquifolium.* Орляковое растение Европа. Листья вяжущаго, тонического свойства; корень и кора слизистаго, мочегоннаго.

Ilex paraguayensis. Парагвай и Бразилія. Свойствъ возбуждающаго, наркотического, мочегоннаго и потогоннаго.

Ilex vomitoria. Соединенные Американскіе штаты. Рвотнаго свойства.

Illicium anisatum. Магнолійное растеніе. Китай и Японія. Плодъ ароматического свойства. Пахнетъ анискомъ.

Indigofera tinctoria. Мотыльковое растеніе. Остъ-Индія. Рвотное, наркотическое.

Inga sassa. Мотыльковое растеніе. Абиссинія. Мякоть плода сладкаго вкуса.

Девясиль *Inula Helenum.* Сложноцвѣтное растеніе. Европа. Ароматического, тонического, потогоннаго, мочегоннаго, тошнотворнаго свойства.

Ionidium Itubi. Фіалка. Бразилія и Гвіана. Корни—рвотное.

Ionidium microphyllum. Перу. Очень сильное рвотное и слабительное.

Ipomoea macrorhiza. Въ юнковое растеніе. Георгія и Каролина. Вопреки прежнимъ понятіямъ, корни этого растенія не имѣютъ послабляющаго свойства, а состоять изъ сахарныхъ и мучнистыхъ веществъ.

Jridaca edulis. Водоросль. На подводныхъ морскихъ камняхъ. Питательенъ; употребляется въ пищу.

Пролѣска. *Iris germanica.* Касатиконое растеніе. Средняя и южная Европа, по сухимъ мѣстамъ. Корневище пахучее съ горьковатымъ и острымъ вкусомъ; это-ирный и феалковый корень.

Iris florentina Италія. Свойства тѣ же.

Iris Pseudacorus. Болота и рѣки въ Европѣ. Корневище имѣетъ мочегонные, послабляющія и рвотные свойства. (156 Р.).

Jsonandra Gutta. Сапотовое растеніе. Малайскій Архипелагъ. Производить гутто-перчу, пріобрѣтшую повсемѣстную извѣстность.

Janipho Manihot. Малочай. Сокъ ядовитъ; крахмаль питательенъ, мягчительенъ, это-кассаво или топіоко.

Грецкій орѣхъ. *Suglans regia.* Орѣшниковое растеніе. Персія. Сѣмена изобилуютъ масломъ; кора и корень, а также щелуха молодыхъ орѣховъ имѣютъ слабительные свойства.

Можжевельникъ. *Suniperus communis.* Хвойное растеніе. Сѣверная Европа. Плодъ раздражающего, мочегонного и потогонного свойства.

Suniperus Oxycedrus. Южная Европа. Сильно возбуждающее, мочегонного свойства. Изъ древесины дѣлается обдѣлка карандашей, а потому она называется карандашнымъ деревомъ.

Казачій можжевельникъ. *Suniperus Sabina.* Европа и Средняя Азія. Острый ядъ.

Ralmia latifolia. Вересковое растеніе. Соединенные Штаты. Наркотическое, ядовитое.

Rameria triandra. Истодовое растеніе Перу и Чили. Корень—весьма сильно вяжущее средство.

Lactuca sativa. Салатъ—латукъ. Сложноцвѣтное растеніе. Европа. Послабляющее, противоцинготное.

Lactuca Scariola. Европа. Свойства тѣ же.

Lactuca virosa. Сильно наркотическое, острое.

Кубышки. Zagenaria vulgaris. Тыквенное растеніе. Ость-Индія. Ядовито.

Laminaria digitata. Водоросль. Ростетъ на камняхъ, въ морѣ, на значительной глубинѣ. Употребляется въ пищу. (Р. 157).

Lanosa nivalis. Микроскопической грибъ, поражающей подъ снѣгомъ злаки, преимущественно хлѣбные.

Lathyrus Aphaca. Мотыльковое растеніе. Европа Сѣмена наркотического свойства.

Углластый горохъ. Lathyrus Cicera. Европа. Сѣмена наркотического, ядовитаго свойства.

Мышки. Lathyrus tuberosus. Европа. Клубни содержать крахмаль и употребляются въ пищу.

Laurencia pinnatifida. Водоросль. На подводныхъ камняхъ, въ морѣ. Питатель. Острыя свойства. Употребляется какъ приправа.

Лавръ. Laurus nobilis. Лавровое растеніе. Южная Европа. Ароматическая, возбуждающая, наркотическая свойства.

Лаванда. Lavandula Spica. Губоцвѣтное растеніе. Берега Средиземного моря. Производить лавандуловое масло.

Lavandula vera. Берега средиземного моря. Возбуждающего, тонического свойства.

Lecanora Parella. Лишай. На камняхъ въ гористыхъ местахъ. Содержитъ пурпуреваго цвета краску.

Lecanora tastarea. Ростетъ также. Даетъ краску пурпуреваго цвета, служащую реактивомъ на кислоты, отъ которыхъ она краснеетъ, а отъ щелочей восстанавливается.

Багунъ. Ledum Latifolium. Вересковое растеніе. Съверная Европа и Америка. Наркотическое.

Крессъ-саладъ. Lepidium sativum. Крестоцвѣтное растеніе. По пустырямъ, въ Европѣ. Противоцинготное.

Leucoium aestivum. Амарилловое растеніе. Европа. Сокъ наркотический, тошнотный.

Выдольникъ Норичниковое растеніе. Европа. Горькаго, послабляющаго, мочегоннаго свойства.

Кокушкинъ дикий ленъ. По сырьимъ лугамъ въ Европѣ. Горькаго, слабительнаго, мочегоннаго свойства.

Ленъ обыкновенный. Linum usi tatissimum. Въ подлѣскѣ въ Европѣ разводится въ значительномъ размѣрѣ. Семена мягчительныя, слизистыя.

Lippia Pseudo Thea. Вербеновое растеніе. Бразилія. Ароматическое.

Liquidambar Altigia Blume. Сережковое растеніе. На О. Явѣ. Содержитъ сокъ, изъ котораго получается жидкая стиракса, — разамала.

Liquidambar orientale. Дальний Востокъ. Кора горячительного свойства, горькаго вкуса. Извлекается американская стиракса.

Liquidambar styraciflua. Мексика. Бальзаматического, ароматического, острого свойства. Извлекается жидкa стиракса.

Liriodendron tulipifera. Магнолийное растение. Соединенные Американские Штаты. Кора и плодъ горькаго, ароматического свойства.

Lobelia inflata. Лобелиевое растение Соединенные Американские Штаты. Потогоннаго, рвотнаго, острого наркотического, ядовитаго свойства.

Lobelia cardinalis. Соединенные Американские Штаты. Свойства тѣ же.

Lobelia siphilitica. Соединенные Американские Штаты. Рвотнаго, потогоннаго, противопростуднаго свойства.

Головня. Lolium temulentum. Злакъ. Въ поляхъ съ хлѣбомъ. Сѣмена наркотическія, острья; примѣсь ихъ къ мукѣ весьма вредна.

Дождевикъ. Lycoperdon gemmatum. Грибъ. Поля и луга. Механически дѣйствуетъ темнобурою пылью (спорами), какъ стягивающее средство въ ранахъ.

Lycoperdon giganteum. Поля и пашни. Вяжущій. Сухой, затягиваетъ порѣзы. Дымъ отъ сжиганія одуряетъ пчелъ.

Дерюга. Lycopodium clavatum. Плаунъ. Влажныя возвышенности; не высокія горы и болотистыя мѣста. Трава имѣеть рвотное свойство. Споры,— «порошокъ», дѣтская при-

сыпка» употребляется для обсыпанія пилоль, присыпки у дѣтей и въ сценическихъ представленияхъ для подражанія молніи. Имѣютъ рвотное дѣйствие.

Lycopodium Selago. По гористымъ мѣстамъ и песчанистымъ влажнымъ долинамъ. Вяжущаго, рвотного, драстическаго и наркотического свойства. Чрезвычайно раздражаетъ кожу, нарывая пузыри.

Lycopodium rubrum. По горамъ въ тропической Америкѣ. Употребляется какъ врачебное средство въ проказѣ.

Плакунъ. Lythrum Salicaria. Плакуновое растеніе. Европа. Обволакивающія, вяжущія свойства.

Macropiper methysticum. Перецновое растеніе. О—ва Товарищества. Возбуждающее, наркотическое, потогонное, ароматическое.

Magnolia glauca. Магнолійное растеніе. Соединенные Американскіе Штаты. Кора и плодъ горькаго, ароматического свойства.

Зинзиверъ. Malva sylvestris. Просвирняковое растеніе. По дорогамъ и изгородамъ въ Европѣ. Слизистыя свойства.

Mandragora officinarum. Пасленовое растеніе. Южная Европа. Остро наркотического, послабляющаго и возбуждающаго свойства.

Manettia curdifolia. Хинное растеніе. Бразилія Кора корней—рвотное.

Mangifera indica Камедистая смола, горькая, острая. Плоды сладкие.

Maranta arundinacea. Марантовое растение. Тропическая Америка. Крахмаль, содержащийся въ клубняхъ, слизистый, смягчающей, питательный, это — ямайской ароу-рутъ.

Шандра. *Marsrubium vulgare*. Губоцвѣтное растеніе. Европа. Таническаго, возбуждающаго, послабляющаго свойства.

Melaleuca Cajuputi. Миртовое растеніе. Индійскій Архипелагъ. Масло, извлекаемое изъ этого растенія, имѣть противоспазматическія, возбуждающія и потогонныя свойства.

Melia Azedarach. Сирія. Разводится въ южной Европѣ. Корень, горькаго противнаго вкуса. Мякоть плода подозрительныхъ свойствъ.

Маточникъ. *Melissa officinalis*. Губоцвѣтное растеніе. Южная Европа. Возбуждающаго, тонического свойства.

Melocca tuberosa. Аизоидное растеніе. Перу. Клубни употребляются въ пищу, какъ картофель; Листья какъ шпинатъ.

Мята перечная. *Mentha piperita*. Губоцвѣтное растеніе. Европа. Ароматического, желудочнаго возбуждающаго свойства.

Блоховникъ. *Mentha Pulegium*. Европа. Тѣ же свойства.

Квасная мята. *Mentha viridis*. Европа. Тѣ же свойства.

Трифоль. *Menyanthes trifoliata*. Горечавковое растеніе. Европа. Тонического, возбуждающаго, нѣсколько тошнотнаго свойства.

Щиръ. *Merculialis annua*. Молочай. Европа, по мусору. Ядовито.

Пролѣска. *Mercurialis perennis*. Тамъ же и такое же.

Царская бородка. *Mirabilis jalapa*. Ноче цветное растение. Тропическая страна Старый корень имеет драстическое свойство, а свежий — никакихъ.

Momordica Balsamina. Тыквенное растение. Южная Европа. Спелый плодъ очень ядовитъ.

Сморчокъ. *Morchella esculenta*. Грибъ По лесамъ. Питательный. Употребляется въ пищу.

Moringa pterygosperma. Моринговое растение. Индия и Аравия. Острого, ароматического, возбуждающего свойства.

Шелковичное дерево. *Morus nigra*. Тутовое растение. Персия. Плоды питательны, утоляютъ жажду и жаръ, несколько послабляютъ.

Плесень. *Mucor Mucedo*. Микроскопический грибъ, развивающийся на плодахъ, варенье, сиропахъ.

Mucuna pruriens. Мотыльковое растение Остъ - Индия. Корни мочегонного свойства. Волоски, покрывающие стручки, колючие, входящие въ тело и производящие нестерпимый зудъ.

Musa sapientum. Банановое растение. Тропическая Азия. Сладкий, мягкий, мучнистый плодъ, которымъ питаются въ жаркихъ странахъ.

Myristica fatua. Seoratz. Мускатное растение. Вестъ-Индия. Семена юдкаго, послабляющего, тошнотнаго, маслянистаго свойства.

Myristica moschata. Молукские острова. Семена ароматическая, юдкя, наркотическая маслянистая.

Myrospermum peruiferum. Мотыльковое растение. Перу и Мексика, производить перуанский бальзамъ.

Myrospermum toluiferum. Тропическая Африка. Свойства тѣ же.

Мирта. Myrtus communis. Миртовое растение. Персія. Пахучее ароматическое.

Narcissus Pseudo—Narcissus. Амарилловое растение. Европа. Острыя и ядовитыя свойства.

Narcissus Tazetta. Съверная Африка и южная Европа. Свойства такіе же какъ у N. Pseudo—Narcissus.

Narthex Asafoetida. Зонтичное растеніе. Содержитъ камедистую смолу непріятнаго запаха и возбуждающаго, противоспазматического свойства.

Nectandra Rodiae. Гвіана. Тоническія свойства.

Шанта. Nepeta Cotaria. Губоцвѣтное растеніе. Европа. Возбуждающаго свойства.

Будра. Nepeta Glechoma. Европа. Возбуждающаго, ароматического свойства.

Гулявникъ. Nosturtium officinale. Крестоцвѣтное растеніе. Въ текучихъ водахъ, въ Европѣ. Противоцинготное.

Nephelium Zongan. Мотыльковое растеніе. Китай. Плодъ очень вкусенъ, сѣмена покрыты сладкою, кисловатою мякотью.

Nerium Olcander. Кутровое растеніе. Берега Средиземнаго моря. Всѣ части этого растенія ядовиты.

Nicotiana percisa. Пасленовое растение. Персия Наркотического, послабляющего, рвотного свойства.

Nicotiana rusticca. Натолія. Свойства тѣже, но въ болѣе слабой степени.

Табакъ. Nicotiana Tabacum. Тропическая Америка. Свойства тѣже.

Чернушка. Nigella sativa. Лютиковое растение. По хлѣбнымъ полямъ средней Европы. Съмена, ароматического, острого свойства, пахнутъ очень сильно.

Базиликъ. Ocymum Basilicum. Губоцвѣтное растение. Остъ-Индія, возбуждающее, ароматического свойства.

Oenanthe erocata. Зонтичное растение. Европа. Остронаркотическое, ядовитое.

Гирча. Ocpantha Phellandrium. Европа. Свойства тѣже, въ нѣсколько слабѣйшей степени.

Oidium abortifaciens. Такъ назывался прежде грибъ, который вызываетъ образованіе спорыньи или рожковъ въ колосьяхъ злаковъ и особенно ржи. Спорынья сильный наркотический ядъ.

Oidium tuckeri. Листья и зеленая части виноградной лозы. Паразитъ, поражающій отравленіе кожи и частей, на которыхъ появляется. Составляеть сущность виноградной болѣзни.

Olea europaea. Оливковое растение. Южная Европа. Масло около плодника жирное, безъ запаха и почти безъ вкуса; кора имѣеть горькія, тоническія и вяжущія свойства.

Oporanax chironium. Зонтичное растение. Южная Европа. Отдѣляет вонючую камедистую смолу, похожую свойствами на аммониаковую.

Oruatia vulgaris. Кактусовое растение. Южная часть Сѣверной Америки. Плодъ — приятного вкуса. Кокушкины слезки.

Orchis moscula. Дремликъ. По лугамъ въ Европѣ. Корни (клубни) имѣютъ слизистыя размягчающія, питательные свойства. Даютъ салепъ.

Кукушкины слезки. Orchis maculata. Растетъ тамъ же, свойства тѣ же.

Душица. Origanum vulgare. Губоцвѣтное растеніе. Европа. Тонического, возбуждающего свойства.

Рисъ. Oryza sativa. Злакъ. Разводится въ жаркихъ странахъ на влажныхъ мѣстахъ. Сѣмя питательно, но не такъ, какъ другихъ хлѣбныхъ злаковъ. Употребляется въ пищу значительнымъ числомъ жителей земного шара.

Osmunda regalis. Папоротникъ. Болота и влажные луга. Тоническая и вяжущія свойства.

Oxalis Acetosella. Кислица. По лѣсамъ въ Европѣ. Кислого, прохладжающаго свойства.

Oxalis crenata. По горамъ южной Америки. Чрезвычайно кисло. Клубни употребляются въ пищу.

Клюква. Oxycoccus palustris. Вересковое растеніе. Европа. Плодъ освѣжающій, сочный.

Макъ самосѣйка. Papaver Rhacos. Маковое растеніе. Въ хлѣбныхъ посѣвахъ въ средней Европѣ. Наркотического свойства.

Макъ бѣгунъ. *Papaver somniferum*. Сирія. Возбуждающаго свойства.

Ночь да день. *Parietaria officinalis*. Крапивное растеніе. На мусорѣ, мочегоннаго свойства.

Pasmelia parictina. Лишай. На деревьяхъ и камняхъ. Горькаго вкуса. Содержитъ желтую краску.

Passiflora foetida. Пассифлора. Вестъ—Индія. Цвѣтъ—трудное лѣкарство, листья имѣютъ слизистое свойство, а корни—вяжущее.

Гранадиль. *Passiflora quadrangularis*. Тропическая Америка. Корень наркотического, рвотнаго свойства.

Passiflora rubra. Ямайка. Наркотического свойства.

Полевой борецъ. *Pestinaca Sativa*. Зонтичное растеніе. Европа. Корни питательны.

Paulinia pinnata. Мыловниковое растеніе. Бразилія. Острый ядъ.

Paulinia sorbilis. Бразилія. Вяжущаго, укрепляющаго желудокъ, возбуждающаго свойства.

Peltidea canina. Лишай. На землѣ, между мхомъ. Считался средствомъ отъ водобоязни.

Peltidea aphthosa. На важныхъ скалахъ Слабительная, противоглистная свойства. Въ Швеціи отваръ съ молокомъ употребляется противъ молочницы (aphtha), отчего произошло и название растенія.

Укусная плѣсенъ. *Penicillium glaucum*. На разлагающихся жидкостяхъ въ состояніи укуснаго броженія.

Perouospora iufestans. Микроскопческій грибъ. На листьяхъ и стебляхъ картофеля, составляя причину его болѣзни.

Петрушка. Petroselinum sativum. Зонтичное растеніе. Возбуждающее, ароматическое, мочегонное.

Pharbitis Nil. Вьюнковое растеніе. Тропическая страны. Съмена имѣютъ послабляющія свойства.

Фасоль. Phasacolus multiflorus. Мотыльковое растеніе. Остъ Индія. Зеленые плоды питательны и легко перевариваются желудкомъ; корни наркотического, ядовитаго свойства.

Финиковая пальма Phoenix dacty lifera. Пальма. Съверная Африка. Сладкий и питательный плодъ.

Phytolacca decandra. Соединенные Американскіе Штаты. Послабляющія, рвотныя, наркотическая свойства.

Picraena excelsa. Квассійное растеніе Ямайка. Наркотический ядъ.

Анисъ. Pimpinella Anisum. Зонтичное растеніе. Египетъ и Сирія. Ароматическое, возбуждающее.

Pinus Pinaster. Хвойное растеніе. Южная Европа. Раздражающаго, возбуждающаго, мочегонного свойства. Даётъ бордосскій скипидаръ.

Pinus Pinea. Южная Европа. Свойства тѣ же. Съмена употребляются въ пищу: это pignons.

Сосна. Pinus sylvestris. Съверная Европа. Свойства та-кія же. Даётъ терпентинъ, смолу, варъ, и строительный материалъ.

Piper nigrum, Перецное растение. Тропическая Азия. Острыя, жгучая, возбуждающая, ароматическая свойства.

Piper trioicum. Остъ-Индія. Свойства тѣ-же, болѣе жгучи.
Piscidia Erythrina. Мотыльковое растение. Кора корня имѣетъ сильное наркотическое свойство.

Pistacia atlantica. Сѣверная Америка. Востокъ. Содержитъ пахучую, вяжущую смолу.

отъ Pistacia Lentiscus. Южная Европа. Сѣверная Америка. То-же, что P. atlantica.

Pistacia Terebinthenes. Южная Европа. Сѣверная Африка. Восточная Азія. Даётъ смюсскій терпентинъ.

Фисташка. Pistacia vera. Сирія. Плодъ маслянистый, употребляемый въ пищу.

Planera Abelicea. Вязовое растеніе. Кандія. Ароматическая древесина.

Plocaria helminthochortos. Водоросли. По берегамъ Средиземного моря, особенно около Корсики. Питательенъ, соленъ, съ сильнымъ запахомъ. Противоглистное средство.

Plocaria tenax. Китайская моря. Слизистъ, питательенъ. Китайцами приготавляется въ пищу въ супахъ и въ видѣ желе.

Plumbago. Свинчатковое растеніе. Южная Европа. Сильно-острыхъ свойствъ.

Plumbago scandens. Вестъ-Индія. Такихъ же свойствъ.

Plumbago zeylanica. Остъ-Индія. Свойства тѣ-же.

Polansia viscosa. Ость - Индія. Листья острого, жгучаго свойства, какъ горчица.

Polygala Chamaebuxus. Истодъ. Европа. Корни потогоннаго, мочегоннаго, тошнотворнаго, слабительнаго свойства.

Polygala Poaya. Бразилія. Сильнаго рвотнаго свойства.

Polygala rubella. Соединенные Штаты. Горькаго, тоническаго, возбуждающаго, потогоннаго свойства.

Polugala senega. Соединенные Штаты. Свойства тѣ-же, что и у *P. Chamaebuxus.*

Polygala vulgaris. Европа. По лугамъ. Горькія свойства.

Polygonum amphibium. Гречичное растеніе. Ростеть въ водѣ. Корни, говорятъ, имѣютъ тѣ-же свойства, что и сар-сапарель.

Спорымъ. *Polygonum oviculare.* Сѣмена возбуждаютъ рвоту и послабляютъ.

Раковые шейки. *Polygonum Bistorta.* По лугамъ. Сильное тоническое и вяжущее средство.

Горчакъ. *Polygonum Hydropirer.* Въ сырыхъ канавахъ. Имѣть острыя, мочегонныя средства. Свѣжіе листья нарываютъ, какъ мушка.

Трутнякъ. *Polyporus igniorius.* Грибъ на стволахъ старыхъ деревъ. Вяжущія свойства. Расколоченный служить для закрытия слабыхъ порѣзовъ, разрѣзанный полосками можетъ замѣнить ремень для точенія.

Polyporus fomentarius. На старыхъ деревьяхъ. Вяжущій. Употребленія тѣ-же.

Polyporus officinalis. На стволяхъ лиственницы. Пахнетъ свѣжеизмолотой мукой. Горькаго, противнаго вкуса. Сильное слабительное.

Populus balsamifera. Ивовое растеніе. Соединеные Штаты. Почки ароматическія смолистыя, горькія, мочегонныхъ, противоспазматическихъ свойствъ. Изъ нихъ получается та-камагака.

Populus nigra. Сѣверная Европа. Свойства тѣ-же.

Porphira laciniata. Водорось. Однолѣтнее растеніе, поселяющееся на подводныхъ камняхъ и скалахъ въ Европ. моряхъ. Содержитъ питательныя вещества и потому употребляется въ пищу.

Porphira vulgaris. То-же, что и *P. laciniata*.

Портулакъ. *Portulaca oleracea.* Портулаковое растеніе. Разводится на огородѣ. Противоцинготное средство.

Гусеница. *Potentilla anserina.* Розановое растеніе. Европа. Корень сильно вяжущаго свойства.

Пятипалочникъ. *Potentilla reptans.* Европа. Свойство вяжущее, тоническое.

Завязникъ. *Potentilla Tormentilla.* Европа. Свойства тѣ-же.

Poterium sanguisorba. Черноголовникъ. Кровесосковое растеніе. Европа. Тонического, вяжущаго свойства.

Primula veris. Первоцвѣтное растеніе Европа Цвѣтки имѣютъ потогонное свойство.

Prinos verticillatus. Орляковое растеніе. Соединенные

Американские Штаты. Кора и плоды тонические; последнее тоже рвотного свойства.

Арбикось. *Prunus Armeniaca*. Мотыльковое растение. Кавказъ и Гималай. Плодъ на Востокѣ считается противолихорадочнымъ средствомъ.

Prunus Coccocilia. Калабрія. Кора противолихорадочного свойства.

Слива. *Prunus domestica*. Европа. Плодъ вяжущаго свойства.

Тернъ. *Prunus spinosa*. Европа. Плодъ вяжущаго свойства.

Орлякъ. *Pteris aquilina*. Папоротникъ. По пустырямъ и лѣсамъ. Вяжущія, горькія, противоглистные свойства.

Корневище пробовали употреблять взамѣнъ хмѣля. Въ голодные годы употребляли въ пищу.

Pterocarpus erinaceus. Мотыльковое растеніе. Гамбія. Вяжущее.

Pterocarpus Marsupium. Малабаръ. Свойства тѣ-же.

Pterocarpus santalinus. Остъ-Индія. Свойства тѣ-же.

Головня. *Puccinia graminis*. Микроскопическій грибъ на листьяхъ и соломинѣ злаковъ, распространяясь на цветы, отчего не образуется сѣмень.

Гранатъ. *Punica granatum*. Миртовое растеніе. Южная Европа. Вяжущее; кора корня—рвотное и слабительное.

Pyrethrum Parthenium. Сложноцвѣтное растеніе. Европа. Горькаго, тонического свойства.

Рябина. *Pyries Aucuparia*. Яблоновое растение. Европа. Въ цвѣтахъ, корѣ и корнѣ содержится много водосицильной кислоты, а въ плодахъ яблочной.

Груша. *Pyrus communis* Европа. Плодъ пріятного вкуса, вареный питательный и легокъ для желудка.

Яблоня. *Pyrus Malus*. Европа. Свойства плода тѣ-же.

Quassia amara. Квассія. Суринамъ. Сильно горькія свойства.

Quercus gramuntia. Орѣшниковое растение. Испанія. Желуди сладкие употребляются въ пищу подъ названіемъ «Belotes».

Quercus infectoria. Востокъ. Производить чернильные орѣшки, замѣчательно вяжущаго свойства.

Дубъ лѣтній. *Quercus pedunculata*. Сѣверная Европа. Кора тоническая, очень вяжущая.

Дубъ зимній. *Querus sessiliflora*. Средняя и Южная Европа. Свойства такія-же, какъ у *Q. pedunculata*.

Дубъ пробковый. *Querus suber*. Югозападная Европа. Кора производить пробку.

Купальница. *Ranunculus acris*. Лютиковое растение. По лугамъ во всей Европѣ. Жгучаго, острого свойства.

Чистякъ. *Ranunculus Ficaria*. По влажнымъ лугамъ во всей Европѣ. Острого свойства.

Чичина. *Ranuculus Flammula*. По сырымъ лугамъ. Весьма жгучаго, острого свойства.

Нарывная трава. *Ranunculus sceleratus*. По сырымъ каналамъ. Острого, разъѣдающаго, ядовитаго свойства.

Raphanus sativus. Рѣдька. Крестоцвѣтное растеніе. Разво-
дится въ огородахъ. Корень остраго, возбуждающаго свойства.

Игла. Rhamnus catharticus Крушиновое растеніе. Евро-
па. Плоды противолихорадочнаго, мочегоннаго свойства.

Крушина. Rhamnus Frangula. То-же, что и первый видъ.

Rheum Emodi. Гречичное растеніе. Гималаи. Корень со-
ставляетъ тоническое, слабительное свойство.

Ревень. Rheum palmatum. Даурія. Свойства тѣ-же.

Rheum undulatum. Сибирь. Свойства тѣ-же.

Пьяная трава. Rhododendron chrysanthum. Вересковое ра-
стеніе. Даурія. Сильное наркотическое.

Rhododendron ferrugineum. Швейцарскія Альпы. Наркоти-
ческое.

Конецъ.