

ОТЧЕТЪ

Госпитальной Терапевтической Клиники

за 1899 годъ.

Въ отчетномъ году въ клиническомъ отдѣленіи, включая каникулярные мѣсяцы май, іюнь, іюль и августъ, лечилось 704 больныхъ, изъ нихъ умерло 61, что составляетъ 8,6% смертности.

По роду заболѣваній больные распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

	Выпущено	Умерло
Инфекціонныя заболѣванія.		
Typhus abdominalis	46	4
„ exanthematicus	3	1
Influenza	49	—
Malaria	28	—
Pneumotyphus	—	1
Lues condylomatosa	1	—
„ inveterata	2	—
Dysenteria	4	1
Tussis convulsiva	1	—

Болѣзни органовъ кровообращенія.

Myocarditis	12	1
Vitium cordis	20	1
Aneurisma aortae	1	—
Arteriosclerosis	1	1
Varices cluris	1	—

Болѣзни органовъ дыханія.

Laryngitis acuta	2	—
„ „ luetica	1	—
Bronchitis acuta	6	—
Pleuritis sicca	17	—
„ „ exsudativa serosa	15	—
Empyema	0	1
Phthisis pulmonum tub.	43	18
Pneumonia cruposa	31	2
„ „ influenza	8	—
Bronchopneumonia	1	—
Pneumothorax	3	—
Emphysema pulmonum	12	1

Болѣзни органовъ пищеваренія.

Angina catarrhalis	2	—
„ follicularis	4	—
„ phlegmonosa	1	—

Gastritis acuta	12	—
Enteritis acuta	5	—
Gastroenteritis acuta	20	—
Gastritis chronica	1	—
Dyspepsia	1	—
Gastroenteritis chronica	2	—
Obstructio	7	—
Coprostasis	1	—
Gastralgia	2	—
Catarrhus ventriculi chy.	6	—
Dilatatio ventriculi	2	—
Ulcus ventriculi rotundum	3	—
Achylia gastrica	1	—
Stenosis oesophagi	1	—
Carcinoma ventriculi	2	5
„ „ hepatis	1	3
Lues hepatis	1	—
Cholelithiasis	1	—
Cirrhosis hepatis atrophica	4	2
Cirrhosis hepatis hypertrophica	1	—
Carcinoma cystidis felleae	1	—
Icterus catarrhalis	4	—
Typhlitis	6	—

Peritonitis acuta	1	—
Peritonitis tuberculosa chr.	1	—
Volvulus	2	—
Helminthiasis	7	—
Болезни почекъ и мочевыхъ путей.		
Nephritis parenchymatosa	29	5
„ interstitialis	5	—
Hydronephrosis	1	—
Pyelonephritis	1	—
Pyelitis	1	—
Болезни крови и обменъ веществъ.		
Anaemia	4	—
Chlorosis	1	—
Diabetes mellitus	1	—
„ insipidus	2	—
Болезни суставовъ и мышцъ.		
Rheumatismus articularis acutus	36	—
„ „ chronicus	13	—
„ muscularis	2	—
Arthritis deformans	1	—
Lumbago	2	—
Distorsio musculorum abdominis	3	—
„ „ humeri	1	—

Arthritis tuberculosa	1	—
Gonitis luetica	1	—
Болезни нервной системы.		
Haemorrhagia cerebri	3	4
Hemiplegia	8	1
Myelitis transversa	3	—
Tubes dorsalis	4	—
Paralysis progressiva	1	—
Meningitis tuberculosa	1	—
Delirium tremens	2	—
Hysteria	11	—
Epilepsia	3	—
Morbus Basedowii	—	1
Ischias	5	—
Cephalalgia	3	—
Tumor cerebri	1	—
Myelitis luetica	2	—
Болезни кожи.		
Eczema	5	—
Scabies	1	—
Erythema	1	—
Purpura simplex	1	—
Ulcera cruris	1	—

Отравленія.

Alcoholismus acutus	1	—
” chronicus	1	—
Intoxicatio hydrardyro bichlorato	1	—
” arsenicalis	1	—
” t’ra iodi	1	—
Intoxicatio saturnina chronica	1	—
” acido acetico	1	—
” acido carbolico	1	—
” ammonio liquido	1	—
Intoxicatio phosphorica	1	—
” cocaino muriatico	1	—
Старческія болѣзни.		
Marasmis senilis	1	—
Хирургическія болѣзни.		
Fractura costae	1	—
Suffocatio	1	—
Contusio	8	—
Abscessus femoris	1	—
Phlegmona pedis	1	—

Случайно попавшіе.		
Psychosis	4	—
Vulvo-vaginitis	1	—
Perimetritis	2	—
Oophoritis	1	—
Mastitis	1	—
Retroflexio uteri fixata	1	—
Urethritis	1	—
Дѣти при матеряхъ	2	—
Безъ діагноза	2	—

Изъ новыхъ терапевтическихъ мѣропріятій въ отчетномъ году особенно достойно указанія лѣченіе различныхъ формъ легочнаго туберкулеза подкожными впрыскиваніями креозота въ смѣси съ камфорой и сѣрнымъ эфиромъ по способу Гальперина. Приготовленіе препарата заключается въ слѣдующемъ; 10 частей чистаго креозота, 5 частей камфоры и 5 частей сѣрнаго эфира помѣщаются въ герметически закупоренный сосудъ и нагрѣваются въ кипящей водяной банѣ въ продолженіе 4½ часовъ. По охлажденіи смѣсь разводится хорошо стерелизованнымъ оливковымъ масломъ въ отношеніи 1 къ 5 и въ такомъ видѣ впрыскивается въ количествѣ отъ 1 до 8 кубическихъ сантиметровъ ежедневно, или черезъ день, иногда даже черезъ 2—3 дня, смотря по состоянію больного. Результаты, полученные отъ подобнаго метода лѣченія, настолько утѣшительны, что настоятельно поощряютъ къ дальнѣйшему примѣненію этого средства. Это единственный способъ лѣченія легочнаго туберкулеза, давшій намъ, при нашей неприглядной больничной обстановкѣ, мало-мальски удовлетворительные результаты. Лѣченіе брюшнаго тифа ничѣмъ существенно не отличалось отъ прошлыхъ лѣтъ. Больные получали внутрь antiseptica, главнымъ образомъ іодоформъ, въ количествѣ отъ 0, 03 до 0, 06 три раза въ день, иногда ксероформъ до 1, 0 въ сутки или бензонаф-

толь до 2, 0 въ сутки; кромѣ того имъ назначались большія количества вина и коньяку, а при наличности особыхъ показаній, различныя симптоматическія средства, какъ то—коффеинъ и камфора при слабости сердца, опій и уксуснокислый свинець при кровотеченияхъ ихъ кишекъ. Изъ гидротерапевтическихъ мѣропріятій мы прибѣгали только къ обтираніямъ, а при особенно высокой температурѣ къ холоднымъ обертываніямъ; ваннъ не примѣняли вовсе въ виду невозможности систематическаго и рациональнаго ими пользованія вслѣдствіе сильнаго переполненія больницы.

Результаты, полученные отъ подобнаго лѣченія брюшнотифозныхъ больныхъ, въ высшей степени удовлетворительны: изъ 32 больныхъ, лѣчимыхъ вышеуказаннымъ способомъ, въ періодъ времени отъ 1-го Сентября по 1-ое Мая, не умеръ ни одинъ, не смотря на то, что между ними были очень тяжелые случаи.

Терапія при крупозной пневмоніи была исключительно симптоматическая: холодныя обертыванія, отвлекающія въ видѣ сухихъ банокъ, отхаркивающія, сердечныя при наличности слабости сердца, ртутныя втиранія и іодистый калий при слабомъ разрѣшеніи. Дигитались только какъ *symptomaticum*. При инфлюентной пневмоніи примѣнялась въ большихъ количествахъ салициловый натръ до 4, 0—5, 0 *pro die*.

При маляріи употреблялась почти исключительно метиленовая синька, въ количествѣ 0, 2—0, 3 три раза *pro die*, съ небольшимъ количествомъ мускатнаго орѣха. Дѣйствіе ея почти нисколько не уступало—хинину, иногда же проявлялось даже въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ назначеніе хинины было безрезультатно; никакихъ побочных дѣйствій отъ нея кромѣ небольшой дизуріи, да временами тошноты мы не наблюдали.